COLLÈGE François-Xavier VOGT B.P. 765 Yaté - Tél. : 222 31 54 28 e-mail : collegevogt@yahoo.fr		Année scolaire 2021-2022
Département de PHYSIQUE	MINI SESSION	Date : 02 Novembre 2021
Classes : Premières D&TI	EPREUVE DE PHYSIQUE	Durée : 02 H

Partie 1 : Evaluation des ressources

/ 12 Points

Exercice 1 : Vérification des ressources

/4pts

- 1) Définir les termes suivants : énergie potentielle de pesanteur, système pseudo-isolé, choc élastique, métrologie. 1pt
- 2) Rappeler l'expression de la puissance d'une force constante de moment M_A , appliquée sur un système en mouvement de rotation en explicitant tous les termes. 1pt
- 3) Répondre par vrai ou faux : 1pt
 - a) Lors du déplacement d'un système mécanique, l'énergie mécanique est toujours conservée.
 - b) L'énergie potentielle de pesanteur d'un corps diminue lorsque le corps s'éloigne de la terre.
 - c) Lors d'un choc entre deux systèmes, la quantité de mouvement totale et l'énergie cinétique sont toujours conservées.
 - d) Un instrument de mesure juste, est aussi fidèle.
- 4) Énoncer le théorème de l'énergie cinétique et donner son expression mathématique. 0.75pt
- 5) Rappeler l'expression de l'incertitude de type A sur une série de mesures répétées d'une grandeur. 0.25pt

Exercice 2 : Application des savoirs

/4pts

A/ Notion de choc entre deux systèmes / 1.5pts

Un solide S_1 de masse m_1 est animé d'un mouvement de translation rectiligne de vitesse $\vec{V}_1$ sur un sol horizontal parfaitement lisse. Il entre en collision avec un autre solide S_2 de masse m_2 immobile sur le même plan. On suppose que le choc est parfaitement élastique, chacun des solides ayant un mouvement de même direction que S_1 avant la collision.

Déterminer les vitesses V'_1 et V'_2 des solides S_1 et S_2 respectivement après le choc. 1.5pt

Données : $m_1 = 495 \text{ g}$; $m_2 = 165 \text{ g}$; $V_1 = 10 \text{ m/s}$. On fera les schémas nécessaires.

B/ Energie potentielle de pesanteur d'un système et travail d'une force / 2.5pts

Une piste horizontale AB de longueur $L = 1,5 \text{ m}$ est raccordée à une portion circulaire BC de centre O, de rayon $R = 2 \text{ m}$ et d'angle au centre $\theta = 45^\circ$. Un enfant lance un corps ponctuel de masse $m = 100 \text{ g}$; sa vitesse lorsqu'elle passe au point A est $V_A = 5 \text{ m/s}$.

1. Calculer la longueur totale de la piste ABC et en déduire l'expression du travail du poids $\vec{P}$ pour aller de A à C. 1pt
2. Calculer l'énergie potentielle du point C (on prendra la référence en A et on posera $Z_A = 0$). 0.5pt
3. En réalité, la vitesse d'arrivée du solide en C vaut $2,8 \text{ m/s}$. Montrer qu'il existe des frottements, dont on calculera l'intensité. 1pt
On prendra $g = 9,8 \text{ ms}^{-2}$.

Exercice 3 : Utilisation des acquis

/4pts

Considérons le système suivant formé par une piste et un ressort, piste sur laquelle se déplace une bille.

Cette piste est constituée d'une portion rectiligne AB inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal et une partie circulaire BC de rayon r , raccordée à AB au point B. Une bille (S), supposée ponctuelle, de masse m , est abandonnée en A, sans vitesse initiale. Les frottements sont négligés sur les portions AB et BC, mais ils sont assimilés à une force unique f constante sur le tronçon horizontal CD et parallèle au plan contenant CD. On donne : $AB = L = 2,5 \text{ m}$; $r = OB = OC = 1,25 \text{ m}$; $f = 2 \text{ N}$

- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer les vitesses de la bille aux points B et C. (1pt)
- En C, on place un ressort de raideur $k = 200 \text{ N.m}^{-1}$. La bille heurte en C, le ressort avec la vitesse v_C acquise précédemment, qu'elle comprime au maximum d'une valeur $L_0 = 25 \text{ cm}$ jusqu'au point D.
 - Le principe de conservation de l'énergie mécanique est-il vérifié sur le tronçon CD ? Justifier. (0.5pt)
 - Montrer que $kL_0^2 + 2fL_0 = m.v_C^2$ et en déduire la masse m de la bille. (1.5pt)
- On suppose à présent que la bille (S) n'est plus ponctuelle, mais est sphérique de rayon $R = 2 \text{ cm}$. Exprimer, puis calculer la nouvelle valeur de la vitesse de la bille au point B en supposant que sa masse n'a pas changé et qu'elle roule sans glisser entre A et B. (1pt)

Partie 2 : Evaluation des compétences

/ 8 Points

Situation problème : Force de frottement

Une voiture de masse $m = 1 \text{ tonne}$ grimpe à vitesse constante une colline assimilée à un plan incliné d'un angle $\alpha = 10^\circ$ par rapport à l'horizontal sous l'action d'une force motrice $\vec{F}$ parallèle à la ligne de plus grande pente. Les forces de frottement s'opposant au mouvement du mobile et de même direction que $\vec{F}$ équivalent à une force unique de module f . Si l'intensité de cette force de frottement est supérieure à 1000 N , la voiture va s'arrêter automatiquement sur cette colline et rebrousser chemin. Le système de freinage ayant été endommagé. Le conducteur de cette voiture inquiet, a relevé au cours de cette ascension (sur le premier kilomètre) à l'aide d'un capteur intégré, les variations du travail de la force motrice $\vec{F}$ en fonction du déplacement x de la voiture. Les résultats enregistrés sont consignés dans le tableau ci-dessous :

x [en km]	0.03	0.05	0.08	0.11	0.15	0.22
$W(\vec{F})$ [en kJ]	78.75	131.25	210	288.75	393.75	577.5

Vous êtes un passager de cette voiture et le conducteur vous interpelle.

Tâche : Aider le conducteur de cette voiture à se rassurer.

Consigne : On représentera le graphe donnant les variations du travail de la force motrice $\vec{F}$ en fonction du déplacement x de la voiture. $W(\vec{F}) = f(x)$.

On donne $g = 10 \text{ N/Kg}$.