Grand prof de Maths

Cours de Tle C

CHAP 1 : ARITHMETIQUE

I/ Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Cours rédigé par **OUAFEU TOKAM GUY PAULIN**

Date : 23 Août 2018

Objectifs pédagogiques :

A la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- Déterminer l'ensemble des diviseurs et des multiples d'un entier relatif.
- Utiliser les règles de calculs sur les congruences pour déterminer le reste de la division euclidienne.
- Utiliser les règles de calcul sur les congruences pour déterminer les critères de divisibilité en base 10.

1) Relation de divisibilité :

a/ Définition :

Soient $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}^*$, on dit que a est divisible par b ou que b est un diviseur de a , ou que a est un multiple de b s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$. Cette relation entre a et b se note $a|b$.

Exemple : $3|21$ car $21 = 7 \times 3$, $5|5$ car $5 = 5 \times 1$

Remarque : L'ensemble des diviseurs d'un entier b est noté $\mathcal{D}(b)$ et l'ensemble des multiples d'un entier relatif a est noté $a\mathbb{Z}$.

Exemples : $2\mathbb{Z} = \{\dots; -6; -4; -2; 0; 2; 4; 6; \dots\}$ et $\mathcal{D}(6) = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$

Resolvons dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(x-1)(y+3) = 21$

Comme $x-1$ et $y+3$ sont des entiers relatifs, il s'en suit que $(x-1)|21$ et $(y+3)|21$

Or $\mathcal{D}(21) = \{-21; -7; -3; -1; 1; 3; 7; 21\}$

D'où les systèmes suivants : $\begin{cases} x-1 = 21 \\ y+3 = 1 \end{cases}$; $\begin{cases} x-1 = 1 \\ y+3 = 21 \end{cases}$;

$\begin{cases} x-1 = -21 \\ y+3 = -1 \end{cases}$; $\begin{cases} x-1 = -1 \\ y+3 = -21 \end{cases}$; $\begin{cases} x-1 = 3 \\ y+3 = 7 \end{cases}$; $\begin{cases} x-1 = 7 \\ y+3 = 3 \end{cases}$; $\begin{cases} x-1 = -3 \\ y+3 = -7 \end{cases}$; $\begin{cases} x-1 = -7 \\ y+3 = -3 \end{cases}$

Donc $S = \{(22; -2); (2; 19); (-20; -4); (0; -24); (4; 4); (8; 0); (22; -2); (-2; -10); (-6; -6)\}$

Activité d'apprentissage

Énoncé :

Soient x, y, z et t des entiers relatifs non nuls. Répondre aux questions ci-dessous en se servant de la définition de la divisibilité.

(i) On suppose que $x|y$ et $y|x$. Justifier l'existence de deux entiers relatifs k_1 et k_2 tels que $x = y k_1$, $y = x k_2$ et $k_1 k_2 = 1$. Puis conclure.

(ii) On suppose que $t|x$ et $t|y$, Justifier l'existence d'un entier relatif k tel que $mx+ny=tk$ quels que soient m et n entiers relatifs. Puis conclure .

(iii) On suppose que $x|y$ et $z|t$, Justifier l'existence d'un entier relatif k tel que $yt=xzk$. Conclure et en déduire que $x^m|y^m$, m étant un entier naturel.

(iv) On suppose que $x|y$ et d un entier non nul, Justifier l'existence d'un entier relatif k tel que $yd=xdk$. Conclure .

(v) On suppose que $x|y$, montrer que tout multiple de y est multiple de x .

(vi) On suppose que $x|y$, montrer que $|x| \leq |y|$.

Solution de l'activité d'apprentissage :

(i) On sait par hypothese que : ($x|y \Leftrightarrow \exists k_1 \in \mathbb{Z} / y = k_1 x$) et ($y|x \Leftrightarrow \exists k_2 \in \mathbb{Z} / x = k_2 y$),

d'où $y = k_1 x = k_1 k_2 y$; par conséquent $k_1 k_2 = 1$ car y est non nul.

Or ($(k_1 k_2 = 1 \text{ et } k_1, k_2 \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow (k_1 = k_2 = 1 \text{ ou } k_1 = k_2 = -1)$), donc $x = y$ ou $x = -y$.

(ii) On sait par hypothese que ($t|x \Leftrightarrow \exists k'' \in \mathbb{Z} / x = k'' t$) et ($t|y \Leftrightarrow \exists k' \in \mathbb{Z} / y = k' t$),

d'où $mx + ny = mk'' t + nk' t = (mk'' + nk') t$. Il suffit de poser $k = mk'' + nk'$, Il s'en suit que $t|mx+ny$.

(iii) On sait par hypothese que ($x|y \Leftrightarrow \exists k_1 \in \mathbb{Z} / y = k_1 x$) et ($z|t \Leftrightarrow \exists k_2 \in \mathbb{Z} / t = k_2 z$),

d'où $yt = k_1 x k_2 z = k_1 k_2 zx$. Il suffit de prendre $k = k_1 k_2$, il s'en suit que $xz|yt$. (1)

En particulier, Supposons $x|y$ et montrons que $x^m|y^m$. Procédons par recurrence ;

Soit $P(m)$ la proposition : " $x^m|y^m$ pour tout entier naturel m " .

Si $m=1$, on a $x|y$ qui est vraie par hypothese . Soit m un entier naturel stictement supérieur à 1, supposons que $P(m)$ est vraie et montrons que $P(m+1)$ est aussi vraie . C'est-à-dire que $x^{m+1}|y^{m+1}$.

On sait que $P(m)$ vraie signifie $x^m|y^m$ (2) . De plus par hypothese, $x|y$ (3). En appliquant la propriété montrée precedemment (1) aux relations (2) et (3) on obtient $x^m \times x | y^m \times y$, c'est-à-dire $x^{m+1}|y^{m+1}$.

d'où $P(m+1)$ est vraie. Donc $p(m)$ est vraie pour tout entier naturel m .

(iv) évident

(v) Supposons $x|y$ et montrons que x divise tout multiple de y . Soit t un multiple de y , alors il existe k élément de $\mathbb{Z}$ tel que $t = ky$. Puisque $x|y$, alors il existe k' élément de $\mathbb{Z}$ tel que $y = k'x$. Ainsi, t peut s'écrire $t = k k'x$ avec kk' element de $\mathbb{Z}$; donc $x|t$.

(vi) Par hypothese , ($x|y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}^* / y = kx$) , d'où $|y| = |k| \cdot |x|$. Or $|k| \geq 1$

Il s'ensuit que $|y| \geq |x|$.

b/ Propriétés :

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}^*$

P1: $a|b$ et $b|a \Leftrightarrow a = b$ ou $a = -b$;

P2: Si $d|a$ et $d|b$ alors pour tous entiers relatifs u et v , $d|(au+bv)$;

P3: Si $a|b$ et $c|d$, alors $ac|bd$;

P4: Si $a|b$, alors pour tout entier naturel k , $a^k|b^k$;

P₅ : Si d est un entier relatif non nul , alors $a|b \Leftrightarrow ad|bd$;

P₆ : Si $b|a$, alors $a\mathbb{Z} \subset b\mathbb{Z}$.

P₇ : Si $b|a$ alors $|b| \leq |a|$

Exercices d'applications :

Exercice 1 :

- 1) 2^n divise-t-il 4^n pour tout entier n ?
- 2) Montrer que $|n^2 - 1| \leq |n^4 - 1|$ pour tout entier relatif n .
- 3) Montrer que si n est impair, alors $n(n^2+3)$ est pair.
- 4) a. Trouver les entiers naturels strictement supérieurs à 1 dont les cubes divisent 18360.
b. En déduire dans $\mathbb{N}$, la résolution de l'équation $b^3(2b^2 + 2b + 1) = 18360$.

Exercice 2 :

Soit n un entier naturel non nul et différent de 1. On pose $A = n^2 - 2n + 2$, $B = n^2 + 2n + 2$

- a) Factoriser $n^4 + 4$
- b) Montrer que $A|n^4 + 4$ et $B|n^4 + 4$
- c) Montrer que tout diviseur de A qui divise n divise 2.
- d) Montrer que tout diviseur commun de A et B divise $4n$

2) Division Euclidienne

a/ Axiomes fondamentaux de $\mathbb{N}$:

Nous admettons les axiomes suivants sur la structure de l'ensemble des entiers naturels

Principe du bon ordre

- Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.
- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ admet un plus grand élément.

Principe de descente infinie :

- Toute suite d'entiers naturels strictement décroissante est stationnaire à partir d'un certain rang.

Activité d'apprentissage

Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. On pose $Q = \{ k \in \mathbb{N} / a - bk \geq 0 \}$. On suppose dans un premier temps que $a \geq 0$

- (i) Justifier que Q est non vide.
- (ii) Justifier que Q est majoré par a et qu'il admet un plus grand élément q .
- (iii) On pose $r = a - bq$, Justifier que $r \geq 0$ et que $r < b$.

On suppose dans un second temps que $a < 0$, on pose $Q' = \{ k \in \mathbb{N} / -a \geq bk \}$. D'après ce qui précède on sait qu'il existe un couple $(q,r) \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{N})$ tel que $-a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.

- (iv) Si $r = 0$, déterminer q' et r' tel que $a = bq' + r'$ avec $0 \leq r' < b$.
- (v) Si $r \geq 1$, montrer que en posant $q' = -q - 1$ et $r' = b - r$, on peut écrire que $a = bq' + r'$ avec $0 \leq r' < b$

Soient (q,r) , $(q',r') \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{N})$ tels que $a = bq + r = bq' + r'$, $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$ et $q \neq q'$

- (vi) Justifier que $b \leq |r - r'| < b$, puis en déduire une absurdité.
- (vii) En déduire que $r = r'$ et $q = q'$.

b/ Théorème :

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$. Il existe un unique couple $(q,r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < |b|$. Dans cette expression a est appelé le dividende, b le diviseur, q le quotient et r le reste.

Exemple : La division Euclidienne de 12839 par 2567 s'écrit par $12839 = 5 \times 2567 + 4$

La division Euclidienne de -26 par 5 s'écrit par $-26 = 5 \times (-6) + 4$

Exercice d'application : Déterminer tous les chiffres dont le reste de la division euclidienne par 2 est 4

3) Système de numération

a/Définition :

Soit $a \in \mathbb{N}$, $a > 1$ et $x \in \mathbb{N}^*$. L'expression $x = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_2 a^2 + x_1 a + x_0$ avec $x_n \neq 0$, $0 \leq x_i < a$ pour tout $i = 0, \dots, n$; est l'écriture de x dans le système de numération de base a . On note $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$

Exemple : $18 = \overline{10010}^2 = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4$, $35 = \overline{1022}^3$

Remarques :

R1 : l'écriture $\overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}$ ou $x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0$ est dans la base 10 ou décimale

R2 : En base 16 ou hexadécimale, on représente les nombres 10, 11, 12, 13, 14, 15 respectivement par A, B, C, D, E, F.

R3 : La base 2 est appelée base binaire, elle n'utilise que des chiffres 0 et 1.

Exercice d'application :

i) Ecrire en base 6 le nombre 453

ii). Un nombre s'écrit 36723 dans le système décimal et $\overline{442003}^b$ en base b . Déterminer b

4) Relation de congruence :

a/Définition (congruence modulo un entier)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a est congru à b modulo n si $n \mid (a-b)$, c'est-à-dire s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a-b = kn$. On note $a \equiv b \pmod{n}$ ou $a \equiv b [n]$; se lit ' a congru à b modulo n '

Exemple : $6 \equiv 1 \pmod{5}$ car $6 - 1 = 5 = 5 \times 1$; $25 \equiv 4 \pmod{7}$ car $25 - 4 = 21 = 7 \times 3$; $6 \equiv -1 \pmod{7}$

Activité d'apprentissage :

Soit a et b deux entiers relatifs, n un entier naturel tels que $a \equiv b \pmod{n}$. On désigne par r, r', q et q' respectivement les restes et quotients de a et b dans la division euclidienne par n .

(i) Montrer que $a-b = n(q-q') + (r-r')$

(ii) En déduire que $r = r'$

Solution : (i) On sait par hypothèse que $a = nq+r$ et $b = nq'+r'$, par conséquent $a-b = (nq+r) - (nq'+r') = nq+r - nq'-r' = n(q-q') + (r-r')$.

(ii) On sait par hypothèse que $a \equiv b \pmod{n}$, ce qui veut dire que $a-b$ est multiple de n . Entre autres $a-b = n(q-q') + (r-r')$ traduit l'écriture de la division euclidienne de $a-b$ par n à condition que $r > r'$ car $r-r' < |b|$. Sinon, considérer $b-a = n(q'-q) + (r'-r)$. Comme $a-b$ est multiple de n , $r-r' = 0$. D'où $r = r'$.

Propriété : Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n .

Exemple : On sait que $11 \equiv 6 \pmod{5}$, or le reste de la division euclidienne de 6 par 5 est 1. D'où 1 est aussi le reste de la division euclidienne de 11 par 5.

Conséquence : Si $a \equiv b \pmod{n}$ et que $0 \leq b < n$ alors b est le reste de la division euclidienne de a par n .

Ainsi les restes possibles de la division euclidienne d'un entier relatif a par un entier naturel n sont $0; 1; 2; 3 \dots; n-1$.

b/ Propriétés :

P1 : $a \equiv a \pmod{n}$

P2 : Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a \equiv c \pmod{n}$

P3 : Si $a \equiv a' \pmod{n}$, $b \equiv b' \pmod{n}$ alors : $a+b \equiv a'+b' \pmod{n}$

P4 : Si $a \equiv a' \pmod{n}$, $b \equiv b' \pmod{n}$ alors : $ab \equiv a'b' \pmod{n}$

P₅: Si $a \equiv a' \pmod{n}$, $k \in \mathbb{Z}^*$ alors : $ka \equiv ka' \pmod{n}$

P₆: Si $a \equiv a' \pmod{n}$, $k \in \mathbb{Z}^*$ alors : $a^k \equiv a'^k \pmod{n}$

P₇: $a \equiv 0 \pmod{n} \Leftrightarrow a$ est multiple de n

Remarque: Si $\text{pgcd}(k, n) = 1$, alors $(ka \equiv ka' \pmod{n} \text{ avec } k \in \mathbb{Z}^*) \Rightarrow (a \equiv a' \pmod{n})$

Preuve des propriétés:

P₁: $a - a = 0$ qui est un multiple de n . D'où le résultat

P₂: Supposons que $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$

Il s'ensuit qu'ils existent deux entiers k et k' tels que $a - b = kn$ et $b - c = k'n$

D'où $a - c = (a - b) + (b - c) = kn + k'n = (k + k')n$, donc $a - c$ est multiple de n et $a \equiv c \pmod{n}$

P₃: Supposons que $a \equiv a' \pmod{n}$ et $b \equiv b' \pmod{n}$

Il s'ensuit qu'ils existent deux entiers k et k' tels que $a - a' = kn$ et $b - b' = k'n$

D'où $a + b = a' + kn + b' + k'n = (a' + b') + (n + n')k$, ce qui implique $(a + b) - (a' + b')$ est multiple de n

Donc $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$

P₄: Supposons que $a \equiv a' \pmod{n}$ et $b \equiv b' \pmod{n}$

Il s'ensuit qu'ils existent deux entiers k et k' tels que $a - a' = kn$ et $b - b' = k'n$

D'où $ab = (a' + kn)(b' + k'n) = a'b' + a'k'n + knb' + kk'n^2 = a'b' + n(a'k' + kb' + kk'n)$

Donc $ab \equiv a'b' \pmod{n}$

P₅: Supposons que $a \equiv a' \pmod{n}$, soit $k \in \mathbb{Z}^*$

Il s'ensuit qu'il existe un entier k' tels que $a - a' = k'n$, en multipliant cette égalité par k on obtient

$k(a - a') = kk'n$, Ce qui signifie $(ka - ka') = kk'n$, donc $ka \equiv ka' \pmod{n}$

P₆: Supposons que $a \equiv a' \pmod{n}$, soit $k \in \mathbb{Z}^*$ et $p(k)$ la proposition $a^k \equiv a'^k \pmod{n}$

Pour $k = 1$, on a $a \equiv a' \pmod{n}$. Ce qui est vraie par hypothèse. Donc $p(1)$ est vraie

Soit $k > 1$. supposons que $p(k)$ est vraie et montrons que $p(k+1)$ est aussi vraie, c'est-à-dire que

$a^{k+1} \equiv a'^{k+1} \pmod{n}$. D'après la propriété 4, $a^k \equiv a'^k \pmod{n}$ et $a \equiv a' \pmod{n}$ impliquent que

$a^k \times a \equiv a'^k \times a' \pmod{n}$. D'où le résultat.

P₇: Soit a tel que $a \equiv 0 \pmod{n}$. Ce qui signifie qu'il existe un entier k tel que $a - 0 = kn$. Donc $a = kn$ est un multiple de n

Exercice d'application :

(i) Trouver le reste de la division euclidienne de 17^{53} par 5

(ii) Déterminer le reste de la division euclidienne par 3 de 2^n , pour n entier naturel

(iii) En déduire les solutions x dans $\mathbb{N}$ de $2^n \equiv x - 4 \pmod{3}$ en fonction de tout entier naturel n .

(iv) Résoudre dans $\mathbb{Z}$, $n^3 + 2n + 1 \equiv 1 \pmod{4}$

(v) Soit $A = \overline{5x23}^6$, montrer que $A \equiv x - 4 \pmod{7}$. En déduire la valeur de x pour laquelle A est divisible par 7.

4) Congruence et critères de divisibilités :

Activité d'apprentissage :

I. Soit $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$ tel que $a \mid x$

i) Justifier l'existence d'un entier q tel que $x_0 = (q - x_n a^{n-1} - x_{n-1} a^{n-2} - \dots - x_1) a$

ii) En déduire que $x_0 = 0$

iii) Réciproquement, si on suppose que $x_0 = 0$, montrer que $a \mid x$

iv) En déduire la règle de divisibilité en base 10

II. Dans cette partie $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots \dots x_1 x_0}^{10}$

- Montrer que $x = (x_n 10^{n-1} + x_{n-1} 10^{n-2} + \dots + x_1) 10 + x_0$
- En déduire que $x \equiv x_0 \pmod{2}$ et $x \equiv x_0 \pmod{5}$
- Si $x \equiv 0 \pmod{2}$ (respectivement $x \equiv 0 \pmod{5}$), déterminer x_0

III. Dans cette partie $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots \dots x_1 x_0}^{10}$

- Montrer que $x = (x_n 10^{n-2} + x_{n-1} 10^{n-3} + \dots + x_2) 10^2 + x_1 10 + x_0$
- En déduire que $x \equiv \overline{x_1 x_0} \pmod{4}$ et $x \equiv \overline{x_1 x_0} \pmod{25}$
- Si $x \equiv 0 \pmod{4}$ (respectivement $x \equiv 0 \pmod{25}$), déterminer $\overline{x_1 x_0}$

IV. Dans cette partie $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots \dots x_1 x_0}^{10}$

- Montrer que pour tout entier naturel i on a $10^i \equiv 1 \pmod{3}$ et $10^i \equiv 1 \pmod{9}$
- En déduire que $x \equiv x_n + x_{n-1} + \dots + x_2 + x_1 + x_0 \pmod{3}$ (respectivement $\pmod{9}$)
- Si $x \equiv 0 \pmod{3}$ (respectivement $x \equiv 0 \pmod{9}$), déterminer $x_n + x_{n-1} + \dots + x_2 + x_1 + x_0$

V. Dans cette partie $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots \dots x_1 x_0}^{10}$

- Montrer que pour tout entier naturel p , $10^p \equiv (-1)^p \pmod{11}$
- En déduire que $x \equiv (-1)^n x_n + (-1)^{n-1} x_{n-1} + \dots + (-1)^2 x_2 + (-1)^1 x_1 + (-1)^0 x_0 \pmod{11}$
- En déduire que $x \equiv (x_0 + x_2 + x_4 + \dots) - (x_1 + x_3 + x_5 + \dots) \pmod{11}$

Propriétés :

Soit $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots \dots x_1 x_0}^{10}$

P₁ : x est divisible par 2 (respectivement par 5) si et seulement si $x_0 \equiv 0 \pmod{2}$ (respectivement $x_0 \equiv 0 \pmod{5}$)

P₂ : x est divisible par 4 (respectivement par 25) si et seulement si $x_1 x_0 \equiv 0 \pmod{4}$ (respectivement $x_1 x_0 \equiv 0 \pmod{25}$)

P₃ : Un entier est divisible par 3 (respectivement par 9) si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (respectivement par 9)

P₄ : Un entier est divisible par 11 si et seulement si la somme des chiffres de rang paire diminué de la somme des chiffres de rang impair est multiple de 11

Exercice d'application :

1/ Déterminer le reste de la division de 478987 par 4 et par 25

2/ Montrer que 5296 est divisible par 4

3/ Vérifier que 12475 est divisible par 25

4/ Déterminer le reste de la division de 478987 par 3.

5/ 165789 est-il multiple de 11 ?

Devoirs :

1) Pour tout entier naturel n , on pose $A_n = 2^n + 2^{2n} + 2^{3n}$.

a/ Montrer que $A_{n+3} \equiv A_n \pmod{7}$.

b/ Déterminer l'ensemble S des entiers naturels n tels que $A_n \equiv 0 \pmod{7}$

c/ Les nombres $x = \overline{1110^2}$, $y = \overline{1010100^2}$, $z = \overline{1001001000^2}$ sont-ils divisibles par 7 ?

2) a/ Déterminer $n \in \mathbb{N}$ tels que $5^{2n} + 5^n$ soit divisible par 13.

b/ Déterminer suivant les valeurs de $n \in \mathbb{Z}$, le reste de la division euclidienne par 3 de $B = 2n^3 - n^2 + 2$.

3) Un nombre entier $N = \overline{abcca^5} = \overline{bbab^8}$

a/ Montrer que $309a + 15c = 226b$.

b/ Montrer que $2b \equiv 0 \pmod{3}$; en déduire b .

c/ Montrer que $3a \equiv 1 \pmod{5}$; en déduire a et c

d/ Ecrire N dans la base 10.

NOMBRES COMPLEXES TERMINALE C

INTRODUCTION

Activité :

Soient les équations suivantes :

$$(E_1): x^2 - 1 = 0$$

$$(E_2): x^2 + 1 = 0$$

$$(E_3): 2x^2 + 8 = 0$$

- 1) Résoudre dans IR si possible ces équations
- 2) Dans le cas où l'équation n'admet pas de solution dans IR ; supposer qu'il existe un nombre i tel que $i^2 = -1$ et continuer la résolution.

Résumé :

Il existe un ensemble noté C appelé ensemble des nombres complexes qui possèdent les propriétés suivantes :

P1) C contient l'ensemble des nombres réels IR

P2) l'addition et la multiplication des nombres réels se prolongent dans l'ensemble C et les règles de calcul sont les mêmes.

P3) Il existe dans l'ensemble C un nombre imaginaire noté i vérifiant $i^2 = -1$

P4) Tout nombre complexe z s'écrit de façon unique $z = a + ib$ avec a et b des nombres réels. Cette écriture est appelée forme algébrique du complexe z .

Exemple : $z = 4 + 2i$; $z = 5 + i$; $z = 6$; $z = 5i$ sont des nombres complexes.

I- ETUDE ALGEBRIQUE

1- Forme algébrique d'un nombre complexe

Définition 1 : L'écriture $z = a + ib$ avec $a; b \in \mathbb{R}$ est appelée **forme algébrique** de z .

a est appelé **partie réelle** de z et noté $\text{Re}(z)$

b est appelé **partie imaginaire** de z et noté $\text{Im}(z)$.

- 1) Si $b=0$; $z=a$ est dit réel ;
- 2) Si $a=0$ $z=ib$ est dit imaginaire pur.

L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$ et l'ensemble des imaginaires purs non nul $i\mathbb{R}^*$. Tous sont des sous-ensembles de C.

Exemple : $z_1 = 2 + 3i$; $z_2 = 2i$; $z_3 = 4$

$$\text{Re}(z_1)=2 \quad \text{Im}(z_1)=3 \quad \text{Re}(z_2)=0 \text{ etc....}$$

- Deux nombres complexes $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ sont égaux ssi $a=a'$ et $b=b'$.
- Un nombre complexe $z = a + ib$ est nul ssi $a = 0$ et $b = 0$.

2- Nombre complexe conjugué

Définition 2 : soit $z = a + ib$ On appelle **conjugué** de z le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$

Exemple : $z_1 = 2 + 3i$; $z_2 = 4$; $z_3 = 7i$

$$\bar{z}_1 = 2 - 3i; \bar{z}_2 = 4; \bar{z}_3 = -7i$$

Propriétés:

P1) $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$

P2) $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$

P3) $\text{Re}(\bar{z}) = \text{Re}(z)$

P4) $\text{Im}(\bar{z}) = -\text{Im}(z)$

P5) $\bar{\bar{z}} = z$

P6) $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$

P7) $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$

P8) $z \in \mathbb{R} \leftrightarrow z = \bar{z}$

P9) $z \in i\mathbb{R} \leftrightarrow z = -\bar{z}$

P10) si $z \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}$ alors $\bar{z}^n = (\bar{z})^n$

P11) si $z' \neq 0$ alors $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$

Démonstration: TAF

Exemple: Déterminer la forme conjuguée des nombres complexes suivants :

$z_1 = (3 + 2i)^5$ $z_2 = \frac{1+i}{3-4i}$

3- Opérations dans C

Propriétés: soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes.

$z + z' = a + ib + a' + ib' = a + a' + i(b + b') = A + iB \in \mathbb{C}$

avec $A = a + a' \in \mathbb{R}$ et $B = b + b' \in \mathbb{R}$.

$z \times z' = (a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ba' + ab') = A + iB \in \mathbb{C}$

avec $A = aa' - bb' \in \mathbb{R}$ et $B = ab' + ba' \in \mathbb{R}$.

.si $z \neq 0$ $\frac{z'}{z} = \frac{a+ib}{a'+ib'} = \frac{(a'+ib')(a-ib)}{(a+ib)(a-ib)} = \frac{a'a+b'b}{a^2+b^2} + i \frac{ab'-a'b}{a^2+b^2} \in \mathbb{C}$.

4- Formule de binôme de newton

Propriétés

Soient $z, z' \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}$,

$(z+z')^n = C_n^0 z^n + C_n^1 z^{n-1} z' + C_n^2 z^{n-2} z'^2 + \dots + C_n^{n-2} z^2 z'^{n-2} + C_n^{n-1} z z'^{n-1} + C_n^n z'^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z^{n-k} z'^k$

$z z'^{n-1} + C_n^n z'^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z^{n-k} z'^k$

Rappel : triangle de pascal

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \quad 1 \\ 1 \quad 2 \quad 1 \\ 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\ 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\ 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1 \end{array}$$

Exemple : $(z+z')^0 = 1$ si $z + z' \neq 0$; $(z + z') = z + z'$; $(z + z')^2 = 1z^2 + 2zz' + 1z'^2$; $(z + z')^3 = 1z^3 + 3z^2z' + 3zz'^2 + 1z'^3$.

Exercice :

Calculer $(3-2i)^4$.

5-Module d'un nombre complexe

Définition 3 :

soit $z = a + ib$ un nombre complexe. On appelle **module** de z , le nombre réel

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Exemple : Déterminer les modules des nombres complexes suivants : $z = 2 + 5i$;

$$z = 4 - 3i; z = -i; z = -5$$

Propriétés : soient $(z, z') \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{C}$.

$$P_1) |z \times z'| = |z| \times |z'|$$

$$P_2) \text{ si de plus } z' \neq 0, \text{ on a } \begin{cases} \left| \frac{1}{z'} \right| = \frac{1}{|z'|} \\ \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \end{cases}$$

$$P_3) \forall n \in \mathbb{C}^*, |z^n| = |z|^n$$

$$P_4) |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$P_5) |z + z'| \leq |z| + |z'| \text{ (Inégalité triangulaire)}$$

$$P_6) |z| = |-z| = |\bar{z}|$$

$$P_7) |\bar{z} \times \bar{z}| = a^2 + b^2 = |z|^2 \text{ avec } z = a + ib$$

$$P_8) |\operatorname{Re}(z)| \leq |z|, \operatorname{Im}(z) \leq |z|.$$

6-Représentation graphique

Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$ un repère du plan complexe et $z = a + ib$ un nombre complexe, le point $M(a, b)$ dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est appelé *point image*

Du complexe z et z est appelé affixe du point M .

Le vecteur $\vec{V}(a, b)$ est le vecteur image de z et z est appelé affixe du vecteur $\vec{u}$

Dans ce repère, l'axe des abscisses devient l'axe des réels, l'axe des ordonnées devient l'axe des imaginaires purs.

Remarque :

si $A(z_A)$ et $B(z_B)$ alors :

$$\overrightarrow{AB}(z_B - z_A) \quad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = AB$$

$$|z_{\overrightarrow{AB}}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = AB.$$

II- ETUDE TRIGONOMETRIQUE

On prendra $(O, \vec{u}, \vec{v})$ repère orthonormé direct du plan

1- forme trigonométrique d'un nombre complexe

Activité :

En notant $M(z)$ l'affixe de z donner une mesure de chacun des angles orientés $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ dans les cas suivants. On les notera respectivement θ_1 et θ_2 .

1^{er} cas $z_1 = \sqrt{3} - i$. 2^e cas $z_2 = 1 + i$.

$$\theta = \text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) \quad \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{\det(\vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}.$$

θ_1 est appelé argument de z_1 . on note $\theta_1 = \text{arg} z_1$

θ_2 est appelé argument de z_2 . on note $\theta_2 = \text{arg} z_2$.

Définition 4:

z est nombre non nul, M le point image de z dans le plan complexe. On appelle **argument de z** Toute mesure notée $\text{arg} z$ de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$. L'argument de z est encore appelé **argument principal** de z .

Exemple : on a le tableau

Z	1	i	-1	-i	$1+i$	$-1+i$	$1-i$	$-1-i$
$\text{arg}(z)$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{3\pi}{4}$

Remarque: on n'attribue pas d'argument au nombre complexe 0.

2- Détermination pratique

Si $z = a + ib \in \mathbb{C}$ et $\theta = \text{arg} z$ alors on a :

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{a}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{b}{|z|}$$

Exemple : $z = 1 + i\sqrt{3}$

- ✓ **Propriétés:** soit $z \in \mathbb{C}^*$; $z' \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$
 $\text{arg}(\bar{z}) = -\text{arg}(z) [2\pi] = -\text{arg}(z) + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.
- ✓ $\text{arg}\left(\frac{1}{z}\right) = -\text{arg}(z) + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.
- ✓ $\text{arg}(z \times z') = \text{arg}(z) + \text{arg}(z') + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.
- ✓ $\text{arg}\left(\frac{z}{z'}\right) = \text{arg}(z) - \text{arg}(z') + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $z' \neq 0$.
- ✓ $\text{arg}(z^n) = n\text{arg}(z) + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.
- ✓ $\text{arg}(-z) = \text{arg}(z) + \pi + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.
- ✓ Si $z \in \mathbb{R}^*$, $\text{arg} z = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$
- ✓ Si $z \in i\mathbb{R}^*$, $\text{arg} z = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

Définition 5: si $z = a + ib$ est un nombre complexe de module $|z| = r$ et d'argument θ ; alors l'écriture $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ est appelée forme trigonométrique de z . $z = [r ; \theta]$ est appelée forme polaire de z .

Remarque:

Pour déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe, on procède comme suit :

Si $z = a + ib$

- on calcule $|z| = r$.
- on détermine θ à partir de $\begin{cases} \cos\theta = \frac{a}{r} \\ \sin\theta = \frac{b}{r} \end{cases}$

Exemple :

Donner la forme trigonométrique des nombres complexes :

$$z_1 = \frac{1}{3} + i\frac{\sqrt{3}}{3}; \quad z_2 = 1 + i; \quad z_3 = \sqrt{6} - i\sqrt{2}.$$

3- Egalité de deux nombres complexes

Soient z et z' deux nombres complexes non nuls

$$z=z' \Leftrightarrow |z| = |z'| \text{ et } \arg(z) = \arg(z') + k2\pi \quad [k \in \mathbb{Z}].$$

4- Argument d'un produit et d'un quotient

Propriétés: soient $z_1 = [r_1; \theta_1]; z_2 = [r_2; \theta_2]$. on a :

1. $\bar{z}_1 = [r_1, -\theta_1]$
2. $z_1 = z_2 \Leftrightarrow [r_1, \theta_1] = [r_2, \theta_2] \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = r_2 \\ \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Théorème : (formule de Moivre)

Pour tout nombre réels θ , pour tout entier relatif n ,

$$z^n = (\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta.$$

Exemple: écrire $1+i$ sous la forme trigonométrique puis déduire $(1+i)^{15}$ en utilisant la formule de moivre.

Calculer $\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2009}$

5- forme exponentielle d'un nombre complexe

Dans la formule de Moivre, on remarque que l'argument se comporte comme l'exposant. On convient à noter : $\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$

a- définition et propriétés

Définition 6: si $z = a + ib$ est un complexe de module r et d'argument θ alors l'écriture $z=re^{i\theta}$ est appelée **forme exponentielle** de z .

Exemple : $z_1=-1-i \quad z_2=1+i\sqrt{3}$

Remarque : (conséquences)

- Quels que soit les réels a et b on a :
 $e^{ia} \times e^{ib} = e^{i(a+b)}$

Et pour tout $r_1 > 0$ et $r_2 > 0$,

$$r_1 e^{ia} \times r_2 e^{ib} = r_1 r_2 e^{i(a+b)}$$

- Quels que soient les réels a ; b r_1 et r_2 avec $r_1 > 0$ et $r_2 > 0$ on a :

$$\frac{r_1 e^{ia}}{r_2 e^{ib}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(a-b)}$$

b- Formule d'Euler

$$\begin{cases} \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta} \\ \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta} \end{cases} \text{ ce qui conduit à :}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

De même,

$$\begin{cases} \cos n\theta + i \sin n\theta = e^{in\theta} \\ \cos n\theta - i \sin n\theta = e^{-in\theta} \end{cases} \text{ ce qui conduit à :}$$

$$\cos n\theta = \frac{e^{in\theta} + e^{-in\theta}}{2} \quad \sin n\theta = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{2i} \quad (\text{Formules d'Euler})$$

6- Nombres complexes et trigonométrie

a) Polynôme trigonométrique

On appelle polynôme trigonométrique une somme de termes du type $\cos^p x \sin^q x$ où $p \in \mathbb{N}$ $q \in \mathbb{N}$

Exemple : $p(x) = \frac{2}{3} \cos x \sin^3 x + 4 \cos^4 x + \sin x$

b) Linéarisation d'un polynôme trigonométrique

Linéariser un polynôme trigonométrique revient à l'écrire sous forme d'une somme de termes du type $\cos mx$ ou $\sin nx$ $m, n \in \mathbb{N}$

Pour cela on peut procéder de la manière suivante :

- On pose

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

- On développe $(e^{ix} + e^{-ix})^n$ ou $(e^{ix} - e^{-ix})^n$
- On applique les propriétés suivantes :

$$\begin{cases} e^{ikx} + e^{-ikx} = 2 \cos kx \\ e^{ikx} - e^{-ikx} = 2i \sin kx \\ e^{ikx} \times e^{-ikx} = 1 \end{cases}$$

Applications :

Linéariser $\sin^5 x$ et $\cos^4 x$

$$\sin^5 x = \frac{1}{16} (\sin x - 5 \sin 3x + 10 \sin 6x)$$

$$\cos^4 x = \frac{1}{8} (\cos 4x + 4 \cos 2x + 3)$$

III- Equations dans C

1- Racine carrée d'un nombre complexe

Définition 7 : soit $Z = a + ib$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$. On appelle **racine carrée** de Z tout nombre complexe z tel que $z^2 = Z$

Exemple : 1 a pour racines carrées 1 et -1

-4 a pour racines $2i$ et $-2i$

détermination pratique des racines carrées d'un nombre complexe

posons $z = x + iy$ et $Z = a + ib$

on a $z^2 = Z$ équivaut à $(x + iy)^2 = a + ib$

donc $z^2 = Z$ équivaut $\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ |z^2| = |Z| \end{cases}$ c'est-à-dire

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2xy = b & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} & (3) \end{cases}$$

Remarque : (1) et (3) permettent de déterminer x et y . (2) permet de déterminer les signes de x et y .

2- racine $n^{\text{ième}}$ d'un nombre complexe

Définition 8 : soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$ et u un nombre complexe non nul. On appelle **racine $n^{\text{ième}}$** de u tout nombre complexe z tel que $z^n = u$.

Détermination des racines $n^{\text{ième}}$ de u

On sait les faire pour $n \leq 2$ par la **méthode algébrique**. Pour $n > 2$ on utilise beaucoup plus la **méthode trigonométrique**.

Méthode

On pose $Z = [r, \theta]$.

Déterminions $z = [\rho, \alpha]$ tel que $z^n = Z$. On a $z^n = [\rho^n, n\alpha]$. Ainsi $z^n = Z$

implique $\begin{cases} r = \rho^n \\ n\alpha = \theta + 2k\pi \end{cases}$ d'où $\begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \\ \alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n} \end{cases}$ avec $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

Propriétés : Soit $re^{i\alpha}$ un nombre complexe non nul et n un entier naturel ($n \geq 2$).

- $re^{i\alpha}$ admet n racines $n^{\text{ième}}$ telles que $z_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$ ($k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$)
- Les images de ces racines sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans un cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{r}$

Application :

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^3 = 1$

Exercice : déterminer les racines $4^{\text{ième}}$ de $z_1 = 1$ et celles de $z_2 = 4 + 4i\sqrt{3}$

3- Résolution d'équation dans C

a- Equation du premier degré

On appelle **équation du premier degré** dans $\mathbb{C}$ toute équation de la forme **(E) : $az + b = 0$** avec $a, b \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$

La solution de (E) est $-\frac{b}{a}$

Exemple : résoudre dans $\mathbb{C}$

$$(E) : (1 - i)z + 3 = -z + i \quad S = \left\{ \frac{-7-5i}{5} \right\}$$

b- Equation du second degré

On appelle **équation du second degré** dans $\mathbb{C}$ toute équation de la forme

$$(E) : az^2 + bz + c = 0 \text{ où } a \in \mathbb{C}^* \text{ } b, c \in \mathbb{C}$$

Pour résoudre (E), on calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$

On distingue deux cas :

1^{er} cas : $\Delta = 0$

$$(E) \text{ admet une solution double } z = \frac{-b}{2a} \text{ et } s = \left\{ \frac{-b}{2a} \right\}$$

2^{ème} cas : $\Delta \neq 0$

posons δ_1 et δ_2 les racines carrées de Δ . On a alors $z_1 =$

$$\frac{-b - \delta_1}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \delta_1}{2a}$$

NB: on peut utiliser δ_2 au lieu de δ_1 et avoir le même résultat.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$(1) : z^2 - 2iz - 2 = 0$$

$$S = \{1 + i, -1 + i\}$$

$$(2) : 2z^2 + 3z + 2 = 0$$

$$S = \left\{ \frac{-3-i\sqrt{7}}{4}; \frac{-3+i\sqrt{7}}{4} \right\}$$

$$(3) : (2 + i)z^2 - (9 + 2i)z + 5(3 - i) = 0$$

$$S = \{3 + i; 1 - 2i\}$$

c- Equation dont la résolution se ramène à celle d'une équation du second degré

Exercice 38, 39, 43 page 227 CIAM Tle SM

IV- Géométrie et nombres complexes

Soit $(o, \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé direct du plan

1- Angles orientés et nombres complexes

Définition 9: soit A, B, C et D quatre points du plan d'affixes respectives

$z_A; z_B; z_C; z_D$ alors :

$$\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \text{arg} \left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \right) + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

Application : On donne A, B, C et D quatre points du plan d'affixes

respectives $z_A = \sqrt{3} + 2i; z_B = \sqrt{3} + i; z_C = -2i; z_D = 1 - i$

Déterminer $\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$

2- Configuration du plan et nombres complexes

Configuration	caractérisation	Caractérisation complexes
(AB) perpendiculaire à (CD)	$\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}^*$
$(AB) // (CD)$	$\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = k\pi$	$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}^*$
A, B, et C alignés	$\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0 + k\pi$	$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
ABC isocèle en A	$AB=AC$ et $\text{mes} \hat{A} = \alpha$ $0 < \alpha < \pi$	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\alpha}$ ou $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{-i\alpha}$

ABC équilatéral	$AB=AC=BC$ et $\text{mes } \hat{A} = \frac{\pi}{3}$	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ ou $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$
ABC rectangle en A	$\text{mes } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$ ou $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = -i$
A, B, C et D cocycliques	$\text{mes } (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$ $\equiv \text{mes } (\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB})[\pi]$	$\arg \left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C} \right)$ $= \arg \left(\frac{z_B - z_D}{z_A - z_D} \right) [\pi]$

CHAPITRE 3 : CALCUL VECTORIEL

Leçon 1 : Généralisation des résultats Barycentriques

1.1 Définitions et barycentres

Définition 1 Soit E un espace vectoriel. Un **espace affine** est un ensemble non vide E muni d'une action du groupe additif de E transitive.

Exemple : Une droite affine est un espace affine de dimension 1.

Un plan affine est un espace affine de dimension 2.

Définition 2 : On appelle point pondéré d'un espace affine $\mathcal{E}$ tout couple (A, α) avec $A \in \mathcal{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exemple 1: On montre que l'ensemble des barycentres de deux points A et B est la droite (AB) .

Exemple 2: On montre que l'ensemble des barycentres de trois points A , B et C est le plan (ABC) .

Définition 3 : Soit $n \in \mathbb{N}$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ n points $\in \mathcal{E}$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Le système $\{(A_1, \alpha_1); (A_2, \alpha_2); \dots; (A_n, \alpha_n)\}$ est appelé système des points pondérés de $\mathcal{E}$. On note $(A_i; \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$.

On désigne par $m = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ la masse système.

Théorème

• Si $m=0$ alors le vecteur $\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ est constant

• Si $m \neq 0$ alors il existe un point G et un seul tel que

$\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$. Le point G est alors appelé le barycentre des points pondérés $(A_1, \alpha_1); (A_2, \alpha_2); \dots; (A_n, \alpha_n)$.

En particulier si $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ alors G est appelé l'isobarycentre des points $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Preuve du Théorème

- Si $m=0$,

Soit O un point fixe

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \sum_{i=1}^n \alpha_i (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA_i}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MO} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OA_i} \\ &= (\sum_{i=1}^n \alpha_i) \overrightarrow{MO} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OA_i} = \vec{0} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OA_i} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OA_i} \text{ qui est un vecteur} \\ &\text{indépendant de M.}\end{aligned}$$

- Si $m \neq 0$,

Soit G un point fixe

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \sum_{i=1}^n \alpha_i (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MG} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} \\ &= (\sum_{i=1}^n \alpha_i) \overrightarrow{MG} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i}. \text{ On définit ainsi un point G tel que} \\ &\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{0}\end{aligned}$$

1.2 Fonction vectorielle de LEIBNIZ

Définition : On appelle **fonction Vectorielle de Leibniz** associé au système des points $(A_i; \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ l'application qui à tout point M de ε associe le vecteur $\overrightarrow{V(M)}$ tel que $\overrightarrow{V(M)} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$.

Exemple : Soit (A,1), (B,-1) et (C,-1) un système de points pondérés du plan.

La fonction vectorielle de Leibniz associée à ce système est :

$$\mapsto \overrightarrow{V(M)} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$$

Remarque : Dans le cas où $m=0$, $\forall M, M' \in \varepsilon$, $\overrightarrow{V(M)} = \overrightarrow{V(M')}$.

La fonction vectorielle de Leibniz a les propriétés suivantes :

Théorème

Soit $(A_i; \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système de points pondérés de l'espace de masse $m = \sum_{i=1}^n \alpha_i$.

- Si $m = 0$ alors le vecteur $\overrightarrow{V(M)} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ est constant
- Si $m \neq 0$, alors il existe un unique point G de l'espace vérifiant $\overrightarrow{V(G)} = \vec{0}$. De plus, pour tout point O de l'espace, on a :

$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$. Cet unique point est appelé barycentre du système $(A_i; \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Proposition :

L'espace étant muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit $(A_i; \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$. On suppose $A_i(x_i, y_i, z_i)$ et $G(x_G, y_G, z_G)$ on a :

$$X_G = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}; Y_G = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} \text{ et } Z_G = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i z_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$$

Remarque :

R₁-On ne modifie pas le barycentre d'un système en multipliant la masse de chaque point par un même nombre non nul. De façon précise ,les systèmes $(A_i; \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(A_i; k\alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ ($k \neq 0$) ont le même barycentre.

R₂-On ne modifie pas le barycentre d'un système de points pondérés en remplaçant plusieurs d'entre eux par leur barycentre

Exemple d'application :

L'espace est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. $A(3, -4, 2)$; $B(1, 5, -2)$ et $C(-4, -1, 2)$.

1-Calcule les coordonnées du barycentre I de $(B,2)$; $(C,3)$

2-Calcule les coordonnées du barycentre J de $(A,5)$; $(B,2)$ et $(C,3)$

3-Vérifie que I est milieu de [AJ]

1.2 Fonction scalaire de LEIBNIZ

Activité

On considère l'application g du plan dans $\mathbb{R}$ qui à tout point M associe le réel $g(M)$ défini par : $g(M) = \alpha MA^2 + \beta MB^2 + \gamma MC^2$ avec $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$

Soit G le barycentre des points massifs $\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$

- 1) Démontrer que $g(M) = (\alpha + \beta + \gamma)MG^2 + \alpha GA^2 + \beta GB^2 + \gamma GC^2$.
- 2) Déterminer $g(A)$, $g(B)$, $g(C)$.
- 3) Montrer que $g(A) = (\alpha + \beta + \gamma)GA^2 + g(G)$; $g(B) = (\alpha + \beta + \gamma)GB^2 + g(G)$ et $g(C) = (\alpha + \beta + \gamma)GC^2 + g(G)$

4) Démontrer que $\alpha g(A) + \beta g(B) + \gamma g(C) = 2(\alpha + \beta + \gamma) g(G)$.

5) Dédurre que

$$g(G) = \frac{\beta\gamma BC^2 + \gamma\alpha CA^2 + \alpha\beta AB^2}{\alpha + \beta + \gamma}$$

Définition : On appelle **fonction scalaire de Leibniz** associé au système des points pondérés $(A_i; \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ l'application $\mathcal{G}$ de $\mathcal{E}$ dans $\mathbb{R}$

$$\mathcal{G} : \mathbf{M} \mapsto \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{MA}_i^2 = \alpha_1 \mathbf{MA}_1^2 + \alpha_2 \mathbf{MA}_2^2 + \dots + \alpha_n \mathbf{MA}_n^2$$

Proposition : Soit G le barycentre de $\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$ avec $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ alors : $\alpha \mathbf{MA}^2 + \beta \mathbf{MB}^2 + \gamma \mathbf{MC}^2 = (\alpha + \beta + \gamma) \mathbf{MG}^2 + \alpha \mathbf{GA}^2 + \beta \mathbf{GB}^2 + \gamma \mathbf{GC}^2$.

Corollaire : Soit G le barycentre de $\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$ avec $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$

$$\text{alors : } \mathcal{G}(G) = \frac{\beta\gamma BC^2 + \gamma\alpha CA^2 + \alpha\beta AB^2}{\alpha + \beta + \gamma}$$

Théorème

Soit $(A_i; \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système de points pondérés de l'espace de masse $m = \sum_{i=1}^n \alpha_i$.

❖ Si $m \neq 0$ alors pour tout réel k , l'ensemble de niveau k de l'application

$$g(\mathbf{M}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{MA}_i^2 \text{ est :}$$

a) Dans le plan : soit le vide, soit le singleton $\{G\}$, soit un cercle de centre G

b) Dans l'espace : soit le vide, soit le point G soit la sphère de centre G .

❖ Si $m=0$, on pose $\vec{V} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{\mathbf{MA}_i}$

a) Si $\vec{V} = \vec{0}$, l'ensemble de niveau k de g est soit le vide soit $\mathcal{E}$.

b) Si $\vec{V} \neq \vec{0}$, l'ensemble de niveau k de g est :

- Dans le plan une droite orthogonale à $\vec{V}$
- Dans l'espace un plan orthogonal à $\vec{V}$

Preuve du théorème

On vérifie que dans le cas $m \neq 0$, on a : $g(\mathbf{M}) = g(G) + (\sum_{i=1}^n \alpha_i) \mathbf{MG}^2$. La relation $g(\mathbf{M}) = k$ conduit donc à $g(G) + m \mathbf{MG}^2 = k$ et on déduit que

$$\mathbf{MG}^2 = \frac{1}{m} (k - g(G)) = \lambda$$

- ✓ Si $\lambda < 0$ alors l'ensemble cherché est le vide
- ✓ Si $\lambda = 0$ alors $M = G$ et l'ensemble cherché est $\{G\}$
- ✓ Si $\lambda > 0$ alors $MG = \sqrt{\lambda}$ l'ensemble cherché est
 - Dans le plan, le cercle de centre G et de rayon $\sqrt{\lambda}$
 - Dans l'espace, la sphère de centre G de rayon $\sqrt{\lambda}$

Application

On donne dans un repère orthonormé du plan les points A et B définis par

$A(2;0)$ et $B(0;1)$. Soit la fonction $M \rightarrow MA^2 - MB^2$. Déterminer et construire l'ensemble de niveau 3 de cette fonction.

1.3 Ensemble de niveau de la fonction $\frac{MA}{MB}$

Soit A et B deux points de l'espace . On considère la fonction $M \rightarrow \frac{MA}{MB}$. Soit $k \in \mathbb{R}$

On pose $E_k = \left\{ M \in \mathcal{E} / \frac{MA}{MB} = k \right\}$

- Si $k < 0$ alors $E_k = \emptyset$.
- Si $k = 0$ alors $E_k = \{A\}$
- Si $k = 1$, alors E_k est la médiatrice de $[AB]$
- Si $k \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0; 1\}$, on pose $G_1 = \text{bar} \{(A, 1); (B, k)\}$ et $G_2 = \text{bar} \{(A, 1); (B, -k)\}$ alors l'ensemble E_k est :
 - Le cercle de diamètre $[G_1G_2]$ si on est dans le plan
 - La sphère de diamètre $[G_1G_2]$ si on est dans l'espace.

Application

Déterminer l'ensemble $\mathcal{H}$ des points M de l'espace tels que $\frac{MA}{MB} = 2$ avec $A(2,0)$ et $B(0,1)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Leçon 2 : ORIENTATION DANS L'ESPACE

2-1 Activité préparatoire

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace et les points I ; J et K tels que

$$\overrightarrow{OI} = \vec{i}; \overrightarrow{OJ} = \vec{j} \text{ et } \overrightarrow{OK} = \vec{k}.$$

Pour orienter l'espace, les physiciens imaginent un observateur ayant les pieds en O, la tête en K et fixant le point I.

Dans chaque cas de figure, précisez la position du point J par rapport à l'observateur.

Le principe précédent est connu sous le nom de **règle du bonhomme d' Ampère** est à la base de l'orientation de l'espace.

Orienter l'espace, c'est distinguer ces deux types de repères qu'on qualifiera l'un de repère direct et l'autre de repère indirect.

2.2 Résumé

Définition Soit $\vec{U}$ et $\vec{V}$ deux vecteurs non nuls du plan euclidien orienté. On pose

$$\vec{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{U} \text{ et } \vec{v} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{V}. \text{ On a: } (\widehat{\vec{U}, \vec{V}}) = (\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

On a de même les propriétés suivantes ;

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires de même sens, alors $\text{mes}(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \equiv 0[2\pi]$
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires de sens contraires, alors $\text{mes}(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \equiv \pi[2\pi]$
- Soit A et B deux points distincts du plan, α un réel de l'intervalle $]-\pi; \pi]$

L'ensemble des points M du plan tels que $\text{mes}(\widehat{\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}}) \equiv \alpha[2\pi]$ est :

✓ la droite (AB) privée du segment [AB] si $\alpha = 0$

✓ le segment [AB] privé des points A et B si $\alpha = \pi$

- ✓ Un arc de cercle de diamètre $[AB]$ si $\alpha = \frac{\pi}{2}$.
- ✓ l'un des arcs de cercle d'extrémités A et B privés de A et B : Cercle dont le centre est le point O de la médiatrice de $[AB]$ tel que l'on ait $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \alpha$

Soit $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace.

On dit que R est **direct** lorsqu'un observateur situé sur la demi-droite $[O; \vec{k}[$ les pieds en O et regardant dans la direction $\vec{i}$ a le vecteur $\vec{j}$ sur sa gauche.

Remarques:

R_1 : Un repère de l'espace est dit indirect s'il n'est pas direct .

R_2 : Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est directe lorsque pour tout point O de l'espace le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est direct.

2. 3 Propriétés

P₁ Permuter deux vecteurs d'une base change son orientation. Ainsi, les bases $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$ sont de sens contraires.

P₂ : Permuter de façon circulaire les trois vecteurs d'une base ne change pas son orientation. Ainsi, les bases $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$ et $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$ sont de même sens.

P₃ : Remplacer un vecteur d'une base par son opposé change son orientation. Ainsi,

- les bases $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $(-\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont de sens contraires.

- les bases $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $(-\vec{i}, -\vec{j}, \vec{k})$ sont de même sens.

Remarque

L'espace E étant orienté, on peut définir une orientation de tout plan de l'espace E.

Soit (P) un plan de E de repère $(\vec{i}, \vec{j})$ et $\vec{k}$ un vecteur normal à (P).

On convient que $(o, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère direct de (P) si $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère direct de E. Un plan est orienté par le choix d'un de ses vecteurs normaux.

Application

Soit ABCDEFGH un cube d'arête 1.

Préciser si les repères et bases suivants sont directs ou indirects

- a) $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ d) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$
b) $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DH})$ c) $(F, \overrightarrow{FE}, \overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FG})$

Leçon 3 : PRODUIT VECTORIEL

3.1 Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace orienté. On appelle **Produit Vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et définie par :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{cases} \vec{0} & \text{si } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \\ \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) \cdot \vec{k} & \end{cases}$$

où $\vec{k}$ est un vecteur normal unitaire au plan définie par $\vec{u}$ et $\vec{v}$

NB : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ se lit « $\vec{u}$ vectoriel $\vec{v}$ »

3.2 Conséquences de la définition

C1. Pour tout vecteur $\vec{u}$ de l'espace, $\vec{u} \wedge \vec{0} = \vec{0} \wedge \vec{v} = \vec{0}$

C2. Si $\|\vec{u}\|=1=\|\vec{v}\|$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe de l'espace.

3.3 Propriétés

P₁ Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace orienté.

Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à chacun des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

De façon précise, on a : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \perp \vec{u}$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \perp \vec{v}$.

P₂ Si $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base orthonormée directe du plan alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe de l'espace.

P₃ Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace orienté et $k \in \mathbb{R}$.

- $\vec{u} \wedge \vec{v} = -(\vec{v} \wedge \vec{u})$
- $(k\vec{u}) \wedge \vec{v} = k(\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{u} \wedge (k\vec{v})$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w}$.
- $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$.

P_4 $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée directe de l'espace.

$$\bullet \vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k} \quad \bullet \vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i} \quad \bullet \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j} \quad \bullet \vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k} \quad \bullet \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$$

3.4 Remarques

R₁ Des points A, B et C de l'espace tels que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$, sont non alignés et définissent un plan dont un vecteur normal est $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

R₂ Pour étudier la position relative de deux plans (P) et (P') , on peut déterminer deux vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ respectivement normaux à (P) et (P') .

• Si $\vec{n} \wedge \vec{n}' = \vec{0}$ alors $(P) \parallel (P')$.

• Si $\vec{n} \wedge \vec{n}' \neq \vec{0}$ alors (P) et (P') sont sécants suivant une droite dont un vecteur directeur est $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

• Si $\vec{n} \wedge \vec{n}' \neq \vec{0}$ et Si $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$ alors $(P) \perp (P')$.

Application

Soit $(P) : 3x - y + z - 3 = 0$ et $(Q) : 2x + 3y - 3z + 2 = 0$

Démontrez que (P) et (Q) sont perpendiculaires et donner une représentation paramétrique de leur droite d'intersection.

3.5 Expression analytique du produit vectoriel

3.5.1 Activité

Soit $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$ dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$

Déterminez les valeurs de α, β et γ tels que $\vec{u} \wedge \vec{v} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k}$.

3.5.2 Résumé

Soit $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$ dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - y'z)\vec{i} + (x'z - xz')\vec{j} + (y'x - yx')\vec{k}.$$

Pratiquement et pour moins d'efforts de mémoire, on dispose les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de la façon suivante

$\vec{u}$	$\vec{v}$
x	x'
y	y'
z	z'

De sorte que $\vec{u} \wedge \vec{v} = \left(\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} z & z' \\ x & x' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \right)$.

3.5.3 Application

- 1) On donne $\vec{u} (1,1,2)$ et $\vec{v} (1,1,-2)$ dans une base orthonormée. Calculez $\vec{u} \wedge \vec{v}$
- 2) Déterminer une équation du plan (P) défini par les vecteurs $\vec{AB} (3,0,-4)$ et $\vec{AC} (2,-1,1)$

Leçon 4 : Applications du produit vectoriel

4.1 Calculs des distances

4.1.1 Distance d'un point à une droite

Soit (D) une droite de repère (A, $\vec{u}$) et M un point de l'espace. On a :

$$d(M, (D)) = \frac{\|\vec{MA} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

Preuve :

Soit H le projeté orthogonal de M sur (D)

$$\text{On a : } \vec{MA} \wedge \vec{u} = (\vec{MH} + \vec{HA}) \wedge \vec{u} = \vec{MH} \wedge \vec{u} + \vec{HA} \wedge \vec{u} = \vec{MH} \wedge \vec{u}$$

car $\vec{HA} \wedge \vec{u} = 0$ vu que ces deux vecteurs sont colinéaires.

$$\text{Ainsi, } \vec{MA} \wedge \vec{u} = \vec{HA} \wedge \vec{u} = MH \times \|\vec{u}\| \times \sin(\widehat{MH, \vec{u}})$$

$$\Rightarrow \|\vec{MA} \wedge \vec{u}\| = MH \times \|\vec{u}\| \Rightarrow d(M, (D)) = MH = \frac{\|\vec{MA} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

4.1.2 Distance d'un point à un plan

Soit $(\mathcal{P})$ le plan de repère $(A, \vec{u}, \vec{v})$ et M un point de l'espace. On a :

$$d(M, (\mathcal{P})) = \frac{\|\overrightarrow{MA} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v})\|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$$

Preuve :

Soit K le projeté orthogonal de M sur le plan $(\mathcal{P})$

On a : $\overrightarrow{MK}$ est colinéaire à $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (vecteurs normaux à $(\mathcal{P})$).

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MA} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})| &= |(\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KA}) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})| = |\overrightarrow{MK} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) + \overrightarrow{KA} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})| \\ &= |\overrightarrow{MK} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})| = MK \times \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } d(M, (\mathcal{P})) = MK = \frac{\|\overrightarrow{MA} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v})\|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$$

4.2 Calcul d'aires et de volumes

Aire d'un triangle ou de parallélogramme

L'aire d'un triangle ABC est $A = \frac{1}{2} \times \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \sin \widehat{BAC}$

Or $\|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \sin \widehat{BAC} = \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$ donc $A = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

De ce qui précède, • l'aire du parallélogramme ABCD est : $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

• Le volume d'un tétraèdre ABCD est : $\frac{1}{6} \|\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})\|$.

Preuve :

ABCD est un tétraèdre si et seulement si les points A, B, C et D sont non coplanaires c'est-à-dire $\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \neq 0$

Le volume de ABCD est $\frac{1}{3} \times B \times h$ or B = aire de ABC

$$\text{et } h = d(D, (ABC)) = \frac{\|\overrightarrow{AD} \wedge (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})\|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}.$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi, Le volume de ABCD est } \frac{1}{3} \times B \times h &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| \times \frac{\|\overrightarrow{AD} \wedge (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})\|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|} \\ &= \frac{1}{6} \|\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})\|. \end{aligned}$$

- Le volume d'un pavé (parallépipède) ABCDFGHI est : $|\overrightarrow{AF} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})|$

Application

1. Soit A (0,3, -1), B (1,4,0) et M (1,-1, 1)
Détermine la distance du point M à la droite (AB).
2. Soit A (0,3, -1), B (1,4,0), C(-2,2,0) et M (1,-1, 1)
Détermine la distance du point M au plan (ABC).
3. ABCDEFGH est un cube de coté 1. L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. On désigne par I le milieu du segment $[[EF]]$ et par K le centre du carré ADHE
 - a) Vérifie que $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{IG} \wedge \overrightarrow{IA}$
 - b) En déduire l'aire du triangle IGA
 - c) Calculer le volume du tétraèdre ABIG et en déduire la distance du point B au plan (AIG)

Table des matières

1	LIMITES ET CONTINUITES	2
1.1	Limites	2
1.1.1	Rappel sur les limites	2
1.1.2	Opérations sur les limites	2
1.1.3	Propriétés de comparaison	3
1.2	Branches infinies	4
1.3	Continuité	4
1.3.1	Fonctions continue en un point	4
1.3.2	Fonction continue sur un intervalle	5
1.3.3	Calcul approché des zéros d'une fonction	6
1.3.3.1	Théorème des valeurs intermédiaires	6
1.3.4	Fonction continue strictement monotone	6

LIMITES ET CONTINUITES

Objectifs

A la fin de ce chapitre, l'élève devra être capable de :

- ☞ Savoir calculer la limite d'une fonction en levant l'indétermination.
- ☞ Savoir étudier graphiquement la continuité d'une fonction.
- ☞ Savoir et connaître appliquer le théorème des valeurs intermédiaires.
- ☞ Déterminer l'image d'un intervalle en utilisant la monotonie ou le tableau de variation d'une fonction.

1.1 Limites

1.1.1 Rappel sur les limites

- ☞ On appelle fonction numérique d'une variable réelle toute fonction dont l'ensemble de départ et l'ensemble d'arriver sont des parties de $\mathbb{R}$.
- ☞ Le domaine de définition d'une fonction f est l'ensemble constitué des éléments qui ont une image par f .
- ☞ Le domaine de définition d'une fonction polynôme est $\mathbb{R}$.
- ☞ Le domaine de définition d'une fonction rationnelle $r = \frac{p}{q}$ est l'ensemble des nombres réels qui n'annulent pas q .
- ☞ Le domaine de définition d'une fonction irrationnelle $i = \sqrt{g}$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $g(x) \geq 0$.
- ☞ Si f et g sont des fonctions numériques, alors $D_{f+g} = D_f \cap D_g$ et $D_{f \times g} = D_f \cap D_g$.

Exemple : Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x-4}{|x|-2} ; \quad g(x) = \sqrt{4+x} + \frac{2}{\sqrt{4-2x}} ; \quad h(x) = \sqrt{|3x-2|-1} \quad \text{et} \quad t(x) = \frac{\sqrt{16-x^2}}{x+2}$$

1.1.2 Opérations sur les limites

Soient f et g deux fonctions numériques définies sur leur domaine, l et l' deux réels non nuls.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	1	1	1	∞	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	∞	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	0	∞	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	∞	0	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x)$	$l+l'$	1	∞	∞	$+\infty$	$-\infty$	F.I	∞	∞	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \times g)(x)$	$l \times l'$	0	∞	∞	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I	F.I	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g}\right)(x)$	$\frac{l}{l'}$	∞	0	∞	F.I	F.I	F.I	0	∞	F.I
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) $	$ l $	$ l $	$ l $	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	0	$+\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)}$	$\sqrt{l}$ si $l \geq 0$	$\sqrt{l}$ si $l \geq 0$	$\sqrt{l}$ si $l \geq 0$		$+\infty$			0		0

Remarque 1.1.1 :

☞ La limite en l'infini d'une fonction polynôme est égale à la limite en l'infini de son monôme de plus haut degré.

☞ La limite en l'infini d'une fonction rationnelle est égale à la limite en l'infini du quotient des monômes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

☞ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$, et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$

Exercice d'application 1.1 :

Calculer les limites suivantes :

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\tan(2x)}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{2x^2}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x - 1} - x + 2)$ et $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{3 - \sqrt{x+6}}$

1.1.3 Propriétés de comparaison

Propriété 1.1.1 :

Soit f, g et h trois fonctions numériques d'une variable réelle admettant des limites en x_0

- ☞ Si $f \leq g$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
- ☞ Si $f \leq g$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$.
- ☞ Si $f \leq g$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.
- ☞ Si $g \leq f \leq h$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.
- ☞ S'il existe un nombre réel l et un intervalle $[A; +\infty[$ tels que :
 $\forall x \in [A; +\infty[, |f(x) - l| \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

Exercice d'application 1.2 :

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique à termes positives définie par :

$$\begin{cases} U_0 &= 0 \\ U_{n+1} &= \sqrt{3U_n + 4} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n \leq 4$.
2. Montrer par récurrence que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. Vérifier que $4 - U_{n+1} = \frac{3(4 - U_n)}{4 + \sqrt{3U_n + 4}}$.

4. (a) Montrer que : $4 - U_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - U_n)$.
 (b) En déduire que : $4 - U_{n+1} \leq 4\left(\frac{3}{4}\right)^n$
5. Calculer la limite de la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1.2 Branches infinies

Pour étudier les branches infinies d'une fonction numérique f , on procède comme suit :

On calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

☞ Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$, alors la droite d'équation $y = l$ est **asymptote horizontale** à la courbe de f .

☞ Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, alors on calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$.

(*) Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, alors la courbe de f admet **une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées**.

(*) Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, alors la courbe de f admet **une branche parabolique de direction l'axe des abscisses**.

(*) Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$, alors on calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$.

(**) Si $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$, alors la droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** à la courbe de f .

(**) Si $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \infty$, alors la courbe de f admet **une branche parabolique de direction** celle de la droite d'équation $y = ax$.

(**) Si $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$ n'existe pas, alors la courbe de f admet une **direction asymptotique**, celle de la droite d'équation $y = ax$.

(*) Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ n'existe pas, alors la courbe de f n'admet ni asymptote, ni branche parabolique, ni direction asymptotique.

NB : On illustrera avec des figures.

Exercice d'application 1.3 :

Dans chacun des cas suivants, étudier les branches infinies de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f .

a) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 12x + 10}$, b) $f(x) = -x^3 + 2x^2 - 3x$, c) $f(x) = 2x - 3\sqrt{x}$, d) $f(x) = 2x + 4 + \cos(x)$.

1.3 Continuité

1.3.1 Fonctions continue en un point

Définition 1.3.1 :

Soit f une fonction définie sur son domaine de définition D_f et $x_0 \in \mathbb{R}$.

On dit que f est **continue en x_0** lorsque $x_0 \in D_f$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Propriété 1.3.1 :

Soit f une fonction définie sur son domaine de définition D_f et $x_0 \in \mathbb{R}$.

f est continue en x_0 si et seulement si f est continue à gauche et à droite de x_0 .

Exercice d'application 1.4 :

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 1 & \text{si } x \geq 0 \\ \frac{x+1}{x-1} & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Déterminer le domaine de définition de f et étudier la continuité de f en 0.

Remarque 1.3.1 :

Si une fonction f n'est pas définie en x_0 mais admet **une limite finie** en x_0 , alors on peut prolonger cette fonction par continuité en x_0 .

Si g est le **prolongement par continuité** de f en x_0 , alors $\begin{cases} g(x) = f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \end{cases}$

Exemple 1.3.1 :

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$. f est-elle prolongeable par continuité en 1, en -1? Si oui définir le prolongement par continuité g de f .

1.3.2 Fonction continue sur un intervalle

Définition 1.3.2 :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de son domaine de définition.

On dit que f est continue sur I , lorsque f est continue en tout point de I .

Propriété 1.3.2 :

☞ Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$

☞ Toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle de son domaine de définition.

☞ Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}$.

♣ Les fonctions $f + g$, kf , $f \times g$ et $|f|$ sont continues sur I .

... Si g ne s'annule pas sur I , alors les fonctions $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur I .

... Si f est positive sur I , alors $\sqrt{f}$ est continue sur I .

☞ Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$.

Soit f une fonction continue sur I , telle que $f(I) \subset J$ et g une fonction continue sur J .

La fonction $g \circ f$ est continue sur I .

☞ Par une fonction continue, l'image d'un intervalle est soit un intervalle, soit un singleton.

☞ Soit f une fonction numérique admettant une limite à droite de a et à gauche de b . Alors

... Si f est **continue et strictement croissante** sur un intervalle I contenant a et b , alors

$$f([a; b]) = [f(a); f(b)], \quad f(]a; b]) =]\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); f(b)], \quad f([a; b[) = [f(a); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[,$$

$$f(]a; b[) =]\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[\text{ et } f(\mathbb{R}) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[.$$

... Si f est **continue et strictement décroissante** sur un intervalle I contenant a et b , alors

$$f([a; b]) = [f(b); f(a)], \quad f(]a; b]) = [f(b); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[, \quad f([a; b[) =]\lim_{x \rightarrow b^-} f(x); f(a)],$$

$$f(]a; b[) =]\lim_{x \rightarrow b^-} f(x); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[\text{ et } f(\mathbb{R}) =]\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[.$$

Exercice d'application 1.5 :

Déterminer $f(I)$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = x^2 + x - 2 \quad I = [-2; 3]$
2. $f(x) = \frac{x-2}{x^2} \quad I =]0; +\infty[$
3. $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 2} \quad I = \mathbb{R}$

1.3.3 Calcul approché des zéros d'une fonction

1.3.3.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 1.3.1 :

Soit a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

T_1) Si f est une fonction **continue** sur l'intervalle $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$ alors il existe au moins un nombre réel $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

T_2) Si f est une fonction **continue et strictement monotone** sur l'intervalle $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, alors il existe un unique nombre réel $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Exercice d'application 1.6 :

Dans chacun des cas suivants, démontrer que l'équation (E) admet une unique solution dans l'intervalle I , puis déterminer par balayage un encadrement à 10^{-1} près de cette solution.

1. $x^4 - 3x = 1 \quad I =]1; 2]$
2. $\cos(x) = x \quad I = \mathbb{R}$

1.3.4 Fonction continue strictement monotone

Rappel :

Soit $f : A \rightarrow B$ une fonction numérique.

☞ f est dite **injective** si et seulement si pour tous éléments x_1 et x_2 de A , on a :

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

☞ f est dite **surjective** si et seulement si pour tout élément y de B , il existe au moins un élément x de A tel que $y = f(x)$.

☞ f est dite **bijective** si et seulement si pour tout élément y de B , il existe un unique élément x de A tel que $y = f(x)$.

☞ Une fonction est injective lorsque chaque droite horizontale coupe la courbe un ou zéro point.

☞ Une fonction est surjective lorsque chaque droite horizontale coupe la courbe en au moins un point.

☞ Une fonction est bijective lorsque chaque droite horizontale coupe la courbe en un unique point.

Propriété 1.3.3 :

Soit f une fonction **continue et strictement monotone** sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

☞ f réalise une bijection de I vers $f(I)$.

☞ La bijection réciproque, notée f^{-1} , est continue sur l'intervalle $f(I)$.

☞ f^{-1} est strictement monotone et a le même sens de variation que f .

☞ Les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice (droite d'équation $y = x$)

Exercice d'application 1.7 :

Dans chacun des cas suivants, démontrer que la fonction f admet une bijection réciproque f^{-1} et tracer sur le même graphique les courbes représentatives de f et f^{-1} :

1. $f(x) = x^3 \quad I = \mathbb{R}$

2. $f(x) = x - \sin(x) \quad I =] - 3\pi ; 3\pi [$

Table des matières

1	NOMBRES PREMIERS, PGCD ET PPCM DE DEUX ENTIERS RELATIFS	3
1.1	NOMBRES PREMIERS	3
1.2	Nombre premier	4
1.2.1	Définition	4
1.2.2	Critère d'arrêt ou test de primalité	4
1.2.3	Infinité des nombre premiers	4
1.2.4	Décomposition, diviseur d'un entier	5
1.3	PPCM et PGCD de deux entiers relatifs	5
1.3.1	PPCM de deux entiers relatifs	5
1.3.1.1	Définition	5
1.3.1.2	Propriétés	6
1.4	PGCD de deux entiers relatifs	6
1.4.1	Définition et propriétés	6
1.4.1.1	Définition	6
1.4.1.2	Propriétés	7
1.4.2	Nombres premiers entre eux	8
1.4.2.1	Définition et propriétés	8
1.4.3	Algorithme d'Euclide	8
1.5	Théorème de Bézout et théorème de Gauss	9
1.5.1	Identité de Bézout	9
1.5.2	Théorème de Bézout	10
1.5.3	Le théorème de Gauss et son corollaire	10
1.5.3.1	Théorème de GAUSS	10
1.5.3.2	Corolaire du théorème de Gauss	10
1.6	Le petit théorème de Fermat et son corolaire	11
1.7	Equations diophantiennes	11
1.7.1	Résolution des équations du types $ax + by = 0$	11

1.7.2 Résolution des équations du types $ax + by = c$ avec $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$ 11

NOMBRES PREMIERS, PGCD ET PPCM DE DEUX ENTIERS RELATIFS

1.1 NOMBRES PREMIERS

Objectifs

A la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- ☞ Reconnaître si un nombre est premier.
- ☞ Déterminer le nombre de diviseur d'un entier
- ☞ Déterminer des entiers connaissant leur PGCD et leur PPCM.
- ☞ Calculer le PGCD de deux entiers en utilisant l'algorithme d'Euclide.
- ☞ Reconnaître deux entiers premiers entre eux.
- ☞ Utiliser l'identité de Bezout pour montrer que deux entiers sont premiers entre eux et déterminer une solution particulière de l'équation $ax + by = c$ dans $\mathbb{Z}^2$.
- ☞ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ un système d'équation liant deux entiers x et y avec leur PGCD ou leur PPCM.
- ☞ Utiliser le théorème de Gauss pour :
 - ♣ résoudre des problèmes de divisibilité ;
 - ♣ résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ des équations linéaires $ax + by = c$ dont les coefficients sont des entiers.

1.2 Nombre premier

1.2.1 Définition

On dit qu'un entier naturel p est premier s'il possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et p .

Exemple 1.2.1 :

- ♣ 2, 3, 5, 7, 11 et 13 sont des nombres premiers.
- ♣ $4 = 2 \times 2$, $6 = 2 \times 3$ et $8 = 2 \times 4$ ne sont pas des nombres premiers.

Remarque 1.2.1 :

- ☞ 1 n'est pas un nombre premier (il n'a qu'un seul diviseur positif)
- ☞ Un entier naturel non premier est parfois appelé un **nombre composé**.

1.2.2 Critère d'arrêt ou test de primalité

Propriété 1.2.1 :

Tout entier naturel n différent de 0 et de 1 admet au moins un diviseur premier.

Si n n'est pas premier, alors il admet au moins un diviseur premier p tel que $2 \leq p \leq \sqrt{n}$

Preuve:

- ☞ Si n est premier, il admet un diviseur premier : lui-même.
- ☞ Si n n'est pas premier, l'ensemble D des diviseurs d de n tels que : $2 \leq d < n$ n'est pas vide. D'après le principe du bon ordre, D admet un plus petit élément p . Si p n'était pas premier, alors il admettrait un diviseur d' tel que $2 \leq d' < p$ qui diviserait aussi n . Ceci contredirait la minimalité de p dans D . Donc p est premier.
- ☞ On a donc p premier et $n = p \times q$ avec $p \leq q$ (car p est le plus **petit diviseur** de n). En multipliant l'inégalité $p \leq q$ par p , on obtient : $p^2 \leq pq \Leftrightarrow p^2 \leq n$ d'où $2 \leq p \leq \sqrt{n}$. ■

Remarque 1.2.2 :

Le critère d'arrêt s'énonce encore comme suit :

"si n n'admet pas de diviseur premier p tel que $2 \leq p \leq \sqrt{n}$, alors n est premier."

Exercice d'application 1.1 :

Montrer que 89 est un nombre premier.

1.2.3 Infinité des nombre premiers

Propriété 1.2.2 :

Il existe une infinité de nombre premier

Preuve:

Procédons par l'absurde

Supposons qu'il existe un nombre fini n de nombres premiers : $p_1, p_2, \dots, p_i, \dots, p_n$.

1.3. PPCM et PGCD de deux entiers relatifs

Soit N un nombre entier non premier, supérieur à 2 : $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_{n-1} \times p_n + 1$.

D'après le critère d'arrêt, N admet un diviseur premier. Soit p_i , $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, ce diviseur premier.

p_i divise $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_{n-1} \times p_n$ et N donc p_i divise $1 = N - p_1 \times p_2 \times \dots \times p_{n-1} \times p_n$.

Ceci est absurde car $p_i \geq 2$.

Conclusion : il existe une infinité de nombres premiers. ■

1.2.4 Décomposition, diviseur d'un entier

Propriété 1.2.3 :

♣ *Théorème fondamental de l'arithmétique :*

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Il existe des nombres premiers $P_1, P_2, \dots, P_k$ et des entiers naturels non nuls $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ tels que : $n = P_1^{\alpha_1} \times P_2^{\alpha_2} \times \dots \times P_k^{\alpha_k}$.

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs prêt.

♣ Soit x un entier naturel se décomposant en un produit de facteurs premiers de la forme :

$x = P_1^{\alpha_1} \times P_2^{\alpha_2} \times \dots \times P_k^{\alpha_k}$. Alors le nombre de diviseur positif de x est $N = (1+\alpha_1)(1+\alpha_2) \times \dots \times (1+\alpha_k)$

Preuve : TPE (travail personnel de l'élève)

Exercice d'application 1.2 :

1. Décomposer 14616 en produit de facteur premier et préciser le nombre de ces diviseurs positifs.
2. Un entier naturel n a 15 diviseurs. On sait de plus que n est divisible par 6 mais pas par 8. Déterminer cet entier n .
3. Déterminer le plus petit entier naturel possédant 28 diviseurs.
4. Dresser la liste des nombres premiers inférieur à 100.

1.3 PPCM et PGCD de deux entiers relatifs

1.3.1 PPCM de deux entiers relatifs

1.3.1.1 Définition

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

L'ensemble des multiples strictement positif commun à a et b contient ab et est donc non vide : il admet donc un plus petit élément que l'on appelle le plus petit commun multiple de a et b . On le note

$PPCM(a; b)$

Remarque 1.3.1 :

Il découle de cette définition que pour tout entiers relatifs a et b , on a

1. $PPCM(a; b) = PPCM(|a|; |b|)$.
2. $PPCM(a; b) = PPCM(b; a)$.
3. $Max(a; b) \leq PPCM(a; b) \leq ab$

1.3.1.2 Propriétés

Propriété 1.3.1 :

$P_1)$ Soit x et y deux entiers naturels tels que : $x = P_1^{\alpha_1} \times P_2^{\alpha_2} \times \dots \times P_k^{\alpha_k}$ et $y = P_1^{\beta_1} \times P_2^{\beta_2} \times \dots \times P_k^{\beta_k}$.

$$\text{Alors } PPCM(a; b) = \prod_{i=1}^k P_i^{\max(\alpha_i; \beta_i)}$$

$P_2)$ Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Alors $b \mid a \Leftrightarrow PPCM(a; b) = a$.

$P_3)$ Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Alors pour tout entier relatif c , on a :

$$(a \mid c \text{ et } b \mid c) \Leftrightarrow PPCM(a; b) \mid c.$$

$P_4)$ Soit a , b et k trois entiers naturels non nuls. Alors $PPCM(ka; kb) = kPPCM(a; b)$.

Activité :

Soit B une boîte en forme de pavé droit de hauteur L , à base carrée de côté l , où l et L sont des entiers naturels non nuls tels que $l < L$.

On veut remplir la boîte B avec des cubes tous identiques dont l'arête a est un entier naturel non nul (les cubes devant remplir complètement la boîte B sans laisser d'espace vide).

1. Dans cette question, $l = 882$ et $L = 945$.

(a) Quelle est la plus grande valeur possible pour a ?

On appelle d cette valeur. d est appelé le PGCD de a et de b .

(b) Démontrer que tous les diviseurs de d conviennent comme valeur de a .

(c) Existe-t-il d'autres valeurs possibles pour a ?

2. Dans cette question, le volume de la boîte B est $v = 77760$. On sait que, pour remplir la boîte B , la plus grande valeur possible de a est 12.

On pose : $l = al'$ et $L = aL'$

(a) Que peut-on dire de $PGCD(l'; L')$ si $a = 12$? Pourquoi ?

(b) Vérifier, dans le cas $a = 12$, que $l'^2 L' = 45$.

(c) Montrer qu'il y a exactement deux boîtes B possibles dont on donnera les dimensions.

1.4 PGCD de deux entiers relatifs

1.4.1 Définition et propriétés

1.4.1.1 Définition

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

L'ensemble des diviseurs strictement positif commun à a et b noté $D(a; b)$ contient 1 et est fini : il admet donc un plus grand élément que l'on appelle le **plus grand commun diviseur** de a et b . On le note $PGCD(a; b)$.

Exemple 1.4.1 :

$$PGCD(24; 18) = 6, PGCD(60; 84) = 12, PGCD(150; 240) = 30$$

Remarque 1.4.1 :

Il découle de cette définition qu'on a :

1. pour tous $a, b \in \mathbb{Z}^*$, $PGCD(a; b) = PGCD(|a|; |b|)$.
2. pour tous $a, b \in \mathbb{Z}^*$, $PGCD(a; b) = PGCD(b; a)$.
3. pour tous $a, b \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq PGCD(a; b) \leq \text{Min}(a; b)$.

1.4.1.2 Propriétés

Propriété 1.4.1 :

$P_1)$ Soit x et y deux entiers naturels tels que : $x = P_1^{\alpha_1} \times P_2^{\alpha_2} \times \dots \times P_k^{\alpha_k}$ et $y = P_1^{\beta_1} \times P_2^{\beta_2} \times \dots \times P_k^{\beta_k}$.

$$\text{Alors } PGCD(a; b) = \prod_{i=1}^k P_i^{\min(\alpha_i; \beta_i)}$$

$P_2)$ Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Alors $b \mid a \Leftrightarrow PGCD(a; b) = b$.

$P_3)$ Soit a, b et k trois entiers naturels non nuls. Alors $PGCD(ka; kb) = kPGCD(a; b)$.

$P_4)$ Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Alors pour tout entier relatif c , on a :

$$(c \mid a \text{ et } c \mid b) \Leftrightarrow c \mid PGCD(a; b).$$

$P_5)$ Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Alors $PGCD(a; b) \times PPCM(a; b) = ab$

Preuve : TPE (travail personnel de l'élève)

Remarque 1.4.2 :

☞ De la propriété P_3), on a : $PGCD(a; 1) = 1$ et $PGCD(a; a) = a$

Exemple 1.4.2 :

☞ $PGCD(75; 0) = 75$.

☞ $PGCD(-36; -12) = PGCD(36; 12) = 3$.

☞ $PGCD(72; 6) = 6$ car 6 divise 72.

☞ $PGCD(720; 60) = 10PGCD(72; 6) = 60$.

☞ $PGCD(15; 1) = 1$.

Exercice d'application 1.3 :

$$1. \text{ Résoudre dans } \mathbb{N}^2 \text{ les systèmes suivants } (\Sigma) : \begin{cases} PGCD(x; y) = 354 \\ x + y = 5664 \end{cases} \text{ et } (\Gamma) : \begin{cases} PPCM(x; y) = 168 \\ x \times y = 1008 \end{cases}$$

2. Déterminer les couples $(a; b)$ d'entiers naturels tels que :

$$2\mu + 3\delta = 11 \text{ avec } \mu = PPCM(a; b) \text{ et } \delta = PGCD(a; b).$$

1.4.2 Nombres premiers entre eux

1.4.2.1 Définition et propriétés

Définition 1.4.1 :

Deux nombres entiers relatifs sont dit premiers entre eux (où étrangers) si leur PGCD est égal à 1

Exemple 1.4.3 :

- 1) $PGCD(9; 4) = 1$, donc 4 et 9 sont premiers entre eux.
- 2) $PGCD(a; 1) = 1$, donc 1 est premier avec tout entier.
- 3) Tout nombre premier p est premier avec tout nombre qu'il ne divise pas.

Attention : Il ne faut pas confondre des nombres premiers entre eux et des nombres premiers. 4 et 9 ne sont pas premiers et pourtant ils sont premiers entre eux.

Par contre, deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux.

Propriété 1.4.2 :

P_1) Soit a et b deux entiers relatifs premiers entre eux :

- Tout diviseur de a est premier avec b ;
- Pour tous entier naturels n et m , a^n est premier avec b^m

P_2) Soit a et b deux entiers relatifs non nuls et d un diviseur commun à a et b .

Si $a = da'$ et $b = db'$, alors d est le PGCD de a et b si et seulement si a' et b' sont premiers entre eux.

Preuve : TPE (travail personnel de l'élève)

1.4.3 Algorithme d'Euclide

L'algorithme d'Euclide permet de calculer le PGCD de deux entiers naturels non nuls.

Il repose sur la propriété suivante :

Propriété 1.4.3 :

Soit a et b deux entiers naturels non nuls tels que b ne divise pas a .

La suite des divisions euclidiennes suivantes finit par s'arrêter. Le dernier reste non nul est alors le PGCD de a et de b .

$$\begin{array}{lll}
 \text{Division de } a \text{ par } b & a = bq_0 + r_0 & \text{avec } b > r_0 \geq 0 \\
 \text{Division de } b \text{ par } r_0 & b = r_0q_1 + r_1 & \text{avec } r_0 > r_1 \geq 0 \\
 \text{Division de } r_0 \text{ par } r_1 & r_0 = r_1q_2 + r_2 & \text{avec } r_1 > r_2 \geq 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots \\
 \text{Division de } r_{n-2} \text{ par } r_{n-1} & r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n & \text{avec } r_{n-1} > r_n \geq 0 \\
 \text{Division de } r_{n-1} \text{ par } r_n & r_{n-1} = r_nq_{n+1} + 0 &
 \end{array}$$

On a alors $PGCD(a; b) = r_n$.

Preuve:

☞ Montrons que $PGCD(a; b) = PGCD(b; r_0)$

Soit $D = PGCD(a; b)$ et $d = PGCD(b; r_0)$.

D divise a et b , donc D divise $r_0 = a - bq_0$, d'où D divise b et r_0 ie D divise d . Ainsi $D \leq d$.

d divise b et r_0 , donc d divise $a = bq_0 + r_0$, d'où d divise a et b ie d divise D . Par conséquent $d \leq D$.

On déduit de ces deux inégalités que $D = d$, d'où $PGCD(a; b) = PGCD(b; r_0)$

☞ La suite des restes : $r_0, r_1, r_2, \dots, r_n$ est une suite strictement décroissante dans $\mathbb{N}$ car :

$$r_0 > r_1 > r_2 > \dots > r_n.$$

D'après le principe de descente infinie, il existe alors n tel que $r_{n+1} = 0$

☞ De proche en proche, on en déduit que :

$$PGCD(a; b) = PGCD(b; r_0) = \dots = PGCD(r_{n-2}; r_{n-1}) = PGCD(r_{n-1}; r_n)$$

Or r_n divise r_{n-1} , donc $PGCD(r_{n-1}; r_n) = r_n$

☞ Conclusion : $PGCD(a; b) = r_n$. Le dernier reste non nul est le PGCD. ■

Exemple 1.4.4 :

♦ Calculer $PGCD(4539; 1958)$ de deux façons différentes, puis déterminer $PPCM(4539; 1958)$

1.5 Théorème de Bézout et théorème de Gauss

1.5.1 Identité de Bézout

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls et $D = PGCD(a; b)$.

Il existe deux entiers relatifs u et v tels que : $au + bv = D$.

Preuve:

Soit G l'ensemble formé par les entiers naturels strictement positifs de la forme $ma + nb$ où m et n sont des entiers relatifs.

☞ G est une partie non vide de $\mathbb{N}$ car $|a| \in G$.

En effet si $a > 0$, alors $|a| = a = 1a + 0b \in G$ et si $a < 0$, alors $|a| = -a = -1a + 0b \in G$.

D'après le principe du bon ordre, G admet un plus petit élément d tel que $d = au + bv$.

☞ $D = PGCD(a; b)$ divise a et b , donc D divise $au + bv = d$ et donc $D \leq d$.

☞ Montrons que d divise D (il suffira de montrer que d divise a et b).

En divisant a par d , on a $a = dq + r$ avec $d > r \geq 0$. Ainsi, on a :

$$r = a - dq = a - auq - bvq = a(1 - uq) + b(-vq)$$

Si $r \neq 0$ alors $r \in G$, or $r < d$ et d est le plus petit élément de G , ce qui est contradictoire.

Donc $r = 0$ et par conséquent d divise a .

En procédant de la même façon, on montre que d divise b .

d divise a et b , donc d divise $D = PGCD(a; b)$, d'où $d \leq D$

☞ $D \leq d$ et $d \leq D$, donc $D = d$. ■

1.5.2 Théorème de Bézout

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs u et v tels que : $au + bv = 1$.

Preuve : exercice

Exemple 1.5.1 :

Deux entiers naturels consécutifs n et $n + 1$ sont premiers entre eux car $(1)(n + 1) + (-1)(n) = 1$.

Exercice d'application 1.4 :

1. Montrer que $a = 2n + 1$ et $b = 3n + 2$ sont premiers entre eux, $n \in \mathbb{N}$
2. Si a et b sont premiers entre eux et a et c sont premiers entre eux alors a et bc sont premiers entre eux ($a, b, c \in \mathbb{N}$).
3. Montrer que 59 et 27 sont premiers entre eux, puis déterminer un couple d'entiers relatifs $(x; y)$ tel que : $59x + 27y = 1$

1.5.3 Le théorème de Gauss et son corollaire

1.5.3.1 Théorème de GAUSS

Soit a, b et c trois entiers relatifs non nuls.

Si a divise bc et si a et b sont premiers entre eux, alors a divise c .

Preuve:

Si a divise le produit bc , alors il existe un entier k tel que $bc = ka$.

Si a et b sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe deux entiers u et v tels que : $au + bv = 1$. En multipliant cette dernière égalité par c , on a :

$acu + bcv = c$, or $bc = ka$, donc $acu + kav = c$, d'où $a(cu + kv) = c$.

Ainsi, a divise c . ■

Exercice d'application 1.5 :

1. Trouver tous les couples d'entiers relatifs $(x; y)$ tels que : $5(x - 1) = 7y$.
2. Soit p un entier naturel premier. Montrer que si p divise ab , alors p divise a ou p divise b .
3. Dédurre de la question 2) que si pour tout entier naturel n , p divise a^n , alors p divise a .
4. Soit n un entier naturel non nul. Si a est premier avec n et si $ab \equiv ac[n]$, alors $b \equiv c[n]$ avec $c \neq 0$.
5. Si a et b sont premiers entre eux, alors $PPCM(a; b) = ab$

1.5.3.2 Corollaire du théorème de Gauss

Soit a, b et c trois entiers relatifs non nuls.

Si b et c divisent a et si b et c sont premiers entre eux, alors bc divise a .

Solution:

Comme $PGCD(4; 32) = 4$ et 4 ne divise pas 2, alors l'équation (Σ) n'admet pas de solution.

Comme 17 et 33 sont premiers entre eux, alors l'équation (E) admet des solutions.

Déterminons une solution particulière de (E) .

$17 \times 2 - 33 \times 1 = 1$, donc le couple $(2; 1)$ est une solution particulière de (E) .

$$\text{Ainsi, on a : } \begin{cases} 17x - 33y = 1 \\ 17(2) - 33(1) = 1 \end{cases}$$

Par soustraction membre à membre, on obtient :

$$17(x - 2) - 33(y - 1) = 0 \Leftrightarrow 17(x - 2) = 33(y - 1) (*)$$

33 divise $17(x - 2)$ et $PGCD(17; 33) = 1$, donc d'après le théorème de Gauss, 33 divise $x - 2$.

On a donc : $x - 2 = 33k$, $k \in \mathbb{Z}$ ie $x = 33k + 2$

En remplaçant x par sa valeur dans $(*)$ et en réduisant, on obtient $y = 17k + 1$.

Réciproquement, le couple $(33k+2; 17k+1)$ vérifie l'équation (E) , donc $S = \{(33k + 2; 17k + 1), k \in \mathbb{Z}\}$.■

Exercice d'application 1.8 :

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ les équations $4x + 6y = 4$, $15x + 8y = 5$ et $3x + 7y = 1$

CHAPITRE 6 : **DERIVATION, PRIMITIVES ET ETUDE DE FONCTIONS**

Objectifs :

Au terme de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- Déterminer la fonction dérivée d'une fonction composée ;
- Etudier et construire la courbe d'une fonction ;
- Connaître une primitive de chacune des fonctions usuelles
- Savoir déterminer une primitive d'une fonction continue

6.1/ : DERIVATION

6.1.1/ Définitions et propriété

a) Définition 1 : fonction dérivable en un point

Soit a un élément de K . soit f une fonction définie sur K .

f est dérivable en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie . Dans ce cas, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ se note $f'(a)$

NB : f est dérivable en a si et seulement si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie

b) Définition 2 : fonction dérivable sur un intervalle

Etant donné $A \subset I$, On dit que f est dérivable sur A quand elle est dérivable en tout point de A .

Si f est dérivable sur A , la fonction $A \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f'(x)$ est notée f' . C'est la **fonction dérivée** de f .

Exemple : la fonction $f : x \mapsto 2x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 4x$.

En effet, soit $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2x^2 - 2a^2}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2(x - a)(x + a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} 2(x + a) = 4a$

Proposition:

Toute fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur cet intervalle.

Démonstration :

6.1.2 interprétation graphique du nombre dérivé

il représente le **coefficient directeur de la tangente à C_f au point de C_f d'abscisse x_0** (dans l'hypothèse où ce coefficient directeur et cette tangente existent !)

Le coefficient directeur de la sécante (AB) est : $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$

Lorsque h tend vers 0 :

- le point B tend vers le point A
 - la droite (AB) tend alors vers la tangente à C_f en A
 - l'accroissement moyen de f en x_0 tend vers $f'(x_0)$.
- À la limite, le point B est en A , la droite (AB) est alors tangente à C_f en A et son coefficient directeur est $f'(x_0)$.

6.1.3 Approximation affine

Proposition :

Soit f une fonction définie sur I et dérivable en $a \in I$.

1. Il existe une fonction φ telle que pour tout réel h avec $a + h \in I$:

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h) \text{ et } \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$$

2. La fonction $h \rightarrow f(a) + hf'(a)$ est une approximation affine de f pour h proche de 0.

Preuve :

Pour $h \neq 0$, on pose $\varphi(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a)$.

f est dérivable en a donc lorsque h tend vers 0, $\varphi(h)$ tend vers $f'(a) - f'(a) = 0$.

De plus, $h\varphi(h) = f(a+h) - f(a) + hf'(a)$ soit $f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h)$

6.1.3 Dérivée à gauche et à droite

Définition :

Soit f une fonction définie en x_0 .

1. On dit que f est **dérivable à gauche** en x_0 si f est définie sur un intervalle de la forme

$]a; x_0]$ et $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ a une limite finie à gauche en x_0 .

Cette limite est appelée nombre dérivé de f à gauche en x_0 et est noté $f'g(x_0)$.

2. On dit que f est **dérivable à droite** en x_0 si f est définie sur un intervalle de la forme $[x_0; a[$

et $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ a une limite finie à droite en x_0 .

Cette limite est appelée nombre dérivé de f à droite en x_0 et est noté $f'd(x_0)$.

Remarque : Soit f une fonction et (C_f) sa courbe représentative.

1. Si f est dérivable à gauche (respectivement à droite) en x_0 , alors (C_f) admet une demi-tangente à gauche (respectivement à droite) au point d'abscisse x_0 , dont le coefficient directeur est le nombre dérivé de f à gauche (respectivement à droite) en x_0 .

2. Si $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite infinie à gauche ou à droite en x_0 , alors la courbe représentative de f admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées au point d'abscisse x_0 .

3. Dans le cas où la courbe (Cf) admet au point d'abscisse x_0 une demi-tangente à gauche et une demi-tangente à droite de supports distincts, on dit que ce point est un point **anguleux**.

Proposition :

Une fonction f est dérivable en x_0 si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en x_0 et les nombres dérivés à gauche et à droites sont égaux.

Exemple 1 : soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$.

Montrer que (Cf) admet une demi-tangente verticale en A, son point d'abscisse 2

Solution :

$Df = [-2; 2]$.

Pour répondre, il suffit de montrer que $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-(2)}$ est infinie.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-(2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{2-x} \cdot \sqrt{2+x}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{2-x} \cdot \sqrt{2+x}}{-(2-x)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} -\frac{\sqrt{2+x}}{\sqrt{2-x}} = -\infty$$

($\lim_{x \rightarrow 2^-} -\sqrt{2+x} = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{2-x} = 0^+$)

d'où (Cf) admet une demi-tangente verticale en A(2)

Exemple 2 :

f est la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x > -1 \\ \frac{-1}{x}, & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$

1) Etudier la dérivabilité de f en $a = -1$

Solution :

1) $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\frac{-1}{x} - 1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-1-x}{x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-1}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} x-1 = -2$

comme $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1}$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1}$ n'existe pas.

f n'est donc pas dérivable en $a = -1$

Cependant, $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1}$ existe et est finie. On dit alors que f est dérivable à gauche en $a = -1$; le nombre dérivé de f par -1 est donc $f'_g(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} = 1$

De même, f est dérivable en -1 à droite et $f'_d(-1) = -2$

Le point A($\frac{-1}{f(-1)}$) est un point anguleux à (Cf) car (Cf) admet en A deux demi-tangentes distinctes

6.1.5 Calcul des) dérivées

Proposition : Dérivées des fonctions élémentaires

f	f'	Ensemble de dérivabilité
$x \mapsto C$ (constante)	$x \mapsto 0$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x$	$x \mapsto 1$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{Z}^*$)	$x \mapsto nx^{n-1}$	$\begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } x > 0 \\ \mathbb{R}^* & \text{si } x < 0 \end{cases}$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$x \mapsto \frac{1}{\cos^2 x} (= 1 + \tan^2 x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$]0; +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$

Propriété : Dérivées et opérations sur les fonctions

- Si f et g sont deux fonctions dérivables sur I , $f + g$ est dérivable sur I et $(f + g)' = f' + g'$.
- Si f est dérivable sur I et si λ est un réel, λf est dérivable sur I et $(\lambda f)' = \lambda f'$.
- Si f et g sont deux fonctions dérivables sur I , $f \times g$ est dérivable sur I et

$$(f \times g)' = f'g + fg'$$

- Si f et g sont deux fonctions dérivables sur I et si g ne s'annule pas sur I , $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I

$$\text{et } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

- Si f est dérivable sur I , g dérivable sur J et si pour tout x de I , $f(x) \in J$, $g \circ f$ est dérivable sur I et $(g \circ f)' = f' \times g' \circ f$.

Cette dernière formule fournit en particulier le tableau suivant :

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivabilité
$f^n, n \in \mathbb{N}^*$	$nf'f^{n-1}$	en tout réel où f est dérivable
$\frac{1}{f}$	$-\frac{f'}{f^2}$	en tout réel où f est dérivable et non nulle
$\frac{1}{f^n}, n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{nf'}{f^{n+1}}$	en tout réel où f est dérivable et non nulle
$\sqrt{f}$	$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$	en tout réel où f est dérivable et strictement positive
e^f	$f'e^f$	en tout réel où f est dérivable

$\ln(f)$	$\frac{f'}{f}$	en tout réel où f est dérivable et strictement positive
$\sin(f)$	$f' \cos(f)$	en tout réel où f est dérivable
$\cos(f)$	$- f' \sin(f)$	en tout réel où f est dérivable

Exemple : soit f la fonction définie par $f(x) = \cos(-2x^2 + 4x - 9)$

Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$

Solution :

On a : $f : x \xrightarrow{p} (-2x^2 + 4x - 9) \xrightarrow{\cos} \cos(-2x^2 + 4x - 9)$. $P(x) = (-2x^2 + 4x - 9)$

$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \cos(p(x)) = \cos \circ p(x)$. Ainsi f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et a pour dérivée :

$$f'(x) = p'(x) \times \cos'(p(x)) = (-4x+4)(-\sin(-2x^2 + 4x - 9))$$

$$f'(x) = (4x-4)(\sin(-2x^2 + 4x - 9))$$

Propriété : (dérivée de la bijection réciproque)

Soit une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I on suppose que f est strictement monotone et que f' ne s'annule pas sur I alors f est bijective, f^{-1} est une bijection de $f(I)$ sur I , dérivable et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ et $D_{(f^{-1})'} = D_{f^{-1}} \setminus \{f(x) \mid f'(x)=0, x \in D_f\}$

N.B Pour déterminer facilement $(f^{-1})'(x)$, il suffit d'exprimer $f'(x)$ en fonction de $f(x)$.

Exemple :

Soit $f :]-1 ; +\infty[\rightarrow]-\infty ; 1[$

$$x \mapsto \frac{x-1}{x+1}$$

- 1) démontrer que f est une bijection
- 2) justifier que f^{-1} est dérivable en 0 et calculer alors la valeur de $(f^{-1})'(0)$
- 3) déterminer f^{-1}
- 4) vérifier 2) en utilisant 3)

solution :

6.1.6 Dérivée successive

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I , sa dérivée f' est appelée **dérivée première** et est notée f^1 . Si f' est dérivable sur I , alors sa dérivée notée f'' (ou encore f^2) est appelée **dérivée seconde** de f . Ainsi de suite jusqu'au rang n ($n \in \mathbb{N}$), f^n sera appelée **dérivée nième** de f .

Exemple : Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$

Pour $x \neq -1$ calculer f' , f^2 , f^3 et f^4 . Peut-on conjecturer $f(n) \forall n \in \mathbb{N}^*$? si oui démontre

Solution :

6.1.7 Point d'inflexion

Définition :

soit f une fonction numérique. On appelle **point d'inflexion** le point où la courbe de f change de concavité.

Propriété :

Soit f une fonction numérique à variable réelle et deux fois dérivable sur un intervalle I :

1. Si pour tout $x \in I$, $f''(x) < 0$ alors la courbe de f est en dessous de la tangente en tout point de I . Dans ce cas, f est dite **concave**.
2. Si pour tout $x \in I$, $f''(x) > 0$ alors la courbe de f est au dessus de la tangente en tout point de I . Dans ce cas, f est dite **convexe**.
3. Si pour tout $x \in I$, $f''(x) = 0$ et f'' change de signe en x_0 alors le point d'abscisse x_0 est un point **d'inflexion** à la courbe de f .

Exemple 1 : démontrer que la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 5$ admet un point d'inflexion que l'on précisera

Exemple 2 :

(C_f) est la courbe de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1 - x)^4$

- 1) étudier la concavité de (C_f)
- 2) a) écrire l'équation cartésienne de (Δ) , la tangente à (C_f) en A d'abscisse 0
- c) en déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 - 4x \leq (1 - x)^4$

6.1.8 Accoissement finis

Définition 1 : Extremum

On dit que $M \in \mathbb{R}$ est un maximum de f si et seulement si :

$$\begin{cases} \exists a \in D_f \text{ tel que } f(a) = M \\ \forall x \in D_f \quad f(x) \leq f(a) \end{cases}$$

(On dit aussi que f présente en a un maximum)

On définit de même un minimum et on parlera d'extremum lorsqu'on aura un maximum ou un minimum.

Définition 2 : Extremum local

On dit que $M = f(a)$ est un extremum local (ou extremum relatif) ssi $\exists r > 0$ tel que la restriction de f à $[a - r; a + r] \cap D_f$ présente en a un extremum.

Théorème :

Soit f une fonction admettant un extremum relatif en x_0 et dérivable en x_0 , alors

$$f'(x_0) = 0$$

Démonstration.....

Théorème : Caractérisation des extrema locaux

Soient f une fonction dérivable sur un intervalle] a ; b [et $x_0 \in]a; b[$.

Si f' s'annule et change de signe en x_0 , alors f admet un extremum relatif en x_0 .

Preuve...

Propriété : Inégalité des accroissements finis

Soient f une fonction dérivable sur un intervalle $[a; b]$. S'il existe deux réels m et M tels que pour tout $x \in [a; b]$, $m \leq f'(x) \leq M$, alors $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$.

Corollaire : Inégalité des accroissements finis

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et vérifiant :

$$\exists M \in \mathbb{R}_+ \forall x \in I; |f'(x)| \leq M$$

Alors :

$$\forall a; b \in I; |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$$

Preuve :...

Exemple : f est définie sur l'intervalle $]-1; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{1+x}$

1) donner un encadrement de $f'(t)$ ($t \in [0; \frac{1}{2}]$)

2) en déduire que :

$$a-) 1 + \frac{1}{2\sqrt{6}} \leq f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 1 + \frac{1}{4}$$

$$b-) \forall x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]; 1 + \frac{1}{\sqrt{6}}x \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{2}x$$

Solution :...

6.1.9 Applications de la dérivation

Dérivée et variations

Proposition :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

1. f est croissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$.

2. f est constante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) = 0$.

3. f est décroissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$

Preuve :...

Exemple :

Etudier les variations de $g(x) = \frac{x^2-2}{x+1}$

Solution : ...

6.2/ PRATIQUE D'ETUDE D'UNE FONCTION

6.2.1/ Eléments de symétrie d'une courbe

Propriété : (centre de symétrie)

Les assertions suivantes sont équivalente :

- i) Ω est le **centre de symétrie** de (Cf) ;
- ii) $\forall x \in Df ; (2a - x) \in Df$ et $f(2a-x) = 2b - f(x)$
- iii) $\forall h \in R / (a+h) \in Df ; (a-h) \in Df$ et $f(a+h) + f(a-h) = 2b$
- iv) Dans le repère $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$, la courbe représentative de f est celle d'une fonction **impaire**.

NB : si $M(x ; y)$ dans $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et $M(X ; Y)$ dans $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$ alors : $\begin{cases} x = X + a \\ y = Y + b \end{cases}$

Exemple : h est la fonction définie par $h(x) = \frac{2x-3}{x+4}$

Démontrer que $\Omega(-4; 2)$ est centre de symétrie de la courbe de h.

Solution :

Il suffit de montrer que la courbe de h dans le repère $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$ est celle d'une fonction impaire

Soit $M(x ; y)$ dans $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et le couple de coordonnées $(X ; Y)$ dans $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$.on

a : $\begin{cases} x = X - 4 \\ y = Y + 2 \end{cases}$

- Ecrivons Y en fonction de X.

$$Y = h(x) \Leftrightarrow Y + 2 = \frac{2(X-4)-3}{X-4+4} = \frac{2X-11}{X} - 2$$

$$\Leftrightarrow Y = \frac{-11}{X}$$

Pour terminer, montrons que $g : X \mapsto \frac{-11}{X}$ est impaire

- Soit X dans Dg . $X \neq 0$; $-X \neq 0$ c-à-d $-X \in Dg$

- $g(-X) = \frac{-11}{-X} = -\left(\frac{11}{X}\right) = -g(X)$

d'où g est impaire

Propriété: (axe de symétrie)

Les assertions ci-après sont équivalentes :

- i) la droite $x = a$ est **axe de symétrie** de (Cf)
- ii) $\forall x \in Df ; (2a - x) \in Df$ et $f(2a - x) = f(x)$
- iii) $\forall h \in R / (a+h) \in Df ; (a - h) \in Df$ et $f(a-h) = f(a+h)$
- iv) Avec $A\left(\begin{smallmatrix} a \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$, la courbe représentative de f dans le repère $(A ; \vec{i}; \vec{j})$ est celle d'une fonction **paire**

Exemple : $f : x \mapsto \frac{x^2-2x}{x^2-2x+5}$

Démontrer que $(\Delta) : x=1$ est axe de symétrie à (Cf).

Solution :

- Recherche du Df :

Tcf : $Df = R$

Soit h dans $\mathbb{R} / (1+h) \in Df$, comme $Df = \mathbb{R}$, $(1+h) \in Df$

$$f(1+h) = \frac{(1+h)^2 - 2(1+h)}{(1+h)^2 - 2(1+h) + 5} = \frac{h^2 - 1}{h^2 + 4}$$

$$f(1-h) = \frac{(1-h)^2 - 2(1-h)}{(1-h)^2 - 2(1-h) + 5} = \frac{h^2 - 1}{h^2 + 4}$$

Ainsi, $\forall \frac{h \in \mathbb{R}}{h \neq 0} (1+h) \in Df; (1-h) \in Df$ et $f(1+h) = f(1-h)$

Donc $(\Delta) : x=1$ est axe de symétrie à (Cf) .

6.2.2/ Etude des branches infinies d'une fonction

Définition 1 (branches infinies)

On dit que (Cf) présente une **branche infinie** dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- i) En $-\infty$, f admet une **limite finie ou infinie**
- ii) En $a \in \mathbb{R}$, f admet une limite infinie

Définition 2 : (asymptote parallèle aux axes)

- i) La droite d'équation $x=a$ est **asymptote verticale** à (Cf) lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$
- ii) La droite d'équation $y=b$ est **asymptote horizontale** à (Cf) lorsque $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$

Définition 3 : (asymptote oblique)

La droite (Δ) d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** au voisinage de $-\infty$ (resp $+\infty$)

lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (resp $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$)

Définition 4 :

(Cf) et (Cg) sont asymptotes en $-\infty$ (resp en $+\infty$) lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ (resp

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$).

Exemple 1 :

Soit $f: x \mapsto -x + |x - 1| - \frac{1}{x-1}$

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 1^<} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 1^>} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x + 1)]$

2) Donner une interprétation géométrique de chacun des résultats.

Exemple 2 :

Soient f et g les fonctions définies par $f(x) = x^2$ et $g(x) = \frac{x^3-5}{x}$

Montrer que (Cf) et (Cg) sont asymptotes en $-\infty$ et en $+\infty$

Solution 1 :

1) Levée des barres de valeur absolue

x	$-\infty$	1	$+\infty$
x-1	-	●	+
$ x - 1 $	$-(x-1)$	▼	x-1

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1 - \frac{1}{x-1} & \text{si } x < 1 \\ -1 - \frac{1}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x + 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x-1} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-2x + 1 - \frac{1}{x-1}) = +\infty$ (car $\lim_{x \rightarrow 1^-} x - 1 = 0$)
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-1 - \frac{1}{x-1}) = -1$ (car $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x-1} = 0$)

2) Interprétation

Résultats	interprétations
-----------	-----------------

$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x + 1)] = 0$	$(\Delta_1) : y = -2x + 1$ est asymptote oblique à (Cf) en $-\infty$
$\lim_{x \rightarrow 1^<} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 1^>} f(x) = -\infty$	$(\Delta_2) : x = 1$ est asymptote verticale à (Cf)
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$	$(\Delta_3) : y = -1$ est asymptote horizontale en $+\infty$

Solution 2 : il suffit de montrer que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = 0$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[x^2 - \frac{x^3 - 5}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x^3 - x^3 + 5}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5}{x} = 0$$

(On peut illustrer qu'elles sont asymptotes à l'aide d'un schéma)

6.2.3 Recherche des branches infinies :

Nous nous limiterons au cas $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

Les situations sont résumées par le tableau ci-dessous

instructions	situations	onclusion
Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$	(Cf) présente à l'infinie une branche parabolique de direction verticale
	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$	(Cf) présente en l'infinie une branche parabolique de direction horizontale

	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \in \mathbb{R}^*),$ alors calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$	Si $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$	(Cf) admet $(\Delta) : y = ax + b$ comme asymptote oblique à l'infinie
		Si $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \infty$	(Cf) présente une branche parabolique de direction $y = ax$

Remarque : soit $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de (Cf) si et seulement si la fonction g définie par $g(x) = f(x+a) - b$ est impaire

$(\Delta) : x = a$ est axe de symétrie de (Cf) si et seulement si g définie par $g(x) = f(x+a)$ est paire

Exemple : on considère la fonction $f(x) = x + \sqrt{x}$

Etudier les branches infinies de (Cf)

Solution :

$$Df = [0 ; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

Conclusion: (Cf) présente en $+\infty$ une branche parabolique de direction $y = x$

Illustration : (schéma)...

Plan d'étude d'une fonction :

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f s'il n'est pas explicitement donné

- 2) Etudier la parité et la périodicité de f (facultatif). Cette étude permet de réduire l'ensemble d'étude de f .précisément :
 - i) Si f est **paire** ou **impaire** , on peut restreindre l'étude de f à $Df \cap [0 ; + \infty[$
 - ii) Si f est **périodique** , de période T , on peut restreindre l'étude de f à $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \cap Df$
- 3) Dérivabilité de f , calcul de la dérivée , sens de variation de f .
- 4) Limites aux bornes de l'ensemble de définition de f ou de son ensemble d'étude
- 5) Tableau de variation de f .
- 6) Construction de la courbe :
 - i) Etudier les branches infinies puis construire les asymptotes éventuelles
 - ii) (facultatif) déterminer les points de rencontre de (Cf) avec les axes des coordonnées
 - iii) Placer les points particuliers de (Cf) (points à tangente horizontale ; points à tangente verticale ; point d'inflexion...)
 - iv) Construire un tableau de valeurs et enfin construire soigneusement (Cf) .

Application : soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

Etudier et construire soigneusement (Cf)

6.3/ PRIMITIVES D'UNE FONCTION

Activité préparatoire :

On considère les fonctions F_1 ; F_2 et f définies par $F_1(x) = 2x^3 - 4x + 5$ et

$$F_2(x) = 2x^3 - 4x - 8 \text{ et } f(x) = 6x^2 - 4$$

- 1) Calculer F'_1 et F'_2
- 2) Que constates- tu ?

Solution :

- 1) $F'_1(x) = 6x^2 - 4$ et $F'_2(x) = 6x^2 - 4$
- 2) on constate que $F_1 \neq F_2$ mais $F'_1 = F'_2 = f$

6.3.1/ Définitions et propriétés :

Définition :

Soit f une fonction définie sur un intervalle K ; soit F une fonction dérivable sur K .

F est **une primitive** de f sur K lorsque $F' = f$

Propriété :

Si f admet F pour **primitive** sur l'intervalle K , alors les primitives de f sur K sont les fonctions $F_\alpha, (\alpha \in \mathbb{R})$ définies par : $F_\alpha(x) = F(x) + \alpha$

Exemple : F et f sont les fonctions définies sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $F(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x}$ et

$$f(x) = -x - \frac{1}{x^2}$$

- 1) Montrer que F est une primitive de f sur $]0 ; +\infty[$
- 2) Déterminer toutes les primitives de f sur $]0 ; +\infty[$
- 3) Déterminer la primitive de f sur $]0 ; +\infty[$ qui prend la valeur $y_0 = \frac{3}{4}$ en $x_0 = 2$

Solution :

- 1) Il suffit de montrer que $F' = f$

$$\forall x \in]0 ; +\infty[, F'(x) = -\frac{1}{2} \times 2x - \frac{1}{x^2} \cdot d'où F'(x) = f(x)$$

- 2) Les primitives de f sur $]0 ; +\infty[$ sont les fonctions $F_\alpha ; (\alpha \in \mathbb{R})$, définies par :

$$F_\alpha(x) = F(x) + \alpha \text{ ainsi } F_\alpha(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + \alpha$$

- 3) Soit G la fonction cherchée. $\exists c \in \mathbb{R} / \forall x \in]0 ; +\infty[, G(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + \alpha$ (car G est une primitive de f sur $]0 ; +\infty[$).

$$\text{Or } G(2) = \frac{3}{4} \cdot c\text{-à-d } -\frac{2^2}{2} + \frac{1}{2} + \alpha = \frac{3}{4} \text{ ainsi } c = \frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$$

Conclusion : G est la fonction de $]0 ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + \frac{9}{4}$$

Propriété :

si la fonction f est **continu** sur l'intervalle K , alors f admet **au moins une primitive** sur K .

6.3.2/ Recherche des primitives d'une fonction

a) primitives des fonctions élémentaires

Intervalle K	Fonction f définie par :	Une primitive de f sur K est F définie par :
$K \subset \mathbb{R}$	$f(x) = 0$	$F(x) = c$ ($c = \text{cste}$)
$K \subset \mathbb{R}$	$f(x) = a$ ($a = \text{cste}$)	$F(x) = ax$
$K \subset \mathbb{R}$	$f(x) = x$	$F(x) = \frac{x^2}{2}$
$K \subset \mathbb{R}$	$f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$)	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$K \subset \mathbb{R}^*$	$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x}$
$K \subset \mathbb{R}^*$	$f(x) = \frac{1}{x^n}$ ($n \geq 2$)	$F(x) = \frac{-1}{(n-1)x^{(n-1)}}$
U'	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x}$
$K \subset \mathbb{R}$	$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x$
$K \subset \mathbb{R}$	$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x$
$K \subset \mathbb{R} \setminus \{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}$	$f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} (= 1 + \tan^2 x)$	$F(x) = \tan x$

b) primitives et opérations sur les fonctions

Propriété :

soient u et v deux fonctions de primitives respectives U et V sur l'intervalle K .

soient α et β deux constantes réelles ; on a le tableau ci-après :

fonctions	Primitives sur K
$u+v$	$U+V$
αu	αU
$\alpha u + \beta v$	$\alpha U + \beta V$

Exemple : déterminer toutes les primitives sur $]0 ; +\infty[$ de la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{3} - x^3 + \frac{24}{7\sqrt{x}}$$

Solution :

Les primitives de f sur $]0 ; +\infty[$ sont les fonctions F_α , ($\alpha \in \mathbb{R}$), définies par :

$$F_\alpha(x) = \frac{1}{3} x - \frac{x^4}{4} + \frac{48}{7} \sqrt{x} + \alpha$$

Propriété :

Soient u une fonction dérivable sur un intervalle K et v la fonction dérivable sur l'intervalle $u(K)$. ($v \circ u$) est la primitive sur K de la fonction $u' \times v' \circ u$.

Propriété

Cette propriété est définie par le tableau ci-dessous :

Fonction f	Une primitive de f est :	commentaires
$u'u^n$ ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	Sur tout intervalle sur lequel u est dérivable
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$	Sur tout intervalle sur lequel u ne s'annule pas
$\frac{u'}{u^n}$ ($n \geq 2$)	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$	
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	Sur tout intervalle sur lequel u est dérivable et strictement positive
$x \mapsto u(ax + \beta)$ avec ($\alpha; \beta =$ cste)	$x \mapsto \frac{1}{\alpha} U(ax + \beta)$; (avec U étant une primitive de u)	Sur tout intervalle sur lequel $\varphi: x \mapsto u(ax + \beta)$ est continue
$u' \cos(u)$	$\sin(u)$	Sur tout intervalle sur lequel u est dérivable
$u' \sin(u)$	$-\cos(u)$	Sur tout intervalle sur lequel u est dérivable
$\frac{u'}{\cos^2 u} = [u'(\tan^2 u)]$	$\tan(u)$	Sur tout intervalle K sur lequel u est dérivable et telle que $u(K) \subset \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

Exercice d'application :

Pour chacune des fonctions ci-après, déterminer une primitive sur un intervalle à préciser.

$$f: x \mapsto 3x^5 - 7x^3 + 2012 - \frac{9}{x^5}; \quad g: x \mapsto \cos x \cdot \sin^3 x; \quad h: x \mapsto \frac{x+1}{(x^2+2x)^4}; \quad q: x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1-2x^2}}$$

$$i: x \mapsto (3x - 11)^8; \quad j: x \mapsto \cos(3x - \frac{\pi}{5}); \quad l: x \mapsto \frac{2x}{\cos^2(x^2)}$$

Solution :

c) Primitives des polynômes trigonométriques :

Activité 1 :

- Linéariser $f: x \mapsto \sin^2 x \cdot \cos^4 x$
- Déterminer alors toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$

Activité 2 :

soit g la fonction définie par $g(x) = \sin^2 x \cdot \cos^3 x$

- Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \cos x (\sin^2 x - \sin^4 x)$
- En déduire la primitive G de g sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur $y_0 = -\sqrt{2}$ en $x_0 = -\pi$

Solution 1 :

- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -\frac{1}{32} \cos 6x - \frac{1}{16} \cos 4x + \frac{1}{32} \cos 2x + \frac{1}{16}$
- les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions F_α ; ($\alpha \in \mathbb{R}$) définies par :

$$F_{\alpha}(x) = -\frac{1}{32} \times \frac{1}{6} \sin 6x - \frac{1}{16} \times \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{32} \times \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{16} x + \alpha$$

Solution 2 :

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad \forall x \in \mathbb{R}, g(x) &= \cos x (\sin^2 x)(\cos^2 x) \\ &= \cos x [(\sin^2 x)(1 - \sin^2 x)] \\ &= \cos x (\sin^2 x - \sin^4 x) \end{aligned}$$

$$\text{ii)} \quad \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \cos x \sin^2 x - \sin^4 \cos x.$$

Une primitive de g sur $\mathbb{R}$ est G_0 définie par : $G_0(x) = \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x$

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, G(x) = G_0(x) + \alpha$$

$$= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + \alpha$$

$$\text{Or } G(-\pi) = -\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{3} (\sin(-\pi))^3 - \frac{1}{5} (\sin(-\pi))^5 + \alpha = -\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = -\sqrt{2}$$

D'où $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_a$

$$x \mapsto \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x - \sqrt{2}$$

Méthode de détermination des primitives des polynômes trigonométriques :

1^{er} cas:

Dans le cas des fonctions $f: x \mapsto \cos^n x$; $g: x \mapsto \sin^n x$ où $m, n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ ou de la fonction $h: x \mapsto \cos^m x \cdot \sin^n x$ où $m, n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ et sont de même parité, **linéariser** et par la suite déterminer les primitives.

2^{eme} cas:

si la fonction h ci-dessous $h: x \mapsto \cos^m x \cdot \sin^n x$ est telle que m et n ne soient pas de même parité alors

- i) Utiliser l'égalité $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- ii) Mettre $h(x)$ sous la forme :
 - $\cos x \times P(\sin x)$ si m est impaire
 - $\sin x \times P(\cos x)$ si n est impaire où P est un polynôme

Application : trouver l'ensemble des primitives des fonctions ci-dessous

$$f(x) = \sin^2 x \times \cos^4 x ; g(x) = \sin^3 x \times \cos^2 x ; h(x) = \sin^4 x \times \cos^3 x$$

CHAPITRE 7 : ESPACES VECTORIELS SUR IR , APPLICATIONS LINEAIRES ET MATRICES

FICHE PEDAGOGIQUE

O.P.G

Bien que l'essentiel des activités mathématiques (tant en analyse qu'en géométrie) que nous effectuons jusqu'en classe de terminale se pratique dans le plan (dimension 2) ou dans l'espace (dimension 3), certains problèmes (système de 4 équations à 4 inconnues par exemple) font apparaître la nécessité de travailler dans des espace de dimension supérieure. La leçon sur les espaces vectoriels permet de fixer un cadre théorique pour aborder ces problèmes.

Les applications linéaires ainsi que les matrices sont des thèmes qui vont entre autres nous permettre de transposer le champ lexical dans lequel est énoncé un problème pour un autre dans lequel il se démontrera plus aisément (On parle de transport de structures).

Temps imparti selon la progression : 9 h

Nombre de leçons : 02

N° et titre éventuel des leçons	Durée
L1 : ESPACES VECTORIELS SUR IR	5h
L2 : APPLICATIONS LINÉAIRES ET MATRICES	4h

Objectifs pédagogiques opérationnels :

OPO 1 (Leçon 1)	1.1 Justifier qu'un ensemble donné à une structure d'espace vectoriel sur IR. 1.2 Justifier qu'un ensemble donné à une structure de sous espace vectoriel. 1.3 Connaître ce qu'est : <ul style="list-style-type: none"> • une famille génératrice ; • une famille libre ; • une combinaison linéaire. 1.4 Justifier qu'une famille de vecteurs est une famille génératrice (vecteurs linéairement dépendants) 1.5 Justifier qu'une famille de vecteurs est une famille libre (vecteurs linéairement indépendants). 1.6 Déterminer une base et la dimension d'un IR _ espace vectoriel ou d'un sous espace vectoriel. 1.7 Écrire les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée.
OPO 2 (Leçon 2)	2.1 Justifier qu'une application donnée est linéaire. 2.2 Déterminer la matrice d'une application linéaire. 2.3 Déterminer le noyau d'une application linéaire. 2.4 Déterminer l'image d'une application linéaire.

	<p>2.5 Justifier qu'une application linéaire est un isomorphisme ou un automorphisme.</p> <p>2.6 Multiplier une matrice par un réel et multiplier deux matrices.</p> <p>2.7 Calculer le déterminant d'une matrice</p> <p>2.8 Déterminer l'inverse d'une matrice inversible</p>
--	--

Pré-requis

Il est souhaitable de voir la leçon sur les **lois de compositions et Structures** avant d'aborder ce cours.

Références : Mathématiques Tle C Collection Monge
 Mathématiques Tle C collection Excellence

Leçon 1 : ESPACES VECTORIELS SUR IR

I- Espace vectoriel

1. Définition et vocabulaire

Soit E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée « $\oplus$ » et d'une loi de composition externe à opérateur dans IR notée « $\bullet$ »

$$\oplus : (E \times E) \rightarrow E$$

$$(u, v) \mapsto u \oplus v$$

et

$$\bullet : (IR \times E) \rightarrow E$$

$$(\lambda, u) \rightarrow \lambda \bullet u$$

Définition.

(E, $\oplus$, $\bullet$) est un espace vectoriel sur IR (on dit encore IR-espace vectoriel, en abrégé IR-e-v) si et seulement si :

□ pour l'opération $\oplus$ on a

P₁) $\vec{u} \oplus \vec{v} = \vec{v} \oplus \vec{u}$ on dit que la loi $\oplus$ est commutatif.

P₂) $(\vec{u} \oplus \vec{v}) \oplus \vec{w} = \vec{u} \oplus (\vec{v} \oplus \vec{w})$, on dit que la loi $\oplus$ est associative.

P₃) $\exists ! \vec{0}_E \in E / \vec{u} \oplus \vec{0}_E = \vec{u}$ on dit que la loi $\oplus$ admet un élément neutre $\vec{0}_E$.

P₄) $\exists ! \vec{u}' \in E / \vec{u} \oplus \vec{u}' = \vec{0}_E$, on dit que $\vec{u}'$ est l'opposé ou le symétrique de $\vec{u}$.

Remarque : les propriétés P₂, P₃ et P₄ permettent de dire que (E, $\oplus$) est un groupe ; les propriétés P₁, P₂, P₃ et P₄ permettent de dire que (E, $\oplus$) est un groupe commutatif ou abélien.

□ pour l'opération $\bullet$ $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E ; \forall \alpha, \beta \in IR$ on a :

P₅) $1 \bullet \vec{u} = \vec{u}$, on dit que 1 est l'élément unitaire.

P₆) $(\alpha + \beta) \bullet \vec{u} = (\alpha \bullet \vec{u}) \oplus (\beta \bullet \vec{u})$ la loi $\bullet$ est distributive à droite.

P₇) $\alpha \bullet (\beta \bullet \vec{u}) = (\alpha \times \beta) \bullet \vec{u}$

P₈) $\alpha \bullet (\vec{u} \oplus \vec{v}) = (\alpha \bullet \vec{u}) \oplus (\alpha \bullet \vec{v})$, la loi $\bullet$ est distributive à gauche.

Attention !

□ Ne pas confondre l'opération « $\bullet$ » à la multiplication usuelle dans IR : $\alpha\beta$ désigne la multiplication de deux réels et $\alpha \bullet \vec{u}$ désigne la « multiplication » d'un réel par un élément de E.

□ Même si dans les exemples pratiques la loi « $\bullet$ » n'est autre chose que la multiplication usuelle, et la loi notée « $\oplus$ » l'addition usuelle, il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont que des cas particulier dans une théorie générale.

Vocabulaire

□ Les éléments de E sont appelés les **vecteurs**

□ La loi « $\oplus$ » de E est communément appelée **addition** dans E, et pour simplifier les choses, on la note « $+$ »

□ La loi « $\bullet$ » de E est communément appelée **multiplication par un réel** et pour simplifier les choses, $\lambda \bullet u$ est simplement notée λu

□ On appelle vecteur nul de E et on note $\vec{0}_E$, l'élément neutre de la loi « $\oplus$ »

Exemples

$(\mathbb{R}^n, +, \times) \forall n \geq 1$ est un $\mathbb{R}$ -espaces vectoriel.

Pour $n=2$ montrons que $(\mathbb{R}^2, +, \times)$ est un espace vectoriel réel ;

$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}\}$; soient $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2 / \vec{u} = (a, b)$ et $\vec{v} = (c, d)$; $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

□ pour l'opération $+$ on a

P₁) Montrons que $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

$$\vec{u} + \vec{v} = (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) = (c + a, d + b) = \vec{v} + \vec{u}$$

P₂) Montrons que $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$, on dit que la loi $\oplus$ est *associative*.

P₃) Montrons que $\exists! \vec{0}_E \in E$ tel que $\vec{u} + \vec{0}_E = \vec{0}_E + \vec{u}$ le couple $(0,0)$ est l'élément neutre pour $+$

P₄) Montrons que $\exists! \vec{u}' \in E$ tel que $\vec{u} \oplus \vec{u}' = \vec{0}_E$, soit $\vec{u} = (a, b)$ le couple $\vec{u}' = (-a, -b)$ est l'opposé ou le symétrique de $\vec{u}$.

□ Pour l'opération $\times$ on a :

P₅) Montrons que 1 est l'élément unitaire si $\vec{u} = (a, b)$ on a $1 \times \vec{u} = 1(a, b) = (1 \times a, 1 \times b) = (a, b) = \vec{u}$,

P₆) Montrons que $(\alpha + \beta) \times \vec{u} = (\alpha \times \vec{u}) + (\beta \times \vec{u})$ si $\vec{u} = (a, b)$ alors

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \times \vec{u} &= (\alpha + \beta)(a, b) = ((\alpha + \beta)a, (\alpha + \beta)b) = (\alpha a + \beta a, \alpha b + \beta b) \\ &= \alpha(a, b) + \beta(a, b) = (\alpha \times \vec{u}) + (\beta \times \vec{u}) \end{aligned}$$

P₇) Montrons que $\alpha \times (\beta \times \vec{u}) = (\alpha \times \beta) \times \vec{u}$

$$\begin{aligned} \alpha \times (\beta \times \vec{u}) &= \alpha \times (\beta \times (a, b)) = \alpha \times ((\beta \times a, \beta \times b)) = ((\alpha \times \beta \times a, \alpha \times \beta \times b)) = \\ &= (\alpha \times \beta) \times (a, b) = (\alpha \times \beta) \times \vec{u} \end{aligned}$$

P₈) Montrons que $\alpha \times (\vec{u} + \vec{v}) = (\alpha \times \vec{u}) + (\alpha \times \vec{v})$

$$\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha((a, b) + (c, d)) = \alpha(a, b) + \alpha(c, d) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$$

On utilise le même cheminement pour montrer que $\mathbb{R}^n \forall n \geq 1$ est un $\mathbb{R}$ -espaces vectoriel.

Propriété :

P₁) $\vec{0}_E$, est unique.

P₂) Soient $\vec{u}, \vec{v} \in E, \exists! \vec{w} \in E / (\vec{u} \oplus \vec{v}) = \vec{w}$

P₃) Soit $\vec{u} \in E, \exists! \vec{u}' \in E / (\vec{u} \oplus \vec{u}') = \vec{0}_E$, on note $\vec{u}' = -\vec{u}$

P₄) $\alpha \cdot \vec{u} = \beta \cdot \vec{u} \Rightarrow \alpha = \beta$ ou $\vec{u} = \vec{0}_E$

P₅) $\alpha \cdot \vec{u} = \vec{0}_E \Rightarrow \alpha = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}_E$

P₆) $\alpha \cdot (-\vec{u}) = -\alpha\vec{u} = (-\alpha)\vec{u}$

2- Sous espace vectoriel

2.1- Définition et propriété

Définition

Soit E un espace vectoriel réel et F une partie de E .

F est un sous espace vectoriel de E ssi F est stable pour $\oplus$ et $\cdot$ c'est-à-dire :

P₁) $F \neq \emptyset$.

P₂) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in F, (\vec{u} \oplus \vec{v}) \in F$

P₃) $\forall \vec{u} \in F, \forall \alpha \in \mathbb{R} \alpha \cdot \vec{u} \in F$

Exemple

Si $E = \mathbb{R}^3, F = \{(x,y,z) / x+y-z=0\}$ est un sous espace vectoriel de E.

Preuve

i) $F \neq \emptyset$, car $(0 ; 0 ; 0) \in F$, puisque $0+0-0=0$

ii) Soit $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ tel que $\vec{u}, \vec{v} \in F$, montrons que $(\vec{u} \oplus \vec{v}) \in F$
 $(\vec{u} \oplus \vec{v})(x + x'; y + y'; z + z')$

$x + x' + y + y' - (z + z') = x+y-z+x'+y'-z'=0+0=0$

Donc $(\vec{u} \oplus \vec{v}) \in F$

iii) $\forall \vec{u} \in F, \forall \alpha \in \mathbb{R}$ montrons que $\alpha \cdot \vec{u} \in F$

$\alpha \cdot \vec{u}(\alpha x; \alpha y; \alpha z)$

$\alpha x + \alpha y - \alpha z = \alpha(x + y - z) = \alpha \times 0 = 0$

Donc $\alpha \cdot \vec{u} \in F$

D'après i), ii), iii) F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

Propriété Soit E un espace vectoriel réel et F une partie de E.

F est un sous espace vectoriel de E ssi $F \neq \emptyset$ et $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in F, (\alpha \cdot \vec{u} \oplus \beta \cdot \vec{v}) \in F$

Preuve

$\Rightarrow$ Supposons que F est un sous espace vectoriel de E on a

i) $F \neq \emptyset$, par définition d'un sous espace vectoriel

ii) Soit $\vec{u}, \vec{v} \in F, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ montrons que $(\alpha \vec{u} \oplus \beta \vec{v}) \in F$

Par définition d'un sous espace vectoriel $\alpha \vec{u} \in F$ et $\beta \vec{v} \in F$

$(\alpha \vec{u} \oplus \beta \vec{v}) \in F$ par définition d'un sous espace vectoriel.

$\Leftarrow$ Supposons $F \neq \emptyset$ et $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in F, (\alpha \cdot \vec{u} \oplus \beta \cdot \vec{v}) \in F$

i) $F \neq \emptyset$,

ii) pour $\alpha = \beta = 1$ on a $(\vec{u} \oplus \vec{v}) \in F$

iii) pour $\alpha = \alpha$ et $\beta = 0$ on a $\alpha \cdot \vec{u} + 0 \cdot \vec{v} = \alpha \cdot \vec{u} \in F$

Donc F est un sous espace vectoriel de E.

Proposition

P1) Tout sous espace vectoriel est un espace vectoriel.

P2) Toutes les propriétés d'un sous espace vectoriel sont les même que celle d'un espace vectoriel.

P3) $\{\vec{0}_E\}$ est un sous espace vectoriel de tout espace vectoriel E appelé espace vectoriel nul de E.

2.2- Intersection d'une famille de sous espaces vectoriels

Propriété : Si $(E, \oplus, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ et si $(E_i)_{i \in I}$ est une famille de sous espace vectoriel de E alors $\bigcap_{i \in I} E_i$ un sous espace vectoriel de E.

Preuve :

i) $\forall i \in I, \vec{0}_E \in E_i$, car E_i est sous espace vectoriel de E, d'où $\bigcap_{i \in I} E_i \neq \emptyset$,

ii) $\forall \vec{u} \in \bigcap_{i \in I} E_i, \forall \alpha \in \mathbb{R}$ montrons que $\alpha \cdot \vec{u} \in \bigcap_{i \in I} E_i$

Si $\vec{u} \in \bigcap_{i \in I} E_i$ alors $\vec{u}$ appartient à tous les E_i

Ainsi $\alpha \cdot \vec{u}$ appartient à tous les E_i car les E_i sont sous espaces vectoriels.

D'où $\alpha \cdot \vec{u} \in \bigcap_{i \in I} E_i$

iii) Soit $\vec{u}, \vec{v} \in \bigcap_{i \in I} E_i$ montrons que $\vec{u} + \vec{v} \in \bigcap_{i \in I} E_i$

Si $\vec{u}, \vec{v} \in \bigcap_{i \in I} E_i$ alors $\vec{u}, \vec{v}$ appartient à tous les E_i

Ainsi $\vec{u} + \vec{v}$ appartient à tous les E_i car les E_i sont sous espaces vectoriels.

D'où $\vec{u} + \vec{v} \in \bigcap_{i \in I} E_i$

D'après i), ii), iii) $\bigcap_{i \in I} E_i$ est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

Remarque : Si A et B sont deux sous espaces vectoriels de E alors $A \cup B$ n'est pas toujours un sous espace vectoriel de E.

2.3- Somme de deux sous espace vectoriel

Définition Soit E_1 et E_2 deux sous espaces vectoriels de E. on appelle somme des sous espaces vectoriels E_1 et E_2 l'ensemble $E' = \{\vec{u} \in E \text{ tel que } \exists \vec{u}_1 \in E_1, \vec{u}_2 \in E_2, \vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2\}$

Propriété : E' est un sous espace vectoriel de E noté $E_1 + E_2$ et contenant $E_1 \cup E_2$

Preuve : Exercice

2.4-Somme directe

Définition

La somme de deux sous espaces vectoriels de E_1 et E_2 est direct ssi $\forall \vec{u} \in E_1 + E_2 \exists ! \vec{u}_1 \in E_1 \text{ et } \exists ! \vec{u}_2 \in E_2 \text{ tel que } \vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$.

Propriété La somme de deux sous espaces vectoriels de E_1 et E_2 est direct ssi $E_1 \cap E_2 = \{\vec{0}_E\}$ on note $E_1 \oplus E_2$

2.5-Sous espace vectoriels supplémentaires

Soit E un espace vectoriel réel si E_1 et E_2 sont deux sous espaces vectoriels de E tel que $E = E_1 \oplus E_2$, on dira que E_1 et E_2 sont deux sous espaces supplémentaires de E.

II- Base d'un espace vectoriel réel

1. Combinaison linéaire

Soient $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$ n vecteurs d'un $\mathbb{R}$ – espace vectoriel E.

On dit qu'un élément $\vec{u}$ de E est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$ s'il existe des nombres réels $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tel que $\vec{u} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_n \vec{u}_n$

Exemple :

Dans le $\mathbb{R}$ -e.v ($\mathbb{R}^3, +, \cdot$), on considère les vecteurs $\vec{e}_1 = (1 ; 0 ; 0)$, $\vec{e}_2 = (0 ; 1 ; 0)$, $\vec{e}_3 = (0 ; 0 ; 1)$

Le vecteur $\vec{u}$ défini par $\vec{u} \left(2; 3; \frac{1}{2} \right)$; peut encore s'écrire : $\vec{u} = 2\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + \frac{1}{2}\vec{e}_3$.

Alors $\vec{u}$ est une combinaison linéaires des vecteurs $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ affectés des coefficients respectifs 2, -3 et $\frac{1}{2}$

2. Famille génératrice.

Une famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$ de p vecteurs d'un IR-e.v E est dite génératrice d'un sous espace vectoriel E' de E si tout vecteur de E' est combinaison linéaire des vecteurs de la famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$.

Propriété

Soit E un IR-e.v et $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$ une famille de p vecteurs de E

L'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$ est un sous espace vectoriel de E .

On l'appelle le sous espace vectoriel engendré par la famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$.

3. Famille liée ou linéairement dépendante

Une famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$ de p vecteurs d'un IR-e.v E est dite liée si :

$$\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^p \alpha_k \vec{u}_k = \vec{0}_E \Rightarrow (\alpha_1; \alpha_2; \dots; \alpha_p) \neq (0; 0; \dots; 0)$$

Remarque :

R1) Toute famille contenant le vecteur nul est liée.

R2) Pour qu'une famille soit liée il faut et il suffit que l'un des vecteurs sont combinaison linéaire des autres.

Exemple : $B = \{(0; 0), (1; 2), (5; 7)\}$ est une famille liée.

4. Famille libre ou linéairement indépendante.

Une famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p)$ de p vecteurs d'un IR-e.v E est dite libre si :

$$\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^p \alpha_k \vec{u}_k = \vec{0}_E \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0$$

Exemple $A = \{(2; 3), (4; 7)\}$ $A \subset \mathbb{R}^2$

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $\alpha(2; 3) + \beta(4; 7) = 0_{\mathbb{R}^2}$

$$\begin{cases} 2\alpha + 4\beta = 0 \\ 3\alpha + 7\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6\alpha + 12\beta = 0 \\ -6\alpha - 14\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow -2\beta = 0 \text{ ie } \beta = 0$$

Ainsi $\alpha = 0$

Donc A est une famille libre.

5. Base d'un IR-espace vectoriel

Définition :

Soit E un IR-e.v non réduit au singleton $\{\vec{0}_E\}$.

Toute famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$ libre **et** génératrice de E est appelé base de E

Exercice d'application:

I- Montrer que $F = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - 3y = 0\}$ est un s.e.v. De $\mathbb{R}^2$

II- E est un plan vectoriel de base $(\vec{i}; \vec{j})$. On donne $\vec{e}_1 = \vec{i} - 2\vec{j}$, $\vec{e}_2 = \vec{i} + \vec{j}$

1- Montrer que $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une base de E .

2- Donner les composantes de $\vec{u} = 2\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2$ dans $(\vec{i}; \vec{j})$.

3- Donner les composantes de $\vec{v} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ dans $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$

On considère $\mathbb{R}^2$ muni de sa base canonique $(\vec{i}; \vec{j})$ les vecteurs

$$\vec{u} = (m^2 - m) + 2m\vec{j} \quad ; \quad \vec{v} = (m - 1)\vec{i} + (m + 1)\vec{j}, \quad m \in \mathbb{R}$$

1- Déterminer m pour que le système $(\vec{u}; \vec{v})$ soit : a) lié b) libre.

2- On prend $m=2$

I- Vérifier que $(\vec{u}; \vec{v})$ forme une base.

II- Déterminer les composantes de $\vec{w} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ dans $(\vec{u}; \vec{v})$

E est un plan vectoriel de base $(\vec{i}; \vec{j})$ et f un endomorphisme de e défini par

$$f(\vec{i}) = \vec{i} - \vec{j} \text{ et } f(\vec{j}) = -2\vec{i} + 4\vec{j}; \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} \text{ et } \vec{u}' = x'\vec{i} + y'\vec{j} / \vec{u}' = f(\vec{u})$$

- 1- Définir analytiquement f
- 2- Déterminer le noyau et l'image de f, tout en donnant une base et la dimension de chacun de ces sous espaces
- 3- On donne $\vec{e}_1 = \vec{i} + \vec{j}$ $\vec{e}_2 = 2\vec{i} - \vec{j}$
 - I- Montrer que $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une base de E
 - II- Déterminer les composantes de $f(\vec{e}_1)$ et $f(\vec{e}_2)$ dans la base $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$

Remarque

Soit E un IR-e.v non réduit au singleton $\{0_E\}$.

Si E possède une base de n vecteurs, alors toute autre base de E possède n vecteurs. Et l'entier naturel n est appelé **dimension** de E, et on dit que E est de dimension fini.

On note **n = dim E**

Par convention, $\dim\{0_E\} = 0$

Exemple :

$$\dim \mathbb{R} = 1; \dim \mathbb{R}^2 = 2; \dim \mathbb{R}^3 = 3; \dim L(P_n) = n;$$

Propriété

Soit E un IR-e.v non réduit au singleton $\{0_E\}$ et de dimension n.

Pour toute base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ de E et tout vecteur $\vec{v}$ de E, il existe un unique n-uplet de réels $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ tel que $\vec{v} = \alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \dots + \alpha_n\vec{e}_n$

Vocabulaire : les réels $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont les coordonnées du vecteur v dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$

Exemple Dans $\mathbb{R}^2$, $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ alors si $\vec{v} = 6\vec{e}_1 + 8\vec{e}_2 \Rightarrow \vec{v}(6; 8)$

7. Sous-espace vectoriel d'un IR-e.v de dimension fini

Soit E un IR-e.v de dimension finie n.

Propriétés

P₁) Tout sous espace vectoriel F de E est de dimension finie p et l'on a $p \leq n$

P₂) Toute famille libre **ou** génératrice de **n** vecteurs **de E** est une base de E

Remarque : (cas particulier de la dimension 2)

Soit E un IR-e.v de dimension finie 2 et $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ une base de E.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ deux vecteurs de E de coordonnées respectives $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{u}'(x', y')$ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$

Les énoncés suivants sont équivalents :

- $(u; u')$ est une famille libre de E ;
- $(u; u')$ est une famille génératrice de E ;
- $(u; u')$ est une base de E ;
- $\det(u; u') = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y \neq 0$.

Vocabulaire

- Tout IR-e.v ou sous espace vectoriel de dimension 1 est appelé **droite vectorielle**

- Tout IR-e.v ou sous espace vectoriel de dimension 2 est appelé **plan vectoriel**

□ Leçon 2 : APPLICATIONS LINÉAIRES - MATRICES

I. Application linéaire

1-Définition et propriété

Soient E et F deux IR-e.v et f une application de E vers F.

f est une application linéaire si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E : f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \vec{u} \in E : f(\alpha \vec{u}) = \alpha f(\vec{u})$

Propriété

Soient E et F deux IR-e.v et f une application de E vers F.

f est une application linéaire si et seulement si : $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E ; \forall \alpha, \beta : f(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \alpha f(\vec{u}) + \beta f(\vec{v})$

Remarques

Soient E et F deux IR-e.v et f une application linéaire de E vers F.

R₁) Toute application linéaire de E vers F est un homomorphisme d'espace vectoriel de E vers F ;

R₂) On a : $f(0_E) = 0_F$ et $f(-u) = -f(u)$;

R₃) Si $F = \mathbb{R}$, f est une **forme linéaire** sur E :

R₄) Si $F = E$, f est un **endomorphisme** de E.

2. Image et Noyau d'une application linéaire

Soit f une application linéaire d'un IR-e.v E vers un IR-e.v F

Définition 1

L'image de f, notée **Im f**, est le sous-ensemble de F constitué des images $f(\vec{u})$ de tous les vecteurs $\vec{u}$ de E

$$Im f = \{f(\vec{u}) ; \vec{u} \in E\}$$

Définition 2

Le noyau de f, noté **Ker f** est le sous-ensemble de E défini par :

$$Ker f = \{\vec{u} \in E / f(\vec{u}) = 0_F\}$$

Propriétés

P1 : Ker f est un sous espace vectoriel de E ;

P2 : Im f est un sous espace vectoriel de F ;

P3 : f est injective si et seulement si $Ker f = \{0_E\}$;

P4 : f est surjective si et seulement si $Im f = F$;

P5 : Pour toute famille $\{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$ génératrice de E, la famille $\{f(e_i)\}_{1 \leq i \leq n}$ est une famille génératrice de F ;

P6 : Pour toute famille $\{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$ libre de E, la famille $\{f(e_i)\}_{1 \leq i \leq n}$ est une famille libre de F ssi f est injective.

Preuve

Propriété

Soit E un IR-e.v de dimension finie $n \geq 1$ et f un endomorphisme de E. Les énoncés suivants sont équivalents.

- (i) f est injective ;
- (ii) f est surjective ;
- (iii) f est bijective.

3- Isomorphisme

Soit f une application linéaire d'un IR-e.v E vers un IR-e.v F. Si f est bijective, on dit que f est un isomorphisme de E vers F.

Remarques

- R1) Un isomorphisme de E vers E est encore appelé **automorphisme** de E ;
- R2) On note $L(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F : $(L(E, F), +, \cdot)$ est un IR-e.v .

Propriété : Soit f est un isomorphisme de E vers F.

- P1**-L'image d'un sous espace vectoriel de E par f est sous espace vectoriel de F ;
 - P2**- L'image réciproque d'un sous espace vectoriel de F par f est sous espace vectoriel de E ;
 - P3**-Pour toute famille génératrice $\{\vec{e}_i\}_{1 \leq i \leq n}$ de E, la famille $\{f(\vec{e}_i)\}_{1 \leq i \leq n}$ est une famille génératrice de $f(E)$ de F.
 - P4**- Pour toute base $\{\vec{e}_i\}_{1 \leq i \leq n}$ de E, la famille $\{f(\vec{e}_i)\}_{1 \leq i \leq n}$ est une base de $f(E)$ de F.
- En générale l'image d'un truc par un isomorphisme d'espace vectoriel est un truc

II- Matrice d'une application linéaire

Dans toute la suite :

- E est un IR-e.v de dimension fini n ($n \geq 1$). On pose $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ une base de E
- F est un IR-e.v de dimension fini ($m \geq 1$). On pose $B' = (\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_m)$ une base de F

Cas des plans vectoriels ($\dim E = \dim F = 2$)

$B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ et $B' = (\vec{e}'_1, \vec{e}'_2)$

Soit f une application linéaire du IR-e.v E vers le IR-e.v F

1- Définition et Propriété

F est entièrement déterminée par la donnée de $f(\vec{e}_1) = \alpha \vec{e}'_1 + \beta \vec{e}'_2$ et de $f(\vec{e}_2) = \gamma \vec{e}'_1 + \delta \vec{e}'_2$

On appelle matrice de f relativement aux bases B et B' le tableau carré : $\begin{bmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{bmatrix}$

Vocabulaire : ce tableau est appelé matrice carrée réelle d'ordre deux (ou matrice réelle 2 x 2)

Propriété : Si un vecteur $\vec{u}$ de E s'écrit $\vec{u} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ dans la base B , alors

$$f(\vec{u}) = f(x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2) = xf(\vec{e}_1) + yf(\vec{e}_2)$$

$$= x(\alpha \vec{e}'_1 + \beta \vec{e}'_2) + y(\gamma \vec{e}'_1 + \delta \vec{e}'_2) = (x\alpha + y\gamma)\vec{e}'_1 + (x\beta + y\delta)\vec{e}'_2$$

donc $f(\vec{u}) = \vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x\alpha + y\gamma \\ x\beta + y\delta \end{pmatrix}$ dans la base B'.

On écrit ce résultat sous forme matricielle : $\begin{pmatrix} x\alpha + y\gamma \\ x\beta + y\delta \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

On note M_2 l'ensemble des matrices carrées d'ordre deux.

Soient $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}$ des matrices des applications linéaires f et g respectivement.

2-Déterminant d'une matrice

Soit $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ une matrice de M_2 .

On appelle déterminant de A le réel $\det A = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Propriété:

Soient A et B deux matrices de M_2 , on a $\det (A \times B) = \det A \times \det B$

Théorème

Soient f une application linéaire d'un plan vectoriel E vers un plan vectoriel F , et soit M la matrice de f relativement à des bases B et B' de E et F respectivement.

Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (1) f est bijective (c'est-à-dire f est un isomorphisme de E vers F)
- (2) $\det M \neq 0$

Exercice d'application

E est un espace vectoriel de dimension 2 rapporté à la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

Soit f un endomorphisme de E défini par : $f(\vec{i}) = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = 2\vec{i} + 2\vec{j}$

1) a) Ecrire la matrice A de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

B) f est-il un automorphisme ?

C) Déterminer le noyau de f , $\text{Ker} f$ et l'image de f , $\text{Im} f$.

2) on pose : $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{i} + \vec{j}$.

A) Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de E . Déterminer la matrice B de f dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$.

3- Addition

Par définition, la somme $A + B$ est la matrice de l'application linéaire $f + g$, et on a :

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + a' & c + c' \\ b + b' & d + d' \end{bmatrix}$$

4- Multiplication

Par définition, le produit $A \times B$ est la matrice de l'application linéaire $f \circ g$, et on a :

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' + cb' & ac' + cd' \\ ba' + db' & bc' + dd' \end{bmatrix}$$

Attention ! En général : $A \times B \neq B \times A$

Remarques

On définit la multiplication d'une matrice A par un réel α par : $\alpha A = \alpha \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a & \alpha c \\ \alpha b & \alpha d \end{bmatrix}$

αA est la matrice de l'application linéaire αf

Propriété

$(M_2, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -e.v de dimension 4, et de base canonique $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4)$ telle que

$$\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \vec{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \vec{e}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Remarque :

- L'élément neutre pour la loi + , appelé matrice nulle, est la matrice $0_{M_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- L'élément neutre pour la loi x , appelé matrice unité, est la matrice $1_{M_2} = I_{M_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

5-Matrice inverse

Si $\det A = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$ alors la matrice inverse de A est définie par :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

Exemple $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$; $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 2 \\ \frac{1}{3} & -1 \end{bmatrix}$

I. Espace vectoriel

Exercice 1 :

III- Montrer que $F = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - 3y = 0\}$ est un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$

IV- E est un plan vectoriel de base $(\vec{i}; \vec{j})$. On donne $\vec{e}_1 = \vec{i} - 2\vec{j}$, $\vec{e}_2 = \vec{i} + \vec{j}$

4- Montrer que $(e_1; e_2)$ est une base de E

5- Donner les composantes de $\vec{u} = 2\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2$ dans $(\vec{i}; \vec{j})$.

6- Donner les composantes de $\vec{v} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ dans $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$

On considère $\mathbb{R}^2$ muni de sa base canonique $(\vec{i}; \vec{j})$ les vecteurs

$$\vec{u} = (m^2 - m) + 2m\vec{j} \quad ;$$

$$\vec{v} = (m - 1)\vec{i} + (m + 1)\vec{j}, \quad m \in \mathbb{R}$$

3- Déterminer m pour que le système $(\vec{u}; \vec{v})$ soit : a) lié b) libre

4- On prend m=2

III- Vérifier que $(\vec{u}; \vec{v})$ forme une base

IV- Déterminer les composantes de

$$\vec{w} = 3\vec{i} + 4\vec{j} \text{ dans } (\vec{u}; \vec{v})$$

E est un plan vectoriel de base $(\vec{i}; \vec{j})$ et f un endomorphisme de E défini par $f(\vec{i}) = \vec{i} - 2\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = -2\vec{i} + 4\vec{j}$; $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\vec{u}' = x'\vec{i} + y'\vec{j}$ tels que $\vec{u}' = f(\vec{u})$

4- Définir analytiquement f

5- Déterminer le noyau et l'image de f, tout en donnant une base et la dimension de chacun de ces sous espaces

6- On donne $\vec{e}_1 = \vec{i} + \vec{j}$ $\vec{e}_2 = 2\vec{i} - \vec{j}$

III- Montrer que $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une base de E

IV- Déterminer les composantes de $f(\vec{e}_1)$ et $f(\vec{e}_2)$ dans la base $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$

Exercice 3 :

I- soit l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}^2$ muni de la base canonique $(\vec{i}; \vec{j})$ soit f

$$= \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / x - y = 0\} \text{ g} =$$

$$\{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / 2x + y = 0\}$$

1) montrer que f est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

2) Déterminer une base $\vec{e}_1$ de f et une base $\vec{e}_2$ de g.

3) montrer que $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est libre ; en déduire que $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

4) soit f un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dont sa matrice par rapport a $(\vec{i}; \vec{j})$ est

$$M_{(\vec{i}; \vec{j})}^f = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

a) déterminer l'expression analytique de f dans $(\vec{i}; \vec{j})$.

b) déterminer $f(\vec{e}_1)$ et $f(\vec{e}_2)$ en fonction de $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$

c) quelle est alors la matrice de f dans la base $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$.

d) calculer $\det M_{(\vec{i}; \vec{j})}^f$; qu'en déduire ?

e) déterminer l'inverse de $M_{(\vec{i}; \vec{j})}^f$.

f) calculer $M_{(\vec{i}; \vec{j})}^f \cdot M_{(\vec{e}_1; \vec{e}_2)}^f$.

5) montrer que dans l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}^3$ le système $(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w})$ tel que $\vec{u}(1; 2; -1)$ $\vec{v}(0; 1; 1)$ et $\vec{w}(1; 5; 2)$ est lié.

II- soit E un plan vectoriel réel, $(\vec{i}; \vec{j})$ une base E ; et f_a l'application linéaire de E dans E qui au vecteur $\vec{u}(x, y)$ associe le vecteur $\vec{u}'(x', y')$ tel

$$\text{que : } \begin{cases} x' = x \\ y' = (1 - a)x + ay \end{cases} \text{ ou } a \text{ est un réel donne.}$$

1) Ecrire la matrice de f_a dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$.

pour quelle valeur de a f_a est-elle un isomorphisme de E sur E ?

2) Déterminer, suivant les valeurs de a, l'ensemble des vecteurs de E invariants par f_a .

3) on se place dans le cas a = 0

a. Déterminer le noyau $\ker f_0$ et l'image $\text{im } f_0$ de f_0

$$\text{On rappelle que : } \text{Ker } f_0 = \{\vec{u} \in E / f_0(\vec{u}) = 0\}$$

$$\text{im } f_0 = \{\vec{u} \in E / \exists \vec{v} \in E, f_0(\vec{v}) = \vec{u}\}$$

b. On pose : $\vec{I} = \vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{J} = \vec{j}$.

Montrer que $(\vec{I}; \vec{J})$ est une base de E et écrire la matrice f_0 dans cette base.

Chapitre 8 : TRANSFORMATIONS DU PLAN COMPLEXE

1. ECRITURE COMPLEXE DES ISOMETRIES ET DE L'HOMOTHETIE

1.1 Activité

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points $M(z)$, $M'(z')$, $\Omega(\omega)$ et un vecteur $\vec{u}(a)$.

- On suppose que dans cette question M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$. On rappelle que $t_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$, donne une relation entre z , a et z' .
- On suppose dans cette question que M' est l'image de M par la rotation r de centre Ω et d'angle θ .
 - Donne une interprétation géométrique de $\arg \frac{z'-\omega}{z-\omega}$
 - On rappelle que $r(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ \text{mes}(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta \end{cases}$, donne la valeur $\left| \frac{z'-\omega}{z-\omega} \right|$, un argument de $\frac{z'-\omega}{z-\omega}$ puis la forme exponentielle de $\frac{z'-\omega}{z-\omega}$
 - Déduire une expression entre z, z', ω et θ
- On suppose dans cette question que M' est l'image de M par la symétrie de centre Ω . On rappelle que $S_{\Omega}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = -\overrightarrow{\Omega M}$
Donne une relation entre z, z' et ω
- On suppose que M' est l'image de M par l'homothétie h de centre Ω et de rapport k non nul
On rappelle que $h(k, \Omega)(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$, donne une relation entre z', z, ω et k .

1.2 Résolution

- Puisque $t_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$, on a : $z' - z = a \Leftrightarrow z' = z + a$ (cette dernière est l'écriture complexe de la translation t)
- $\arg \frac{z'-\omega}{z-\omega} = \text{mes}(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$
 - $\left| \frac{z'-\omega}{z-\omega} \right| = 1, \text{Arg} \frac{z'-\omega}{z-\omega} = \text{mes}(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta$ donc $\frac{z'-\omega}{z-\omega} = e^{i\theta}$
 - $\frac{z'-\omega}{z-\omega} = e^{i\theta} \Leftrightarrow z' - z = e^{i\theta}(z - \omega)$ (Cette dernière est l'expression complexe de la rotation r)
- Puisque $S_{\Omega}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = -\overrightarrow{\Omega M}$, on a : $z' - \omega = -(z - \omega)$ (cette dernière est l'expression complexe de la symétrie S)
- Puisque $h(k, \Omega)(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$ alors on a : $z' - \omega = k(z - \omega)$ (cette dernière est l'expression complexe de l'homothétie h)

1.3 Résumé

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$

- L'écriture complexe d'une translation de vecteur $\vec{u}(b)$ est de la forme : $z' = z + b$

2. L'écriture complexe d'une rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ est de la forme $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$
3. L'écriture complexe d'une symétrie centrale de centre $\Omega(\omega)$ est de la forme $z' - \omega = -(z - \omega)$
4. L'écriture complexe d'une homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k (non nul) peut s'écrire de la forme $z' - \omega = k(z - \omega)$

1.4 Exercice d'application

Soit les points $\Omega(-2,1)$, $A(1, -1)$, $B(1,1)$ et le réel $\theta = \frac{2\pi}{3}$

Dans chacun des cas :

- a) Donner l'écriture complexe de la transformation
- b) Donner l'image du point A ainsi que l'image de la droite (AB)

Cas 1 : Symétrie de centre Ω

Cas 2 : Homothétie de centre Ω et de rapport $-\frac{1}{4}$

Cas 3 : La rotation de centre Ω et d'angle θ

Cas 4 : La symétrie orthogonale d'axe (AB)

Remarque

1. On peut également donner l'écriture complexe d'une symétrie orthogonale en suivant les étapes suivantes :

On suppose que M' est l'image de M par la symétrie orthogonale d'axe (D) notée $S_{(D)}$ et on pose $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $M' \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

- a) Donner l'expression analytique $S_{(D)}$
- b) En posant $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, exprimer z' en fonction $\bar{z}$

2. On remarquera que l'écriture complexe d'une symétrie orthogonale est de la forme $z' = a\bar{z} + b$ avec $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$

Exemple (Cas particuliers)

Soit $M(z)$, $M'(z')$ et $H(h)$ trois points du plan complexe. On suppose que M' est l'image de M par la symétrie orthogonale d'axe (D) notée $S_{(D)}$, H le projeté orthogonal du point M sur la droite (D) et on pose $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $M' \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et $H \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$.

$$S_{(D)}(M) = M' \Leftrightarrow \overline{HM'} = -\overline{HM}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' - h_1 = -(x - h_1) \\ y' - h_2 = -(y - h_2) \end{cases} \quad (1)$$

1. Si (D) est l'axe de abscisses

On a : $h_1 = x$ et $h_2 = 0$ donc (1) devient $\begin{cases} x' - x = -(x - x) \\ y' - 0 = -(y - 0) \end{cases}$

Soit $\begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases}$ D'où $z' = x - iy = \bar{z}$

Donc l'écriture complexe de la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des abscisse est : $z' = \bar{z}$

2. Si (D) est l'axe des ordonnées

On a : $h_1 = 0$ et $h_2 = y$ donc (1) devient
$$\begin{cases} x' - 0 = -(x - 0) \\ y' - y = -(y - y) \end{cases}$$

Soit
$$\begin{cases} x' = -x \\ y' = y \end{cases}$$
 D'où $z' = -x + iy = -\bar{z}$ donc $z' = -\bar{z}$

2. SIMILITUDE DIRECTE PLANE

2.1 Définition

Une **similitude** est la composée d'une isométrie et d'une homothétie.

Remarque

Une **similitude est dite directe** si l'isométrie est un déplacement et elle est dite indirecte si l'isométrie est un antidéplacement.

Exemple

- Une translation et une rotation sont des similitudes directes
- Une symétrie orthogonale est une similitude indirecte

2.2 Propriété

Toute similitude directe s du plan dans lui-même a une écriture complexe de la forme $z' = az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$.

Preuve

Puisque s est une similitude directe du plan, elle est le composé d'un déplacement (translation ou rotation) et d'une homothétie.

D'après le point 1. Du résumé précédent

. L'expression complexe d'un déplacement est de la forme : $z' = e^{i\alpha}z + c$ (si $\alpha = 2k\pi$ on a une translation sinon on a une rotation qu'on peut caractériser) avec $c \in \mathbb{C}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

. L'expression complexe d'une homothétie h de rapport k est de la forme : $z' = kz + d$ avec $d \in \mathbb{C}$ et $k \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$

Ainsi l'expression complexe de $r \circ h = h \circ r$ est de la forme : $z' = e^{i\alpha}(kz + d) + c = ke^{i\alpha}z + de^{i\alpha} + c$ en posant $a = ke^{i\alpha}$ et $b = de^{i\alpha} + c$ on a bien $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$
Et $z' = az + b$ d'où le résultat

Remarque

- On dira que $\Omega(\omega)$ est un point invariant (lorsqu'il existe) s'il est solution de l'équation : $z = az + b$ autrement dit lorsque $a \neq 1$, on a un unique point invariant $\Omega\left(\frac{b}{1-a}\right)$
- Si $a = 1$, on a une translation de vecteur $\vec{u}(b)$
- Si $a = k \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$, on a une homothétie de rapport k et de centre l'unique point invariant $\Omega(\omega)$
- Sinon on calcule $|a|$
 - Si $|a| = 1$, on a une rotation de centre l'unique point invariant Ω et d'angle $\text{Arg}(a)$
 - Si $|a| \neq 1$, on a une similitude directe plane de centre l'unique point invariant $\Omega(\omega)$, de rapport $k = |a|$ et d'angle $\theta = \text{Arg}(a)$.

2.3 Exercice d'application

1. Dans chacun des cas suivants, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application du plan dans le plan qui à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$

a) $z' = (1 + i)z$

b) $z' = (\sqrt{3} - i)z + 1 + i(\sqrt{3} - i)$

c) $z' = -2z + i$

2. donner l'écriture complexe de la similitude directe plane qui transforme les points $A(\frac{1}{2} + i)$ et $B(i)$ respectivement en $C(1)$ et $D(1 + i)$

3. Donner l'écriture complexe de la similitude directe de centre $\Omega(1 + i)$, d'angle $\theta = \frac{\pi}{3}$ et de rapport $k = \sqrt{2}$

2.4 Propriétés

Soit s et s' deux similitudes directes planes d'angles respectifs α et α' , de rapport respectifs k et k' .

a) $s \circ s'$ est une similitude de rapport kk' et d'angle $\alpha + \alpha'$

b) La réciproque s^{-1} de s est une similitude de rapport $\frac{1}{k}$ et d'angle $-\alpha$

Preuve (indications)

a) Il suffit de considérer les écritures complexes de s et s' puis chercher $s \circ s'$

b) Considérer l'expression complexe de s , exprimer z en fonction de z' puis conclure

Exercice d'application

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'écriture complexe, puis la nature et les éléments caractéristiques des transformations s_1^{-1} et

$$s_1 \circ s_2$$

a) $s_1: z' = 2iz + 1 - 2i$ et $s_2: z' = \frac{1}{2}iz + 1 - \frac{1}{2}i$

b) $s_1: z' = (1 - i)z + 1 + i$ et $s_2: z' = -2z$

Remarques et rappels

1. Considérons une similitude s de centre Ω , d'angle θ et de rapport k .

M, N, M' et N' des points distincts du plan.

a. $s(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} \Omega M' = k \Omega M \\ Mes(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta \end{cases}$

b. $\begin{cases} s(M) = M' \\ s(N) = N' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M'N' = kMN \\ Mes(MN, M'N') = \theta \end{cases}$

c. La similitude conserve la configuration géométrique c'est-à-dire, l'image d'une droite est une droite, l'image d'un segment de longueur l est un segment de longueur $|k|l$, l'image d'un quadrilatère d'aire A est un quadrilatère de même nature et d'aire

k^2A , l'image d'un solide de volume V est un solide de même nature et de volume $|k^3|V$

2. L'écriture complexe d'une similitude indirecte plan est de la forme $z' = a\bar{z} + b$ avec $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$

3. EXERCICE D'INTEGRATION ET DE DEMONSTRATION

A- ABC est un triangle de sens direct, rectangle et isocèle en A ; A' le symétrique de A par rapport à C .

1. Déterminer le rapport et l'angle de la similitude directe s telle que $s(A') = C$ et $s(C) = B$
2. Déterminer l'image par s de la droite (AC)
3. Soit Ω le centre de s . Démontrer que ΩCB est un triangle rectangle et isocèle ; construire Ω

B- Soit $ABCD$ un carré de côté 1 et de sens direct, I le milieu de $[CD]$. Déterminer d'une méthode géométrique puis d'une méthode algébrique la similitude s telle que $s(I) = B$ et $s(D) = C$

C- Soit f l'application du plan dans lui-même d'expression analytique :
$$\begin{cases} x' = x - y\sqrt{3} + 2\sqrt{3} \\ y' = x\sqrt{3} + y - \sqrt{3} \end{cases}$$

1. Déterminer l'expression complexe de f
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f
3. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f^{-1} ainsi que son expression analytique
4. Déterminer l'image du cercle d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 14 = 0$ ainsi que son aire

Proposé par **WAFO W. Calvin**

CHAPITRE : LA FONCTION LOGARITHME NEPERIEN

1. OBJECTIFS

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Appliquer les propriétés analytiques et algébriques de la fonction logarithme népérien ;
- Résoudre les équations et inéquations comportant $\ln$;
- Etudier une fonction $\ln$.

2. ACTIVITE PREPARATOIRE

Activité : Soit la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$

Avec nos connaissances actuelles sur le calcul des primitives, trouvez une primitive de la fonction f sur $]0; +\infty[$

Solution :

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow F(x) &= -\frac{1}{(1-1)x^{1-1}} + c \text{ (avec } c \in \mathbb{R}) \\ &= -\frac{1}{0} + c \text{ (impossible)} \end{aligned}$$

On ne peut pas trouver une primitive de f sur $]0; +\infty[$ avec nos connaissances actuelles. La fonction f étant continue sur $]0; +\infty[$, il existe une fonction dont la dérivée est $\frac{1}{x}$. Cette fonction est appelée **fonction logarithme népérien**.

3. DEFINITION DE LA FONCTION LOGARITHME NEPERIEN

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est l'unique fonction f , définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ et vérifiant $f(1) = 0$ et pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = \frac{1}{x}$. $\ln$ est la primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1.

$$\forall x > 0, \ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

4. PROPRIETES ALGEBRIQUES ET ANALYTIQUES

4.1. Propriétés algébriques

$$\forall a > 0 \text{ et } b > 0, \ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b).$$

$$\forall a > 0, \ln \frac{1}{a} = -\ln(a).$$

$$\forall a > 0 \text{ et } b > 0, \ln \frac{a}{b} = \ln(a) - \ln(b).$$

$$\forall a > 0 \text{ et } n \in \mathbb{Q}, \ln(a^n) = n \ln(a).$$

$$\forall a > 0, \ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a).$$

NB : Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$. Pour tout réel x strictement positif, $e^{\ln x} = x$

EXERCICE D'APPLICATION

Simplifier les expressions suivantes : $A = \ln(3 - \sqrt{5}) + \ln(3 + \sqrt{5})$; $B = 3 \ln 2 + \ln 5 - 2 \ln 3$; $C = \ln e^2 - \ln \frac{2}{e}$; $D = \ln e^3 - 2(3 \ln \sqrt{e} + \ln e^{3/4})$

4.2. Propriétés analytiques

- La fonction logarithme népérien est définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ et

$$\forall x > 0, (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

La fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$

- Limites aux bornes du domaine :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

- Théorème de croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$$

- Nombre dérivé en 1 :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$$

5. RESOLUTION D'EQUATIONS ET D'INEQUATIONS

$\forall a \in \mathbb{R}$, l'équation $\ln(x) = a$ a une solution et une seule.

$$\forall a > 0 \text{ et } \forall b > 0 (\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b). \forall x > 0 \text{ et } \forall a \in \mathbb{R} \ln(x) = a \Leftrightarrow x = e^a.$$

La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Donc

$$\forall a > 0 \text{ et } \forall b > 0, (\ln(a) < \ln(b) \Leftrightarrow a < b). \forall x > 0 \text{ et } \forall a \in \mathbb{R} \ln(x) < a \Leftrightarrow x < e^a.$$

EXERCICE D'APPLICATION

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes

a) $\ln(3x + 1) = \ln(x - 4)$

d) $2(\ln x)^3 - 4 \ln x^2 = -4 + (\ln x)^2$

b) $\ln(x^2 - 5) = \ln x + 2 \ln 2$

e) $\ln(x^2 - 4) > \ln(4x - 1)$

c) $\ln(x + 2) - \ln 5 = 2 \ln 3 - \ln(x - 2)$

f) $2(\ln x)^3 - (\ln x)^2 - 8 \ln x + 4 \leq 0$

g) $\ln(2x - 1) \leq \ln(-x + 2)$

6. ETUDE DE LA FONCTION LOGARITHME

- Domaine de définition de la fonction logarithme népérien
- Quelques limites avec « ln »

$$D_f =]0; +\infty[$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty ;$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x \ln x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

- La fonction $x \mapsto \ln x$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[. \forall x > 0$,
Donc la fonction $x \mapsto \ln x$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

- Tableau de variations

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$			
		+	+
$f(x)$			
	$-\infty$	0	$+\infty$

Conséquence : il existe un nombre et un seul noté e tel que $\ln e = 1$. Une valeur approchée de e est $e \sim 2,71828$

➤ Représentation graphique

Remarque :

Soit (C) la courbe représentative de la fonction $\ln$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

La tangente à la courbe au point d'abscisse $x = 1$ est la droite d'équation $y = x - 1$

La tangente à la courbe au point d'abscisse $x = e$ est la droite d'équation $y = \frac{x}{e}$ (cette droite passe par le point O)

7. LOGARITHME ET FONCTIONS COMPOSEES

7.1. Dérivée logarithmique

Soit U une fonction dérivable sur un intervalle I . On suppose que U garde un signe constant sur I et $\forall x \in I, U(x) \neq 0$

On suppose que U est positive sur I alors, la fonction $\ln U$ est dérivable sur I et $\forall x \in I$,

$$(\ln U)'(x) = \frac{U'(x)}{U(x)}$$

Si U est négative sur I alors $-U$ est positive sur I et $\forall x \in I, (\ln(-U))'(x) = \frac{U'(x)}{U(x)}$

Ainsi $\forall x \in I, (\ln|U|)'(x) = \frac{U'(x)}{U(x)}$

7.2. Primitives de $f: x \rightarrow \frac{U'(x)}{U(x)}$

Les primitives de $f: x \rightarrow \frac{U'(x)}{U(x)}$ sont les fonctions $F: x \rightarrow \ln |U(x)| + k$ ($k \in \mathbb{R}$)

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 :

1) Déterminer une primitive de f sur I dans chacun des cas suivants :

a) $f(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+1}$ $I =]-\infty; +\infty[$

b) $f(x) = \frac{-\frac{1}{2}x + \frac{5}{4}}{x^2-5x+6}$ $I =]-\infty; 2[$

2) Déterminer la primitive de f sur $I =]0; +\infty[$ qui prend la valeur 0 en $x_0 = 2$

$$f(x) = 3 - \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{2}{x+1}$$

Exercice 2 :

Soit la fonction $f(x) = -x + 1 + \ln(-2x)$

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f
- 2) Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition
- 3) Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations
- 4) Écrire une équation de la tangente à $(C)_f$ au point d'abscisse $x_0 = -\frac{1}{2}$
- 5) Justifier que $(D): x = 0$ est asymptote verticale à $(C)_f$
- 6) Tracer $(C)_f$

Exercice 3 :

On considère la fonction : $f(x) = \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$

- a) Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son domaine
- b) Montrer que l'on peut réduire l'étude de f à $]0; +\infty[$
- c) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations
- d) construire $(C)_f$

7.3. Autres fonctions logarithmiques

La fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$ est appelé **logarithme de base a** ($a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$)

La fonction $\log$ est strictement décroissante sur $]0; 1[$ et strictement croissante sur $]1; +\infty[$

Remarque : Dans le domaine scientifique, on utilise la fonction logarithme décimale, notée $\log_{10}(x)$ est définie par : $\log_{10}(x) = \frac{\ln x}{\ln 10}$

- ❖ **En chimie :** Le pH d'une solution aqueuse est égal à : $pH = -\log[H_3O^+]$ où $[H_3O^+]$ est la concentration de la solution en ions H_3O^+ (en $mol.L^{-1}$).
Exemple : La concentration en ions H_3O^+ d'une solution dont le pH est égal à 7 a pour logarithme décimal -7 elle vaut donc 10^{-7} . Si le pH augmente de 1, il devient égal à 8, le logarithme de la concentration diminue de 1, il devient -8 , la concentration est égale à 10^{-8} . Ainsi, si le pH augmente de 1, la concentration est divisée par 10 et, si le pH diminue de 1, la concentration est multipliée par 10.
- ❖ **Intensité de certains phénomènes naturels :** L'intensité d'un séisme, la luminosité d'une étoile, l'intensité d'un son sont des grandeurs pour lesquelles les unités de mesures utilisent les logarithmes décimaux. En effet, on a observé que nos sens perçoivent un signal proportionnellement au logarithme de son intensité. L'exemple le plus quotidien est le décibel qui sert à mesurer l'intensité du son de nos baladeurs...

NB : Les propriétés algébriques de la fonction logarithme décimale sont analogues à celles de la fonction logarithme népérien.

T.A.F A LA MAISON

Activité 1

Partie A : Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 2 \ln(x) - 1 + \frac{1}{x}$

- 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$
- 2) Calculer $g'(x)$. Dresser, alors, le tableau de variations de g .
- 3) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions α et β . ($\alpha < \beta$)
- 4) Que vaut β ? Déterminer un encadrement de α d'amplitude 10^{-3} .
- 5) Donner le signe de $g(x)$ en fonction de x .

Partie B : Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x^2(\ln(x) - 1) + x$

- 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$
- 2) Montrer que : $f(\alpha) = \frac{\alpha}{2}(1 - \alpha)$. En déduire une valeur approchée de $f(\alpha)$ à 10^{-2} près.
- 3) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$: $f'(x) = x \cdot g(x)$
- 4) Dresser le tableau de variation de f

Activité 2 :

Soient f la fonction définie sur $I =]4; +\infty[$ par : $f(x) = -x + 3 + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x-4}{x-2}\right)$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Étudier les limites de f aux bornes de I .

Montrer que : $f'(x) = \frac{x^2 - 6x + 7}{(x-4)(x-2)}$

Dresser le tableau de variation de f .

Soit (D) la droite d'équation $y = -x + 3$. Etudier les positions relatives de la courbe (C) et de la droite (D) . Représenter sur un même graphique la courbe (C) et de la droite (D) .

Activité 3

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Pour tout entier naturel n non nul, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f_n(x) = x^n \ln x$ pour $x \neq 0$ et $f_n(0) = 0$. On note (C_n) la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Montrer que f_n est continue en 0. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$
- 2) Dresser le tableau de variation de f_n .
- 3) Sur un même graphique, tracer (C_1) , (C_2) et (C_3)
- 4) Démontrer que toutes les courbes (C_n) , passent par 2 points fixes O et A .
- 5) Démontrer que toutes les courbes admettent en A la même tangente.

Activité 4

On considère la fonction f définie sur $] -2; 1[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{x+2}{1-x}\right)$

- a) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition
- b) Etudier la dérivabilité de la fonction f .
- c) Déterminer le sens de variation de la fonction f .
- d) Tracer sa courbe représentative.

Activité 5

Partie I : On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 - 2 \ln x$

- 1) Etudier le sens de variation de g
- 2) En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$

Partie II : On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1+\ln x}{x}$. On appelle (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (unité graphique : 2 cm)

- 1) Déterminer la limite de f en 0. Interpréter graphiquement ce résultat.
- 2) Déterminer la limite de f en $+\infty$. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = \frac{x}{2}$ est asymptote à la courbe (C) . Déterminer la position de (C) par rapport à (Δ) sur $]0; +\infty[$. Montrer que (Δ) coupe (C) en un point A que l'on précisera
- 3) Etudier le sens de variation de f . Dresser le tableau de variation de f
- 4) Montrer qu'il existe un unique point B de la courbe (C) où la tangente (T) est parallèle à (Δ) . Préciser les coordonnées du point B
- 5) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ a une unique solution α . Exprimer $\ln(\alpha)$ en fonction de α . Montrer que le coefficient directeur de la tangente à (C) au point d'abscisse α est supérieur à 1. On admettra que

$$0,31 < \alpha < 0,35$$

6) Représenter succinctement la courbe (C) et les droites (T) et (Δ)

Activité 6

Partie I : La fonction f est définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + \frac{1}{2} \ln x$

1) Etudier le sens de variations de f . Calculer les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition et dresser le tableau de variations de f .

2) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution l dans l'intervalle $]0; +\infty[$. Déterminer l'entier n tel que $l \in]n; n + 1[$

3) Déterminer le signe de $f(x)$

Partie II : La fonction g est définie sur $[0; +\infty[$ par : $g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ -\frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{4}x^2 \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$

1) Montrer que la fonction g est continue en 0. Déterminer la limite de g en $+\infty$

2) Montrer que pour tout $x > 0$, $g'(x) = xf\left(\frac{1}{x}\right)$

3) Montrer que $g(l) = \frac{1+4l}{8l^2}$. Dresser le tableau de variation de g .

4) Donner les équations des tangentes à la courbe Γ représentative de g aux points d'abscisses 1 et $\frac{1}{l}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ et interpréter graphiquement cette limite.

5) Représenter succinctement Γ et ses tangentes dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Activité 7

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = x^2(\ln x - \frac{3}{2})$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$

1) Déterminer la limite de $\frac{f(x)}{x}$ lorsque x tend vers 0. f est-elle dérivable en 0 ?

2) Etudier le sens de variations de f et étudier la limite de f en $+\infty$

3) Démontrer l'existence et l'unicité de la solution de l'équation $f(x) = 0$ dans $[e; +\infty[$

4) Soit T la tangente à la courbe représentative (C) de f au point d'abscisse 1. Déterminer l'équation de T .

5) Tracer la courbe représentative (C) de f et la droite T dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

6) Soit $\lambda \in]0; e]$. On pose $I(\lambda) = \int_{\lambda}^e f(x) dx$

a) Calculer $I(\lambda)$ pour $\lambda \in]0; e]$

b) Calculer la limite de $I(\lambda)$ lorsque λ tend vers 0

c) En déduire l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $(x = 0)$ et $(x = e)$

Activité 8

Soit la fonction f définie par $f(x) = x \ln(|x|)$

- 1) Donner le domaine de définition D de la fonction f ; déterminer une parité éventuelle ; et étudier les limites aux bornes du domaine de définition. Calculer pour tout x de D la dérivée de f (si elle existe !)
- 2) On étudie, pour cette question, le cas $x > 0$. Montrer qu'il existe un unique λ tel que $f'(\lambda) = 0$; montrer que l'on a ; $0,3 \leq \lambda \leq 0,4$ (on pourra utiliser le fait que le réel e tel que $\ln e = 1$ vérifie $2,5 \leq e \leq 3$)
- 3) En déduire le tableau de variations de f (sur D)
- 4) Déterminer une primitive de g définie par $g(x) = \ln(x)$ (on précisera le domaine sur lequel on travaille)

I- COMPOSITION D'ISOMETRIES

Une isométrie est une application qui conserve les distances, les produits scalaires. Exemple : Symétrie Orthogonale, Rotation, Translation, Symétrie Centrale.

1-Composition de symétrie et de translation

a) Composition de symétries orthogonales ou réflexion

$$M_1 = S_{(D)}(M) \text{ et } M' = S_{(D')}(M_1)$$

$$M' = S_{(D')} [S_{(D)}(M)]$$

$$= S_{D'} \circ S_D (M)$$

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M'}$$

$$= 2\overrightarrow{HM_1} + 2\overrightarrow{M_1H'}$$

$$= 2(\overrightarrow{HM_1} + \overrightarrow{M_1H'})$$

$$= 2\overrightarrow{HH'}$$

$$= 2\overrightarrow{OO'}$$

Donc $M' = t_{2\overrightarrow{OO'}}(M)$

D'où $S_{D'} \circ S_D(M) = t_{2\overrightarrow{OO'}}(M)$

Propriété 1 :

Soient (D) et (D') deux droites parallèles. O un point de (D) et O' son projeté orthogonal sur (D'). La composée $S_{(D)} \circ S_{(D')}$ des symétries $S_{(D)}$ et $S_{(D')}$ est la translation de vecteur $2\overrightarrow{OO'}$

$$S_{(D)} \circ S_{(D')} = t_{2\overrightarrow{OO'}}$$

Activité 2 :

$$M_1 = S_{(D)}(M) \text{ et } M' = S_{(D')}(M_1)$$

$$M' = S_{(D')}(M_1)$$

$$= S_{(D')} [S_{(D)}(M)]$$

$$= S_{(D')} \circ S_{(D)}(M)$$

On a $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$

$$\begin{aligned} \widehat{(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'})} &= \widehat{(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM_1})} + \widehat{(\overrightarrow{OM_1}, \overrightarrow{OM'})} \\ &= 2\widehat{(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM_1})} + 2\widehat{(\overrightarrow{OM_1}, \overrightarrow{OH'})} \\ &= 2[\widehat{(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{HM_1})} + \widehat{(\overrightarrow{M_1H}, \overrightarrow{OH'})}] \\ &= 2\widehat{(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OH'})} \\ &= 2\widehat{(\vec{u}, \vec{u'})} \end{aligned}$$

D'où $M' = r(O, 2\widehat{(\vec{u}, \vec{u'})})$

Ainsi $S_{D'} \circ S_D = r(O, 2\widehat{(\vec{u}, \vec{u'})})$.

Propriété 2 :

Soit (D) et (D') deux droites sécantes en un point O de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{u'}$. La composée $S_D \circ S_{D'}$ des symétries orthogonales S_D et $S_{D'}$ est la rotation de centre O et d'angle $2\widehat{(\vec{u}, \vec{u'})}$.

$$S_D \circ S_{D'} = r(O, 2\widehat{(\vec{u}, \vec{u'})})$$

Exemple :

ABC est un triangle équilatéral de centre de gravité O

$$S_{(AB)} \circ S_{(A'B')} = t_{\vec{CC'}} = \overrightarrow{CC'}$$

$$S_{(A'C')} \circ S_{(AC)} = t_{\vec{BB'}} = \overrightarrow{BB'}$$

$$S_{(AC)} \circ S_{(AB)} = r(A; 2(\widehat{AB, AC})) = r(A; \frac{2}{3}\pi)$$

$$S_{(AB)} \circ S_{(A'C')} = r(C'; 2(\widehat{C'A, C'B})) = r(C'; -\frac{2}{3}\pi)$$

$$S_{(BB')} \circ S_{(AC)} = r(B'; 2(\widehat{B'C, BB'})) = r(B'; 2 \times (\frac{\pi}{2}))$$

$$= r(B'; \pi) = S_{B'}$$

$$S_{(A'C')} \circ S_{(OA)} = r(A'; 2(\widehat{A'A, A'C})) = r(A'; 2 \times (\frac{1}{6}\pi))$$

$$= r(A'; \frac{1}{3}\pi)$$

b) Décomposition de translation en de rotation

Activité

Soient (D) et (D') deux droites parallèles telles que $S_{D'} \circ S_D = t_{\vec{u}}$. Soient $O \in (D)$ et O' son projeté orthogonal sur (D'). On a : $S_{D'} \circ S_D = t_{2\vec{OO'}}$

$$D' \text{ où } 2\vec{OO'} = \vec{u} \Rightarrow \vec{OO'} = \frac{1}{2}\vec{u}$$

Ainsi (D') est l'image de (D) par la translation de vecteur $\frac{1}{2}\vec{u}$ et $\vec{u}$ est un vecteur normal à (D) .

Propriété 1 :

Soit $t_{\vec{u}}$ une translation de vecteur $\vec{u}$ non nul. Pour toute droite (D) de vecteur normal $\vec{u}$, il existe une droite (D') et une seule telle que $S_{(D)} \circ S_{(D')} = t_{\vec{u}}$. On a : $(D') = t_{\frac{1}{2}\vec{u}}(D)$ ou $D = t_{-\frac{1}{2}\vec{u}}(D')$.

Exemple : ABCD est un carré

$$t_{(AB)} = S_{(IJ)} \circ S_{(AD)}$$

$$= S_{(BC)} \circ S_{(IJ)}$$

$$t_{(AD)} = S_{(EF)} \circ S_{(AB)}$$

$$= S_{(DC)} \circ S_{(EF)}$$

Propriété

Soit $t_{\vec{v}}$ une translation de vecteur $\vec{v}$ non nul. Pour toute droite (D) et de vecteur directeur $\vec{v}$, il existe une droite (D') et une seule telle que $S_{(D')} \circ S_{(D)} = t_{\vec{v}}$.

On a : $(D') = t_{(\frac{1}{2}\vec{v})}(D)$ et $(D) = t_{(-\frac{1}{2}\vec{v})}(D')$.

Exercice :

Soit ABC un triangle équilatéral et A' ; B' et C' les milieux respectifs de $[BC]$; $[AC]$ et $[AB]$. Déterminer la droite (D) telle que : $S_{(AA')} \circ S_{(D)} = t_{\vec{BC}}$

$$(D) = t_{(-\frac{1}{2}\vec{BC})}(AA')$$

$$= t_{(\frac{1}{2}\vec{CB})}(AA')$$

Activité 2 :

Soient (D) et (D') deux droites sécantes en un point O. On a :

$$S_{D' \circ S_D} = r(O; 2(\widehat{u, u'}))$$

$$S_{D' \circ S_D} = r(O; \alpha). \quad \text{D'où } 2(\widehat{u, u'}) = \alpha + 2k\pi$$

$$(\widehat{u, u'}) = \frac{\alpha}{2} + k\pi$$

Donc (D') est l'image de (D) par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\alpha}{2}$

Propriété

Soit $r(O; \alpha)$ une rotation de centre O et d'angle α . Pour toute droite (D) passant par O, il existe une droite (D') et une seule telle que $S_{D' \circ S_D} = r(O; \alpha)$

$$(D') = r(O; \frac{\alpha}{2})(D) \text{ et } (D) = r(O; -\frac{\alpha}{2})(D').$$

Exemple : Soit ABCD un carré

$$\begin{aligned} r(B, \frac{\pi}{2}) &= S_{(BD)} \circ S_{(BC)} \\ &= S_{(AB)} \circ S_{(BD)}. \end{aligned}$$

A et B sont deux point distincts.

- 1- Déterminer et construire la droite (D) tels que $r(A, \frac{\pi}{2}) = S_{(D)} \circ S_{(AB)}$
- 2- Déterminer et construire le point (D') tels que $r'(B, \frac{\pi}{3}) = S_{(AB)} \circ S_{D'}$

c) Composition d'une symétrie orthogonale et d'une translation

$$M' = t_u(M_2) = t_u[S_D(M)] = t_u \circ S_D(M)$$

$$M' = S_D(M_1) = S_D[t_u(M)] = S_D \circ t_u(M)$$

$$D'o\grave{u} \quad t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$$

- Points invariants de $S_D \circ t_u (\vec{u} \neq 0)$

Soit M un point invariant de $S_D \circ t_u$. On a :

$$S_D \circ t_u(M) = M \Leftrightarrow S_D \circ S_D \circ t_u(M) = S_D(M)$$

$$\Leftrightarrow t_u(M) = S_D(M)$$

On pose $M' = t_u(M) = S_D(M)$ on a :

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u} \text{ et } \vec{u} \text{ est médiatrice à } [MM'] \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u} \text{ et } \vec{u} \perp \overrightarrow{MM'}$$

$$\Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{u} \quad (\text{impossible car } \vec{u} \neq \vec{0})$$

Donc $S_D \circ t_u$ n'admet pas de point invariant

Définition :

Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$. On appelle symétrie glissée d'axe (D), la composée de la symétrie orthogonale d'axe (D) et de la translation de vecteur $\vec{u}$. On a : $t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$

Propriété :

Une symétrie glissée n'admet pas de point invariant.

- Nature de la composée d'une symétrie glissée et d'une translation

Activité 1 :

$\vec{u}$ est normal à (D)

$M' = t_u \circ S_D(M)$; $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et I est le milieu de [OA]. On a :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MM'} &= \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M'} = 2\overrightarrow{MH} + \vec{u} \\ &= 2\overrightarrow{MH} + 2\overrightarrow{OI} = 2\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{HH'} \\ &= 2(\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{HH'}) \\ &= 2\overrightarrow{MH'} \end{aligned}$$

Donc $M' = S_D(M)$

Ainsi $t_u \circ S_D = S_D$

Activité 2 : $\vec{u}$ n'est pas normale à (D)

$O \in (D)$; $A \in (\mathcal{P})$ tels que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$. H est le projeté orthogonal de A sur (D) et I milieu de [AH]

$$\begin{aligned} S_{D'} \circ S_D &= t_{2HI} \circ t_{HA} ; & t_u \circ S_D &= t_{OH+HA} \circ S_D \\ & & &= t_{OH} \circ t_{HA} \circ S_D \\ & & &= t_{OH} \circ S_{D'} \circ S_D \circ S_D \\ & & &= t_{OH} \circ S_{D'} \end{aligned}$$

Donc $t_u \circ S_D$ est la symétrie glissée d'axe (D') et de vecteur $\overrightarrow{OH}$

Propriété :

Soit (D) une droite et $\vec{u}$ un vecteur non nul

- Si $\vec{u}$ est normale à (D), alors $t_u \circ S_D$ est une symétrie orthogonale,
- Si $\vec{u}$ n'est pas normale à (D), alors $t_u \circ S_D$ est une symétrie glissée.

3- Composition de rotations et de translations

a) Composée de rotations

Propriété :

Soient r et r' deux rotations d'angles respectifs α et α' .

- Si $\alpha + \alpha' \neq 0$, alors $r \circ r'$ est une rotation d'angle $\alpha + \alpha'$
- Si $\alpha + \alpha' = 0$, alors $r \circ r'$ est une translation

Exemple:

- $r(O, \frac{\pi}{3}) \circ r(A, -\frac{\pi}{3})$ est une translation t . $t(A) = r(C, \frac{\pi}{3})(A) = B \Rightarrow t = t_{AB}$

- $r(B, \frac{2}{3}\pi) \circ r(C, \frac{2}{3}\pi) = S_{(BA)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(CA)} = S_{(AB)} \circ S_{(AC)}$

D'où $r(B, \frac{2}{3}\pi) \circ r(C, \frac{2}{3}\pi)$ est une rotation de centre A et d'angle $\alpha = \frac{4}{3}\pi$

- $r(A, \frac{2}{3}\pi) \circ r(B, \frac{\pi}{3})$ est une rotation d'angle π ou une symétrie centrale.

$S_{(AC)} \circ S_{(AB)} \circ S_{(AB)} \circ S_{(BB')}$

$S_{(AC)} \circ S_{(BB')}$ est une rotation de centre B' et d'angle π ou une symétrie de centre B'.

Remarque :

Pour déterminer la composée de $r(B, \frac{\pi}{2}) \circ r(A, \alpha)$ de deux rotations de centres distincts A et B, on peut utiliser les droites (D) et (D') telles que $r(B, \beta) = S_{D'} \circ S_{(AB)}$ et $r(A, \alpha) = S_{(AB)} \circ S_{D'}$.

On aura $r(B, \beta) \circ r(A, \alpha) = S_{D'} \circ S_{D'}$.

b) Composée d'une rotation et d'une translation

Propriété :

Soit r une rotation d'angle non nul α et t une translation, $t \circ r$ est une rotation d'angle α . $r \circ t$ est aussi une rotation d'angle α . En générale $t \circ r \neq r \circ t$.

NB : Pour déterminer la composée de $t_u \circ r(O, \alpha)$ d'une rotation et d'une translation de vecteur $\vec{u}$ non nul, on peut utiliser les droites (D) et (D') telles que :

- (D) est la droite passant par O et de vecteur normal $\vec{u}$
- , $t_u = S_{D'} \circ S_{(D)}$ et $r(O, \alpha) = S_{(D)} \circ S_{D'}$

On a : $t \circ r = S_{D'} \circ S_{(D)}$.

Respectivement $r(O, \alpha) \circ t_u = S_{D'} \circ S_{(D)}$ et $t_u = S_{(D)} \circ S_{D'}$

Exemple :

$r(A, \frac{\pi}{2}) \circ t_{CB}$ est un quart de tour direct

$$= S_{(AC)} \circ S_{(AB)} \circ S_{(AB)} \circ S_{(D)}$$

$$= S_{(AC)} \circ S_{(D)} \text{ or } (AC) \cap (D) = \{O\}$$

D'où $r(A, \frac{\pi}{2}) \circ t_{(CB)} = r(O, \frac{\pi}{2})$

II- Classification des isométries du plan

1- Classification à l'aide des points invariants

a) Décomposition d'une isométrie

Théorème : Soit f une isométrie du plan et A un point. Il existe une unique isométrie g et une unique translation t telles que $g(A) = A$ et $f = t \circ g$.

NB : une isométrie est une transformation du plan qui conserve les distances.

b) Isométrie laissant invariant trois points non alignés

Propriété :

Une isométrie du plan qui laisse invariant trois points non alignés est l'application identité.

Preuve :

Soit f une isométrie laissant invariant trois points A , B et C non alignés. Soient M et M' tels que $M' = f(M)$. On a : $MA = M'A$, $MB = M'B$ et $MC = M'C$. A, B et C appartient à la médiatrice $[MM']$
 $\Rightarrow A, B$ et C sont alignés (impossible). D'où $M = M' \Leftrightarrow f(M) = M$.

c) Isométrie laissant invariant deux points distincts

Propriété :

Une isométrie qui laissant invariant deux points A et B distincts et qui n'est pas l'application identité est la symétrie orthogonale d'axe (AB) .

Preuve :

Soit f une isométrie laissant invariant deux points distincts A et B . Soit C et C' tels que $C' = f(C)$, $C \notin (AB)$. On a : $AC = AC'$ et $BC = BC'$ d'où (AB) est la médiatrice de $[CC']$. Considérons l'isométrie $S_{(AB)} \circ f : S_{(AB)} \circ f(A) = A$

$$S_{(AB)} \circ f(B) = B ; S_{(AB)} \circ f(C) = S_{(AB)} \circ f(C') = C$$

D'où $S_{(AB)} \circ f = \text{idE} \Leftrightarrow f = S_{(AB)}$

d) Isométrie laissant invariant un point du plan

Propriété :

Une isométrie du plan qui laissant invariant un seul point A du plan est une rotation de centre A .

e) Conséquences

Théorème :

Toute isométrie du plan est une translation, une rotation ou symétrie orthogonale, une symétrie glissée.

2- Déplacement et antidéplacement

a) Définition

- Un déplacement est une isométrie qui conserve les angles orientés
- Un antidéplacement est une isométrie qui transforme tout angle orienté en son opposé. On a le tableau suivant :

Isométries	Avec points invariants	Sans points invariants
Déplacement	Rotation	Translation
Antidéplacement	Symétrie orthogonale	Symétrie glissée

Remarque : Toute isométrie est soit un déplacement soit un antidéplacement

b) Composition de déplacement et antidéplacement

La composée de deux déplacements ou de deux antidéplacements est un déplacement.

La composée d'un antidéplacement et d'un déplacement est un antidéplacement.

NB : La composée de deux isométries est une isométrie.

Propriété 2 :

La transformation réciproque d'un déplacement est déplacement.

La transformation réciproque d'un antidéplacement est un antidéplacement.

c) Détermination d'une isométrie

Propriété :

Soient A, B, A' et B' quatre points du plan tels que $AB \neq A'B'$ et $A \neq B$, il existe un déplacement et un seul transformant A en A' et B en B'

Remarque :

- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$ alors f est la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$
- Si $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{A'B'}$ alors f est une rotation d'angle $(\widehat{AB; A'B'})$

Propriété 2 :

Soient A, B, A' et B' quatre points du plan tels que $AB = A'B'$ et $A \neq B$, il existe un antidéplacement et un seul transformant A en A' et B en B'

Exercice : 2a,2b,2c,2d et 2°

III- Applications affines

1- Définition

a) Définition 1

Une application affine du plan ($\mathcal{P}$) est une application de ($\mathcal{P}$) dans ($\mathcal{P}$) qui conserve le coefficient de colinéarité c'est-à-dire si A,B,C et D qui ont pour images respectives A',B',C' et D' par f :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CD} = \lambda \overrightarrow{AB} &\Rightarrow \overrightarrow{f(C)f(D)} = \lambda \overrightarrow{f(A)f(B)} \\ &\Rightarrow \overrightarrow{C'D'} = \lambda \overrightarrow{A'B'} \end{aligned}$$

b) Définition 2 :

Une transformation affine du plan et une application affine bijective du plan.

c) Définition 3 :

Soit f une application affine de $(\mathcal{P})$ et φ une application vectorielle de $\mathcal{V}$ dans $\mathcal{V}$ telle que pour tous points A et B du plan $(\mathcal{P})$ on a : $\varphi(\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{f(A)f(B)}$. φ est appelé application vectorielle associée à f .

d) Propriété :

Pour tout vecteur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de $\mathcal{V}$ et pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$. $\varphi(\alpha\vec{u}) = \alpha\varphi(\vec{u})$ et $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) = \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v})$.
On dit que φ est une application linéaire associée à f .

Preuve :

- Soient A, B, C et D quatre points du plan tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha\vec{u}) &= \varphi(\alpha\overrightarrow{AB}) = \varphi(\overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{f(C)f(D)} \\ &= \overrightarrow{\alpha f(A)f(B)} \text{ conservation du coefficient de colinéarité} \\ &= \alpha\overrightarrow{f(A)f(B)} = \alpha\varphi(\overrightarrow{AB}) = \alpha\varphi(\vec{u}) \end{aligned}$$

- Posons $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$; $f(A) = A'$; $f(B) = B'$ et $f(C) = C'$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{A'C'} &= \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{f(A)f(B)} + \overrightarrow{f(B)f(C)} \\ &= \varphi(\overrightarrow{AB}) + \varphi(\overrightarrow{BC}) \\ &= \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{A'C'} &= \overrightarrow{f(A)f(C)} = \varphi(\overrightarrow{AC}) = \varphi(\overrightarrow{AB + BC}) \\ &= \varphi(\vec{u} + \vec{v}). \end{aligned}$$

Remarque :

$$\varphi(\vec{0}) = \vec{0} \text{ car } \varphi(\overrightarrow{AA}) = \overrightarrow{f(A)f(A)} = \vec{0}$$

$$\varphi(\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(\vec{u}_i)$$

G=bar	A ₁	A ₂		A _n
	α ₁	α ₂		α _n

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0} &\Leftrightarrow \varphi(\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i}) = \varphi(\vec{0}) \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(\overrightarrow{GA_i}) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{f(G)f(A_i)} = \vec{0} \end{aligned}$$

f(G)= bar	f(A ₁)	f(A ₂)		f(A _n)
	α ₁	α ₂		α _n

Conséquence : Toute application affine conserve le barycentre.

- Exemples de transformations affines :

Les isométries du plan, les homothéties

- Exemples d'applications affines : les projections.

2- Autres propriétés

P₁ : Soit f une application du plan, f est une application affine si et seulement si f conserve le barycentre de deux points.

P₂ : La composée de deux applications du plan est une application affine du plan.

P₃ : La réciproque d'une transformation affine est une transformation affine.

P₄ : une application affine du plan est déterminée par la donnée de trois points non alignés et de leurs images.

P₅ : Si deux applications affines du plan coïncident trois non alignés alors elles sont égales.

P₆ : Une application affine du plan est bijective si et seulement si l'image d'un repère est un repère.

P₇ : Soient f une application affine et (AB) une droite

- Si $f(A) = f(B)$ alors l'image de (AB) est $\{f(A)\}$
- Si $f(A) \neq f(B)$ alors l'image de (AB) est la droite $(f(A)f(B)) = (A'B')$

P₈ : Soit f une application affine du plan ($\mathcal{P}$)

- Si f est bijective alors $f(\mathcal{P}) = (\mathcal{P})$
- Si f n'est pas bijective alors $f(\mathcal{P})$ est un singleton ou une droite

P₉ : Soit f une application affine du plan munie d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. f est une application affine si et seulement si elle admet une expression analytique de la forme :

$$\begin{cases} x' = ax + by + c \\ y' = a'x + b'y + c' \end{cases} \quad a, b, c, a', b', \text{ et } c' \in \mathbb{R}.$$

Preuve : Expression analytique d'une transformation affine

$$O' = f(O) ; O' \begin{pmatrix} c \\ c' \end{pmatrix} ; \varphi(\vec{i}) \begin{pmatrix} a \\ a' \end{pmatrix} ; \varphi(\vec{j}) \begin{pmatrix} b \\ b' \end{pmatrix} ; M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} ; M' \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ tels que } M' = f(M).$$

$$\text{On a : } \overrightarrow{O'M'} = \overrightarrow{f(O)f(M)} = \varphi(\overrightarrow{OM}) = \varphi(x\vec{i} + y\vec{j})$$

$$= x\varphi(\vec{i}) + y\varphi(\vec{j}) = x(a\vec{i} + a'\vec{j}) + y(b\vec{i} + b'\vec{j})$$

$$\Leftrightarrow (x' - c')\vec{i} + (y' - c')\vec{j} = ax\vec{i} + a'x\vec{j} + by\vec{i} + b'y\vec{j}$$

$$= (ax + by)\vec{i} + (a'x + b'y)\vec{j}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' - c' = ax + by \\ y' - c' = a'x + b'y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = ax + by + c \\ y' = a'x + b'y + c' \end{cases}$$

Exemple : $\begin{cases} x' = x - 2 \\ y' = y + 1 \end{cases}$ est l'expression analytique d'une translation de vecteur $-2\vec{i} + \vec{j}$

$\begin{cases} x' = -3x + 8 \\ y' = -3y - 4 \end{cases}$ est l'expression analytique d'une homothétie de rapport $k=-3$ et de centre $\Omega(2;1)$

$\begin{cases} x' = 2x + 3y - 5 \\ y' = 3x - 7y + 11 \end{cases}$ est l'expression analytique d'une application affine.

P₁₀ : L'image par une transformation affine du plan de deux droites strictement parallèles sont deux droites strictement parallèles.

P₁₁ : Les images par une transformation affine du plan de deux droites sécantes sont deux droites sécantes.

3- Affinité du plan

a) Affinité d'axe (D), de direction δ et de rapport k

Définition :

Soient (D) une droite et δ une direction de droite distincte de celle de la droite (D) et $k \in \mathbb{R}$. On appelle affinité d'axe (D) de direction δ et de rapport k l'application f qui : à tout point M du plan associe le point M' tels que $\overrightarrow{HM'} = k\overrightarrow{HM}$ où H est le projeté de M sur (D) suivant la direction j .

Lors que la direction de j est orthogonale à (D) f est l'affinité orthogonale d'axe (D) et de rapport k .

Remarque :

- Si $k = 0$ alors f est la projection sur (D) suivant la direction j
- Si $k = 1$ alors f est l'application identité du plan
- Si $k = -1$ et que la direction de (D) est orthogonale à f alors f est la symétrie orthogonale d'axe (D).

L'ensemble des points invariants d'une affinité est sur l'axe.

b) Expression analytique d'une affinité

Propriété :

Le plan est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'expression analytique d'une affinité d'axe (D) d'équation $y=b$ et de direction celle de $\vec{j}$ et de rapport k est :
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = ky + (1 - k)b \end{cases}$$

Preuve : Soient $M\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$; $M'\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et $H\begin{pmatrix} x \\ b \end{pmatrix}$

On a : $\overrightarrow{hM'} = k\overrightarrow{HM} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x'-x \\ y'-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k(x-x) \\ k'y-b \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' - x = 0 \\ y' - b = ky - kb \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x \\ y' = ky = (1 - k)b \end{cases}$$

Remarque :

- Toute affinité est une application affine
- Soit f une affinité d'axe (D) et de vecteur directeur $\vec{u}$ de direction celle du vecteur $\vec{v}$ et de rapport k. L'application linéaire associée à f est φ telle que $\varphi(\vec{u}) = \vec{u}$; $\varphi(\vec{v}) = k\vec{v}$ f est bijective si et seulement si $k \neq 0$.

Travail à faire : exercice 3a, 3b, 3c et 3d P98.

Exercice 3a :

Soit ABC un triangle ; A', B' et C' les milieux respectifs de [BC], [AC] et [AB]. F l'application affine définie par : f(A)= A, f(B)= B' et f(C)= C'

- 1- Déterminer les images par f des points A', B' et C'
- 2- Déterminer les images par f des droites (AA'), (BB') et (CC')
- 3- Déterminer les expressions analytiques de f dans le repère (ABC)

Solution :

- 1- Images des points A', B' et C'

A' milieu de [BC] donc f(A') est le milieu de [f(B)f(C)] $\Leftrightarrow$ f(A') est le milieu de [B'C']

B' milieu de [AC] donc f(B') est le milieu de [f(A)f(C)] $\Leftrightarrow$ f(B') est le milieu de [A'C']

C' milieu de [AB] donc f(C') est le milieu de [f(A)f(B)] $\Leftrightarrow$ f(C') est le milieu de [A'B']

Autres méthodes :

$$\overrightarrow{A'B} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \overrightarrow{f(A')f(B)} = \frac{1}{2}\overrightarrow{f(C)f(B)}$$

$$\Leftrightarrow f(A')B' = \frac{1}{2}\overrightarrow{C'B'} = I$$

$$\overrightarrow{AC'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{f(A)f(C')} = \frac{1}{2}\overrightarrow{f(A)f(B)}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{Af(C')} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB'} = K$$

$$\overrightarrow{AB'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{f(A)f(B')} = \frac{1}{2}\overrightarrow{f(A)f(C)}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{Af(B')} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'C'} = J$$

2- Images des droites (AA'), (BB') et (CC')

$$f(A) = A \text{ et } f(A') = I \Leftrightarrow f([AA']) = (AI)$$

$$f(B) = B' \text{ et } f(B') = J \Leftrightarrow f([BB']) = (B'J)$$

$$f(C) = C' \text{ et } f(C') = K \Leftrightarrow f([CC']) = (C'K)$$

3- Expressions analytiques

Soient $M\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $M'\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans le repère (ABC) égale à $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, $M' = f(M)$ et φ l'application associée à f .

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM'} &= \overrightarrow{f(A)f(M)} = \varphi(\overrightarrow{AM}) = \varphi(x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}) \\ &= x\varphi(\overrightarrow{AB}) + y\varphi(\overrightarrow{AC}) \\ &= x\overrightarrow{f(A)f(B)} + y\overrightarrow{f(A)f(C)} \\ &= x\overrightarrow{AB'} + y\overrightarrow{AC'} \\ &= x\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + y\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{y}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{x}{2}\overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

$$D' \text{ où } \begin{cases} x' = \frac{y}{2} \\ y' = \frac{x}{2} \end{cases} \text{ car } \overrightarrow{AM'} = x'\overrightarrow{AB} + y'\overrightarrow{AC}$$

Exercice 3b : P98

(D) et (Δ) sont deux droites sécantes en un point O. Soit f l'application du plan dans lui-même qui à tout point M on associe le point M' tels que :

- si $M \in (\Delta)$, alors $M' = M$
- si $M \notin (\Delta)$, alors le milieu $[MM']$ appartient à (Δ) et $[MM'] \parallel (D)$

1-) Construire les images par f de deux points distincts A et B dans les cas suivants :

- a) Les droites (AB) et (Δ) sont parallèles
- b) Les droites (AB) et (Δ) sont sécantes

2-) démontrer que f est une application affine du plan

Solution :

1-a) $(AB) \parallel (\Delta)$

1-b) (AB) et (Δ) sécantes

Donc f est l'affinité d'axe (Δ) de direction $(\mathcal{D})$ et de rapport $k = -1$

Exercice 3c :

Le plan est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère f une application affine telle que $f(O) = I$, $f(I) = J$ et $f(J) = O$

- 1- Démontrer que f est bijective
- 2- Déterminer l'ensemble des points invariants par f

Solution :

- 1- L'image du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est $(I, \vec{j}, \vec{O})$ c'est aussi un repère car I, J et O sont non alignés.

f est donc bijective.

- 2- Soit $M \in (\mathcal{P})$ tels que $f(M) = M$

$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $O \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $I \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $J \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. φ est l'application linéaire associée

$$\begin{aligned} \overrightarrow{IM} &= \overrightarrow{f(O)f(M)} = \varphi(\overrightarrow{OM}) \\ &= \varphi(x\overrightarrow{OI} + y\overrightarrow{OJ}) = x\varphi(\overrightarrow{OI}) + y\varphi(\overrightarrow{OJ}) \\ &= \overrightarrow{xf(O)f(I)} + \overrightarrow{yf(O)f(J)} \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{IM} = x\overrightarrow{IJ} + y\overrightarrow{IO} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x-1 \\ y-0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 0-1 \\ 1-0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0-1 \\ 0-0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x-1 = -x-y \\ y = x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = -x-x \\ y = x \end{cases}$$

$$\Rightarrow 3x = 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

D'où $M \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

f admet un unique point invariant $M \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$.

FONCTIONS EXPONENTIELLES FONCTIONS PUISSANCES

I. FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE E

1. Définition et conséquence

a) Définition

On appelle fonction exponentielle de base e et on note exp l'application réciproque de la

fonction ln. $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$
 $x \rightarrow y = \exp x$

b) Conséquence

De cette définition, il résulte que :

- $\forall x \in \mathbb{R} \text{ et } \forall y \in \mathbb{R}_+^*, y = \exp x \leftrightarrow x = \ln y$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \exp x \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } x = \ln(\exp x)$
- $1 = \ln e \leftrightarrow \exp 1 = e$
- $0 = \ln 1 \leftrightarrow \exp 0 = 1$
- $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \exp(\ln x) = x$

La fonction exponentielle étant l'application réciproque d'une fonction continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, est elle-même continue et strictement croissante sur

$\mathbb{R}$. Il en résulte que : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a > b \leftrightarrow \exp a > \exp b$

$$a > 0 \leftrightarrow \exp a > 1$$

$$a < 0 \leftrightarrow 0 < \exp a < 1$$

$$\exp a = \exp b \leftrightarrow a = b$$

2. Propriétés

a) Propriétés fondamentales

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exp(a + b) = \exp a \times \exp b \quad (1)$$

En effet, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a = \ln(\exp a) \text{ et } b = \ln(\exp b)$ donc $a + b = \ln(\exp a) + \ln(\exp b)$

$$\text{Soit } a + b = \ln(\exp a \times \exp b)$$

$$\text{D'où } \exp(a + b) = \exp a \times \exp b$$

En général, $\forall (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \exp(\sum_{k=1}^n a_k) = \prod_{k=1}^n \exp a_k$

La fonction exp est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exp(a + b) =$

$\exp a \times \exp b$ donc la fonction exp est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(\mathbb{R}_+^*, \times)$

b) Conséquences

$$C_1: \forall b \in \mathbb{R}, \exp(-b) = \frac{1}{\exp b} \quad (2)$$

En effet, pour $b = -a$, (1) devient $\exp 0 = \exp b \times \exp(-b)$ d'où $\exp(-b) = \frac{1}{\exp b}$

$$C_2: \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exp(a - b) = \frac{\exp a}{\exp b} \quad (3)$$

c) Autre propriété

$$\forall (a, r) \in \mathbb{R} \times \mathbb{Q}, \exp(ra) = (\exp a)^r \quad (4)$$

d) Nouvelle notation

Il résulte de (4) et de $\exp 1 = e$ que : $\forall r \in \mathbb{Q}, \exp r = \exp(r \times 1) = (\exp 1)^r = e^r$

Par convention, $\forall x \in \mathbb{R}, \exp x = e^x$. Ainsi,

- $\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, y = e^x \leftrightarrow x = \ln y$
- $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \in \mathbb{R}_+^*$ et $x = \ln e^x$
- $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, e^{\ln x} = x$
- $e^0 = 1$ et $e^1 = e$
- $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, e^{a+b} = e^a \times e^b, e^{-b} = \frac{1}{e^b}, e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
- $a > b \leftrightarrow e^a > e^b$
- $e^a = e^b \leftrightarrow a = b$
- $\forall (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, e^{\sum_{k=1}^n a_k} = \prod_{k=1}^n e^{a_k}$

Exercice 1

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$

a) $e^x - 7 + 10e^{-x} = 0$

b) $e^{3x} - e^{2x+1} + e^{2x} - e^{x+1} + 2e - e^x = 0$

(On vérifiera que e en est une solution)

c) $e^x - 4 + 3e^{-x} > 0$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^2 : \begin{cases} e^{2x} e^{2y} = a \\ xy = 1 \end{cases}$ (on discutera suivant les valeurs du réel a)

3. Calcul des dérivées

a. Dérivée de la fonction $x \rightarrow \ln x$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ sa fonction réciproque $x \rightarrow e^x$ est donc dérivable sur $\ln(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est $(e^x)' = \frac{1}{\ln'(e^x)} = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x$

D'où le théorème : la fonction $x \rightarrow e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}, (e^x)' = e^x$
Conséquence : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, (e^x)^{(n)} = e^x$ (dérivée d'ordre n)

b. Dérivée d'une fonction composée avec la fonction exponentielle

Théorème : soit u une fonction dérivable sur un ensemble D, la fonction $x \rightarrow e^{u(x)}$ est dérivable sur D et $\forall x \in D, (e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$

En effet, $\forall x \in D, e^{u(x)} = \exp[u(x)]$

$$\begin{aligned} \text{Donc } (e^{u(x)})' &= (\exp[u(x)])' \\ &= \exp'[u(x)]u'(x) \\ &= e^{u(x)}u'(x) \\ &= u'(x)e^{u(x)} \end{aligned}$$

Exercice 2 : Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = e^{\frac{x-2}{x^2-2}}$ b) $g(x) = e^{\cos x}$ c) $h(x) = \frac{e^{-x}}{x^2}$ d) $l(x) = e^{-x} \ln x$

4. Nouvelles primitives

Théorème

- Les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \rightarrow e^x$ sont les fonctions $x \rightarrow e^x + c$, $c \in \mathbb{R}$
- u étant une fonction dérivable sur un ensemble D , les primitives sur D de la fonction $x \rightarrow u'(x)e^{u(x)}$ sont les fonctions $x \rightarrow e^{u(x)} + c$, $c \in \mathbb{R}$

Exercice 3

1) Déterminer les primitives de chacune des fonctions ci-après :

- $x \rightarrow (x + 1)e^{x^2+2x-5}$ sur $\mathbb{R}$
 - $x \rightarrow \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$
 - $x \rightarrow \sin 2x e^{\cos^2 x}$ sur $\mathbb{R}$ (Intégration par parties)
 - $x \rightarrow e^x \sin x$ sur $\mathbb{R}$ (Deux intégrations par parties)
- 2) Soit $A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos^2 x \, dx$ et $B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin^2 x \, dx$

Calculer successivement $A + B$, $A - B$, A et B .

5. Etude de la fonction exp : $x \rightarrow e^x$

- ✓ La fonction exp est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.
- ✓ Limites : A l'aide du tableau de variation de la fonction $\ln$ (insérer ledit tableau de variation) on obtient les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
- ✓ Dérivée et sens de variation : $\forall x \in \mathbb{R}, (e^x)' = e^x > 0$ donc la fonction exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- ✓ Tableau de variation (insérer)
- ✓ Branches infinies :
 - Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, la droite d'équation $y = 0$ est horizontale à la courbe de la fonction exp au voisinage de $-\infty$.
 - Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, étudions $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$

Au voisinage de $+\infty$, $x > 0$ et dans ce cas, $\ln\left(\frac{e^x}{x}\right) = \ln e^x - \ln x = x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{e^x}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) = +\infty$

On en déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. Donc la courbe de la fonction exp admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

- ✓ Représentation graphique (insérer la courbe)

RQ : dans un repère orthonormé, les courbes des fonctions $\ln$ et $\exp$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Autres limites dites classiques

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ en effet, posons $X = -x$ ainsi, quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$

$$\text{Ceci étant, } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} -X e^{-X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} -\frac{X}{e^X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} -\frac{1}{\frac{e^X}{X}} = 0$$

$$\text{car } \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty$$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$
- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = \gamma$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} e^{u(x)} = e^\gamma$
- Si $\begin{cases} u(x) > 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \ln u(x) = \gamma \end{cases}$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = e^\gamma$

Exercice 4

- 1) Soit $f(x) = e^{\frac{x+1}{x+2}}$
Déterminer son ensemble de définition D_f et calculer les limites aux bornes de D_f .
- 2) Calculer les limites suivantes : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2+1}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1}{\sin^2 x}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{\ln(1+x)}$
d) $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1)e^{\frac{x+3}{x+1}}$ e) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}$ f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \ln x$ g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-2e^x+1}{1-\cos x}$

Indication solution

- a) NB : $\forall r \in \mathbb{Q}_+^*$, $\ln \frac{e^x}{x^r} = x(1 - r \frac{\ln x}{x})$ on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^r} = +\infty$ et donc,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} = +\infty$$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1}{x^2} \times \frac{1}{\frac{\sin^2 x}{x^2}} = 1$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x} \times \frac{1}{\frac{\ln(x+1)}{x}} = 1$
- d) $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1)e^{\frac{x+3}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{\frac{x+3}{x+1}}}{\frac{x+3}{x+1}} \times (x+3) = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$
- e) Pour $x < 0$, $\ln\left(\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}\right) = -2\ln|x| + \frac{1}{x}$ ceci étant,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \ln\left(\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -2\ln|x| + \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-2x \ln(-x) + 1}{x} = -\infty$$
. On en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \times \frac{\ln x}{x} = 0$
- g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-2e^x+1}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x-1)^2}{x^2} \times \frac{1}{\frac{1-\cos x}{x^2}} = 2$

II. FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE a , $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$

1. Définition

On appelle fonction exponentielle de base a et on note $\exp_a$ la fonction réciproque de la fonction logarithme de base a définie par :

$$\exp_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$$

$$x \rightarrow \exp_a(x) = a^x$$

Remarque

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}, \ln_a a^x = x$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, a^{\ln_a(x)} = x$

$$\begin{aligned}
2) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, y = \exp_a(x) &\leftrightarrow x = \ln_a(y) \\
&\leftrightarrow x = \frac{\ln y}{\ln a} \\
&\leftrightarrow x \ln a = \ln y \\
&\leftrightarrow y = e^{x \ln a}
\end{aligned}$$

$$3) \quad \forall a \in \mathbb{R}_+^*, a^x = e^{x \ln a}$$

2. Propriétés

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}_+^{*2}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

- $a^{x+y} = a^x \times a^y$
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$
- $(a^x)^y = a^{xy}$
- $(ab)^x = a^x \times b^x$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

Exercice 5: résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations

- a) $2^{x+8} - 4^x = 1984$
- b) $3^{x+2} + 9^{x-1} - 1458 = 0$

3. Etude de la fonction $\exp_a: x \rightarrow e^{x \ln a}, a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$

- ✓ Domaine de définition $D_{\exp_a} = \mathbb{R}$
- ✓ La fonction $\exp_a$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ car réciproque de la fonction $x \rightarrow \ln_a(x)$
- ✓ Limites
 - Si $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x \ln a} = 0$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln a} = +\infty$
 - Si $a < 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x \ln a} = +\infty$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln a} = 0$
- ✓ Dérivée et sens de variation
- ✓ $\forall x \in \mathbb{R}, \exp'_a(x) = (e^{x \ln a})' = (x \ln a)' e^{x \ln a} = (\ln a) e^{x \ln a}$
 - Si $a > 1, \forall x \in \mathbb{R}, \exp'_a(x) > 0$ et la fonction $\exp_a$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
 - Si $0 < a < 1, \forall x \in \mathbb{R}, \exp'_a(x) < 0$ et la fonction $\exp_a$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$
- ✓ Tableau de variation : (insérer tableau en distinguant les cas $a > 1$ et $0 < a < 1$)
- ✓ Branches infinies
 - Si $a > 1$ (resp $0 < a < 1$), $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ (resp $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$) donc la droite d'équation $y = 0$ est horizontale à la courbe de la fonction $\exp_a$ au voisinage de $-\infty$ (resp au voisinage de $+\infty$).

- Si $a > 1$ (resp $0 < a < 1$), $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ (resp $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$). Etudions

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x} \text{ (resp } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a^x}{x} \text{)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x \ln a}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x \ln a}}{x \ln a} \times \ln a = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a^x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{x \ln a}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{x \ln a}}{x \ln a} \times \ln a = -\infty$$

Donc la courbe de la fonction $\exp_a$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

- ✓ Représentation graphique (insérer la courbe)

4. Notation u^v

Soient u et v deux fonctions de domaines de définition respectifs D_u et D_v .

- Si $\forall x \in D_u, u(x) > 0$, on peut définir la fonction u^v sur $D_u \cap D_v$ par :
 $\forall x \in D_u \cap D_v, u^v(x) = u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$
- Si de plus les fonctions u et v sont dérivables sur $D_u \cap D_v$, alors u^v l'est aussi et on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in D_u \cap D_v, (u^v)'(x) &= (e^{v(x) \ln u(x)})' \\ &= (v(x) \ln u(x))' e^{v(x) \ln u(x)} \\ &= \left[v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right] e^{v(x) \ln u(x)} \end{aligned}$$

Exercice 6 : étudier et représenter graphiquement la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x^x$

III. FONCTION PUISSANCE : CROISSANCE COMPAREE DES FONCTIONS PUISSANCE, EXPONENTIELLE ET LOGARITHME

1. Fonction puissance

a. Définition

Soit $a \in \mathbb{R}^*$. On appelle fonction puissance la fonction f_a définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f_a: x \rightarrow x^a = e^{a \ln x}$

Exercice 7 : comparer $(\sqrt{2})^{\sqrt{3}}$ et $(2\sqrt{2})^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$

Solution

On a $(\sqrt{2})^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln \sqrt{2}} = e^{\frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2}$ et

$$(2\sqrt{2})^{\frac{1}{\sqrt{3}}} = e^{\frac{1}{\sqrt{3}} \ln 2\sqrt{2}} = e^{\frac{\sqrt{3}}{3} (\ln 2 + \ln \sqrt{2})} = e^{\frac{\sqrt{3}}{3} (\ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2)} = e^{\frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{3}{2} \ln 2} = e^{\frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2}$$

Donc $(\sqrt{2})^{\sqrt{3}} = (2\sqrt{2})^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$

b. Propriétés

$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^{*2}, \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$

- $x^{a+b} = x^a \times x^b$
- $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$

- $x^{a-b} = \frac{x^a}{x^b}$
- $(x^a)^b = x^{ab}$
- $(xy)^a = x^a \times y^a$

Exercice 8: simplifier $A = \left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^{1+\sqrt{3}} + \left(\frac{3\sqrt{2}}{3}\right)^{1+\sqrt{2}}$

c. Etude de la fonction $f_a: x \rightarrow x^a = e^{a \ln x}$

- ✓ Domaine de définition : $D_{f_a} = \mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$
- ✓ f_a est continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ car la fonction $x \rightarrow a \ln x$ l'est.
- ✓ Limites

– Si $a > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{a \ln x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{a \ln x} = +\infty$$

– Si $a < 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{a \ln x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{a \ln x} = 0$$

- ✓ Dérivée et sens de variation

$$\forall x, \in \mathbb{R}_+^*, f'_a(x) = (e^{a \ln x})' = \frac{a}{x} e^{a \ln x} = \frac{a}{x} x^a = ax^{a-1}$$

Il en résulte que $\forall x, \in \mathbb{R}_+^*, f'_a(x)$ est du même signe que a .

- ✓ Tableau de variation : (insérer tableau de variation) on distinguera les cas $a > 0$ puis $a < 0$
- ✓ Branches infinies

– Si $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = +\infty$ étudions $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{a-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{(a-1) \ln x} = \begin{cases} +\infty & \text{si } a > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$$

Donc pour $a > 1$, la courbe de la fonction f_a admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et pour $0 < a < 1$, la courbe de la fonction f_a admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

- $a < 0$, les droites d'équation $x = 0$ et $y = 0$ sont respectivement asymptote verticale et horizontale à la courbe de la fonction f_a .

- ✓ Représentation graphique : on distinguera les cas $a > 1$, $0 < a < 1$ et $a < 0$

Exercice 9: étudier et représenter graphiquement chacune des fonctions suivantes

a) $f(x) = x^{\frac{3}{5}}$ b) $g(x) = (2x - 1)^{\sqrt{2}}$ c) $h(x) = (x + 1)^{-\sqrt{3}}$

2. Croissance comparée

a. Fonction logarithme et puissance

Propriété: $\forall a \in \mathbb{R}^*, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a} = 0$

Conséquence: $\forall a \in \mathbb{R}^*, \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x = 0$ (preuve : poser $X = \frac{1}{x}$)

b. Fonction exponentielle et puissance

Propriété: $\forall a \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0$

En effet, $\ln \frac{x^a}{e^x} = a \ln x - x = x \left(a \frac{\ln x}{x} - 1 \right)$

Ceci dit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x^a}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(a \frac{\ln x}{x} - 1 \right) = -\infty$ et donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0$

Conséquence: $\forall a \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^a e^x = 0$

Propriétés: $\forall b > 1$, $a \in \mathbb{R}_+$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{b^x} = 0$ (ind : utiliser $\ln \frac{x^a}{b^x}$)

$\forall b > 1$, $a \in \mathbb{R}_+$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (|x|^a b^x) = 0$ (ind : utiliser $\ln |x|^a b^x$)

c. Fonction logarithme et exponentielle

Propriétés: $\forall b > 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{b^x} = 0$

En effet, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \times \frac{x}{b^x} = 0$

Exercice 10: calculer

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^3+1)}{x^2}$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x}}{x^2+1}$ c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{x^3}$ d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-3x}$

Chapitre 12 Suites numériques

Planning :

Objectifs

- I. Etude générale d'une suite numérique.
 1. Généralités
 - a. Formules d'une suite : explicite et récurrente.
 - b. Suites minorées, suites majorées ; suites bornées
 - c. Suites monotones.
 2. Rappels sur les suites arithmétiques et suites géométriques
 - a. Suites arithmétiques.
 - b. Suites géométriques.
- II. Limite et convergence d'une suite
 1. Limites des suites du type $u_n = f(n)$
 - a. Activités et propriétés
 - b. Propriétés de comparaison des suites
 2. Convergence d'une suite.
 3. Limites des suites du type $u_{n+1} = f(u_n)$.
 4. Quelques suites particulières : suites périodiques et suites adjacentes.
 - a. Suites périodiques.
 - b. Suites adjacentes.

Objectifs :

- Reconnaître une suite arithmétique, une suite géométrique
- Savoir étudier les variations d'une suite, calculer les limites et étudier la convergence
- Savoir utiliser les suites pour approcher les solutions de l'équation $f(x) = 0$.

I. Etude générale d'une suite numérique.

1. Généralités

a. Définitions d'une suite : forme explicite et forme récurrente

Définitions

Soit I un sous ensemble de $\mathbb{N}$

D 1. On appelle suite numérique, toute fonction de I vers $\mathbb{R}$.

D 2. $u(n)$ ou tout simplement u_n est l'image par u de l'entier naturel n .

D 3. La suite u est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou tout simplement (u_n) .

D 4. u_n est le terme général ou le terme de rang n .

Définitions (formes d'une suite). Soit I un sous ensemble de $\mathbb{N}$.

D 5. Une suite (u_n) est dite **explicite** lorsque le terme général u_n est une fonction de n : ie $u_n = f(n)$ où f est une fonction numérique de la variable réelle. **Exemple** de suite sous forme explicite : $u_n = \frac{2n+3}{n^2-1}$.

D 6. Une suite (u_n) est dite récurrente si un terme quelconque $u_p = a$ est donné ($p \in \mathbb{N}$ et a un réel) et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction numérique de la variable réelle.

Exemple de suite sous forme récurrente :
$$\begin{cases} u_0 &= 4 \\ u_{n+1} &= \frac{2u_n+3}{u_n^2-1} \end{cases}$$

Remarque

Dans certains cas, on peut facilement passer de la formule explicite à celle récurrente et vice versa.

Exercice

1) Calculer les quatre premiers termes des suites suivantes. n étant un entier naturel

a) Formules explicites : $u_n = \frac{2n+1}{3n}, v_n = \ln(2n-3), w_n = e^{3n}$.

b) Formules récurrentes $\begin{cases} u_0 &= 1 \\ u_{n+1} &= \frac{2u_n+1}{3u_n} \end{cases}, \begin{cases} v_0 &= 3 \\ v_{n+1} &= \ln(2v_n-3) \end{cases}, \begin{cases} w_0 &= 0 \\ w_{n+1} &= e^{3w_n} \end{cases}$.

2) Donner la formule récurrente de $u_n = 4n - 7$ et celle explicite de $\begin{cases} u_0 &= 3 \\ u_{n+1} &= 4u_n \end{cases}, n \in \mathbb{N}$

b. Suites minorées, suites majorées ; suites bornées.

Définition. Soit (u_n) une suite numérique définie sur $I \subseteq \mathbb{N}$

D 1. (u_n) est minorée s'il existe un réel m telque $\forall n \in I, u_n \geq m$. On dit que m est un minorant.

D 2. (u_n) est majorée s'il existe un réel M telque $\forall n \in I, u_n \leq M$. On dit que M est un majorant.

D 3. (u_n) est bornée si elle est à la fois minorée et majorée

c. Suites monotones.

Définition Soit (u_n) une suite numérique définie sur $I \subseteq \mathbb{N}$

D 1. (u_n) est croissante si et seulement si $\forall n \in I, u_n \leq u_{n+1}$

D 2. (u_n) est décroissante si et seulement si $\forall n \in I, u_n \geq u_{n+1}$

D 3. (u_n) est constante si et seulement si $\forall n \in I, u_n = u_{n+1}$.

Définition

Une suite est monotone lorsqu'elle garde le même sens de variation ie lorsqu'elle est soit uniquement croissante, soit uniquement décroissante.

Remarques

R1. Une suite est positive (respectivement négative), lorsque tous ses termes sont positifs (respectivement négatifs).

R2. (u_n) est strictement croissante si $\forall n \in I, u_n < u_{n+1}$.

R3. Une suite (u_n) est croissante à partir d'un certains rang s'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n > n_0, u_n \leq u_{n+1}$

R4. Une suite est stationnaire si elle est constante à partir d'un certain rang.

Exercice

1) Montrer que les suites $u_n = \frac{\cos n}{n}$ et $v_n = \ln(2n+1) - \ln(n+1)$ sont bornées

2) On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 &= -1 \\ u_{n+1} &= \sqrt{2u_n+3} \end{cases}$. Montrer par récurrence que :

a) (u_n) est croissante

b) (u_n) est bornée ($-1 \leq u_n \leq 3$)

3) Etudier les variations des suites : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$; $v_n = \frac{n^n}{n!}$; $w_n = \frac{e^n}{n!}$.

Solution

2. Rappels sur les suites arithmétiques et suites géométriques

a. Suites arithmétiques.

Définition

Une suite numérique (u_n) est dite arithmétique s'il existe $r \in \mathbb{R}$ appelé raison tel que $u_{n+1} = u_n + r$.

- Si $r > 0$ alors (u_n) est croissante, Si $r < 0$ alors (u_n) est décroissante, Si $r = 0$ alors (u_n) est constante.
- Formule explicite : $u_n = u_0 + nr$ d'une façon générale, on a $u_n = u_p + (n - p)r$.
- La somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \text{nombre de termes} \left(\frac{1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme}}{2} \right) = n \left(\frac{u_0 + u_{n-1}}{2} \right)$.
Le nombre de termes $N = \text{indice du dernier terme} - \text{indice du 1er terme} + 1$. D'une façon générale, pour tout entier naturel p on a : $S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_{n-1} = (n - p) \left(\frac{u_p + u_{n-1}}{2} \right)$.

Activité sur la moyenne arithmétique. Indications : $u_{n+1} = u_n + r$, $u_{n-1} = u_n - r$. En sommant membre à membre on obtient $u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$

Théorème et définition

(u_n) est arithmétique si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$. On dit alors que le terme u_n est la moyenne arithmétique de u_{n-1} et u_{n+1} .

Remarque Pour montrer qu'une suite (u_n) est arithmétique, on peut montrer que $u_{n+1} - u_n = r = \text{cste}$

Exercice

- 1) (u_n) est une suite arithmétique telle que $u_3 = 5$ et $u_0 + u_1 + u_2 = 9$. Calculer $\sum_{k=0}^{10} u_k$ et $\sum_{k=30}^{67} u_k$.
Même questions pour $v_3 = 9$ et $v_0 + v_1 + v_2 = 15$; $w_3 = 15$ et $w_9 - w_4 - w_1 = 5$.
- 2) (u_n) est une suite arithmétique telle que $u_{n+4} - u_n = 12$. Calculer la raison r .

Solution

b. Suites géométriques.

Définition

Une suite numérique (u_n) est dite géométrique s'il existe $q \in \mathbb{R}$ appelé raison tel que $u_{n+1} = qu_n$.

- Si $q > 1$ alors (u_n) est croissante ; si $0 < q < 1$ alors (u_n) est décroissante ; si $q = 1$ alors (u_n) est constante.
- Formule explicite d'une suite géométrique : $u_n = q^n u_0$. D'une façon générale, pour tout entier naturel p on a : $u_n = q^{n-p} u_p$.
- La somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \text{premier terme} \times \left(\frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q} \right) = u_0 \left(\frac{1 - q^n}{1 - q} \right)$; d'une façon générale on a $S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_{n-1} = u_p \left(\frac{1 - q^{n-p}}{1 - q} \right)$.

Activité $u_n = qu_{n-1}$ et $u_{n+1} = qu_n$ en exprimant q dans l'une des équations et en remplaçant dans l'autre, on obtient $u_n = \sqrt{u_{n-1}u_{n+1}}$.

Théorème et définition.

Une suite (u_n) est géométrique si et seulement si $u_n^2 = u_{n-1} \times u_{n+1}$. On dit que u_n est la moyenne géométrique de u_{n-1} et u_{n+1} .

Remarque

Pour montrer qu'une suite est géométrique, on montre que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q = \text{cste}$.

Exercice

(v_n) est une suite géométrique telle que $v_1 = 27$ et $v_2 \cdot v_3 \cdot v_4 = 27$. Déterminer v_0 et q puis calculer $\sum_{k=0}^9 v_k$ et $\sum_{k=7}^{17} v_k$.

Solution

II. Limite et convergence d'une suite

1. Limites des suites du type $u_n = f(n)$

a. Activités et propriétés

Activité Calculer les 3 premiers termes des suites suivantes $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ et $v_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n$ puis conjecturer les variations et les limites.

Solution

Propriétés

Soit (u_n) une suite définie par $u_n = f(n)$ où f est une fonction numérique. Si f a une limite en $+\infty$ alors (u_n) a une limite et on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n)$

Remarque : On peut noter $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exemple Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(e^n - 1)$

Propriété

Si une suite admet une limite, alors elle est unique.

Propriété et définition.

Soient $u_n = f(n)$ et $v_n = g(n)$ les termes généraux de deux suites numériques.

- La somme des suites (u_n) et (v_n) est la suite de terme général $u_n + v_n$ et $\lim (u_n + v_n) = \lim (f(n) + g(n))$
- Le produit des suites (u_n) et (v_n) est la suite de terme général $u_n \times v_n$ et $\lim (u_n \times v_n) = \lim (f(n) \times g(n))$
- Le rapport des suites (u_n) et (v_n) est la suite de terme général $\frac{u_n}{v_n}$ et $\lim \left(\frac{u_n}{v_n}\right) = \lim \left(\frac{f(n)}{g(n)}\right)$.

Propriétés

P 1. Suites géométriques ou exponentielles. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$

- Si $a \leq -1$ alors a^n n'a pas de limite
- Si $-1 < a < 1$ c'est-à-dire $|a| < 1$ alors $\lim a^n = 0$
- Si $a = 1$ alors $\lim a^n = 1$.
- Si $a > 1$ alors $\lim a^n = +\infty$

P 2. Suites puissances. Soient Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$

- Si $\alpha < 0$ alors $\lim n^\alpha = 0$.
- Si $\alpha = 0$ alors $\lim n^\alpha = 1$.
- Si $\alpha > 0$ alors $\lim n^\alpha = +\infty$.

❖ Croissance comparée

Propriétés

- Si $\alpha > 0$ alors $\lim \frac{\ln n}{n^\alpha} = 0$.
- Si $a > 1$ et $\alpha > 0$ alors $\lim \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$; Si $a > 1$ et $\alpha > 0$ alors $\lim \frac{a^n}{n^\alpha} = +\infty$
- Si $-1 < a < 1$ et $\alpha < 0$ alors $\lim \frac{n^\alpha}{a^n} = +\infty$.

Exercice

Calculer les limites des suites suivantes : $u_n = \frac{\ln n}{n^2}$; $v_n = n^3 - 3^{n+1}$; $w_n = \frac{3^n - 5^n}{7^n - 2^n}$.

Solution

b. Propriétés de comparaison des suites

Propriétés

P 1. S'il existe un entier naturel n_0 tel que $\forall n \in \mathbb{N}, n > n_0 \Rightarrow v_n < u_n$ et $\lim v_n = +\infty$ alors $\lim u_n = +\infty$.

- P 2. De même, si $v_n > u_n$ et si $\lim v_n = -\infty$ alors $\lim u_n = -\infty$.
- P 3. Théorème des gendarmes. Si $v_n < u_n < w_n$ et si $\lim v_n = \lim w_n = l$ alors, $\lim u_n = l$.
- P 4. Si $|u_n - l| = v_n$ et $\lim v_n = 0$, alors $\lim |u_n - l| = 0$ et $\lim u_n = l$.

Exemple

Déterminer $\lim \frac{n+(-1)^n \cos n}{n}$.

Remarques

- R1. Lorsqu'une suite admet deux limites en $+\infty$, on dit qu'elle n'admet pas de limite. Exemple $u_n = (-1)^n$.
- R2. Les suites $u_n = \cos n$ et $v_n = \sin n$ n'admettent pas de limites en $+\infty$.

2. Convergence d'une suite.

Définition

Une suite est convergente si elle admet une limite finie ; elle est divergente si elle n'est pas convergente.

Exemple

Les suites $u_n = (-1)^n$, $w_n = \cos n$ et $v_n = \sin n$, $t_n = n^2$ divergent. La suite $p_n = \frac{2n+1}{n}$ converge.

Propriétés :

- P 1. Toute suite croissante et majorée est convergente
- P 2. Toute suite décroissante et minorée est convergente.

Propriété

Soient f une fonction, $\mathcal{D}_f$ son ensemble de définition et (u_n) une suite dans $\mathcal{D}_f$. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = l$.

Exercice cf CIAM Tle C.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$

- Calculer la limite de $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k}$.
- Etudier la convergence de la suite $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

Indications

- Utiliser l'encadrement $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$ puis inverser et appliquer la somme.
- Utiliser la comparaison $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k^2-k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ pour tout $k > 1$ et $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2-k} = 2 - \frac{1}{n} < 2$. On aura donc v_n qui est croissante et majorée donc converge.

3. Limites des suites du type $u_{n+1} = f(u_n)$. (suites définies par récurrence)

Exercice 26 CIAM

On définit la suite (u_n) par $u_0 = -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. On pose $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = \sqrt{2x + 3}$.

- Résoudre l'équation $f(x) = x$ (probable lieu de convergence ou point fixe).
- Démontrer par récurrence que :
 - $\forall n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq u_n \leq 3$; c'est-à-dire u_n est bornée.
 - u_n est croissante.
- Déduire que u_n est convergente et déterminer sa limite.

Solution

Propriété

Soit (u_n) une suite dont le terme général vérifie $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction. Si u_n converge vers l et si f est continue en l alors $f(l) = l$.

4. Quelques suites particulières : suites périodiques et suites adjacentes.

a. Suites périodiques.

Définition

Une suite (u_n) est dite périodique s'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_{n+p} = u_n$. Le plus petit entier naturel p vérifiant cette égalité est appelé période de la suite (u_n) .

Exemple

- La suite $u_n = (-1)^n$ est périodique de période 2
- La suite $v_n = \cos \frac{2n}{5}$ est périodique de période 5π .

b. Suites adjacentes.

Définition

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes si :

- (u_n) est croissante et (v_n) décroissante,
- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ et
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Remarque (autre définition)

Deux suites sont adjacentes si l'une est croissante, l'autre décroissante et la limite de la différence tend vers zéro.

Propriété

Soient (u_n) et (v_n) deux suites adjacentes telles que $v_n \leq u_n$

- P 1. La suite (w_n) définie par $w_n = u_n - v_n$ est décroissante.
- P 2. Les suites (u_n) et (v_n) convergent et ont la même limite.

Exemple (Exercice)

Considérons les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par : $u_n = \frac{1}{n \cdot n!} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$.
Montrer que (u_n) et (v_n) sont des suites adjacentes.

CHAPITRE : CALCUL D'INTEGRALES

1. OBJECTIFS

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Appliquer les techniques du calcul des intégrales et présenter ses applications (calcul d'aire, encadrement) ;
- Exploiter sur les exemples simples, les propriétés de l'intégrale pour l'étude des fonctions.

2. NOTION D'INTEGRALE

a) Activité préparatoire

- 1) Trouver d'une part, la primitive G de la fonction carré f qui prend la valeur 1 pour $x = 2$ et d'autre part, la primitive H de la fonction carré qui prend la valeur 0 pour $x = 5$
- 2) Calculer $G(1) - G(2)$ et $H(1) - H(2)$ puis conclure

Solution

- 1) Déterminons la primitive G de la fonction carré f telle que $G(2) = 1$

$$G(x) = \frac{x^3}{3} + k \text{ or } G(2) = 1 \Rightarrow k = -\frac{5}{3} \text{ d'où } \mathbf{G(x) = \frac{x^3-5}{3}}$$

Déterminons la primitive H de la fonction carré f telle que $H(5) = 0$

$$H(x) = \frac{x^3}{3} + k \text{ or } H(5) = 0 \Rightarrow k = -\frac{125}{3} \text{ d'où } \mathbf{H(x) = \frac{x^3-125}{3}}$$

$$2) \mathbf{G(1) - G(2) = -\frac{4}{3} - 1 = -\frac{7}{3}}$$

$$\mathbf{H(1) - H(2) = -\frac{124}{3} + \frac{117}{3} = -\frac{7}{3}}$$

On conclut que la différence $G(1) - G(2)$ et $H(1) - H(2)$ est bien la même quel que soit la primitive **choisie**

b) Définition

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soient a et b deux éléments de I . On suppose que f admet des primitives sur I . Soit F l'une de ces primitives. On appelle « **intégrale de (la fonction) f de a à b** » le réel $(b) - F(a)$. On le note : $\int_a^b f(t)dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$

Remarque :

- le réel $\int_a^b f(t)dt$ **ne dépend pas** de la primitive choisie pour le calcul.
- a à b sont des bornes d'intégration ;
- La variable t est appelée variable d'intégration. C'est une variable *muette* car elle peut être remplacée par n'importe quelle autre lettre de l'alphabet puisqu'elle n'intervient pas dans le processus d'intégration.
- $\int_a^b f(t)dt$ se lit : « *intégrale de a à b , $f(t)$ dérivée de t* » ou bien « *somme de a à b , $f(t)$ dérivée de t* »

EXERCICE D'APPLICATION

Calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx \text{ et } B = \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx$$

Solution

Calculons les intégrales suivantes

$$\begin{aligned} \bullet \quad A &= \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx \text{ or } \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} \text{ alors } \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x \right]_0^{\pi/2} \\ &= \left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2 \times \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{4} \sin 2 \times 0 \right) \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } A = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad B &= \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx \\ &= \left[\sqrt{2x+1} \right]_0^4 \\ B &= 2 \end{aligned}$$

b) **Interprétation géométrique**

Dans le cas où :

• $a < b$; La fonction f prend des valeurs positives sur l'intervalle $[a ; b]$. L'intégrale de f de a à b est égale à l'aire, en unité d'aire, du domaine limité par l'axe des abscisses, la courbe représentative C_f de la fonction f et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ (voir zone grisée sur la figure ci-dessous).

EXERCICE D'APPLICATION

1) On considère la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 3$ et représenté ci-contre. On cherche à déterminer l'aire du domaine grisé sur le dessin ci-contre.

a. Calculer cette aire en cm^2

b. Trouver une primitive K de la fonction k et calculer $K(5) - K(1)$

2) Mêmes questions pour la fonction g définie par $g(x) = x - 1$ et représenté ci-contre

3) Recommencer les mêmes questions pour la fonction h définie par $h(x) = \frac{1}{2}x + 1$ et représenté ci-contre

4) Que remarque-t-on dans les trois cas ?

c) Propriétés des intégrales

Activité préparatoire

1) Soient les intégrales suivantes : $I = \int_1^2 -t^2 dt$ et $J = \int_1^2 3 dt$

a) Calculer I et J

b) Calculer $K = \int_1^2 (3 - t^2) dt$

c) Calculer $I + J$ puis comparer le résultat à la valeur de K

2) On considère les intégrales suivantes

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos t dt; \quad B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin t dt \quad \text{et} \quad C = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos t dt + 2 \sin t) dt$$

a) Calculer A ; B ; $A + B$; C puis comparer les valeurs $A + B$ et C

3) Soient $U = \int_{-2}^1 x^2 dx$ et $V = \int_1^{-2} x^2 dx$

a) Calculer U et V

b) Quelle conjecture faites-vous ?

Propriétés : Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I soit a , b et c trois éléments de I . On suppose que f et g admettent des primitives sur I . Soit k un réel quelconque.

P₁ Linéarité

- $\int_a^b (f \pm g)(x) dx = \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
- $\int_a^b (kf)(x) dx = \int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$

Remarque :

On aurait pu traduire la linéarité de l'intégrale en considérant deux réels k et k' quelconques et en écrivant :

$$\int_a^b (kf \pm k'g)(x) dx = \int_a^b (kf(x) \pm k'g(x)) dx = k \int_a^b f(x) dx \pm k' \int_a^b g(x) dx$$

P₂ Relation de CHASLES

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

EXERCICE D'APPLICATION

Calculer $B = \int_{-1}^1 |t(t-1)| dt$

t	$-\infty$	0	1	$+\infty$
t	$-t$		t	t
$t-1$	$-t+1$	$-t+1$	$t-1$	
$t(t-1)$	t^2-t	$-t^2+t$	t^2-t	

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |t(t-1)| dt &= \int_{-1}^0 (t^2 - t) dt + \int_0^1 (-t^2 + t) dt \\ &= \left[\frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{2} t^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3} t^3 + \frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 \\ &= -\left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right] + \left[-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right] \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc $B = 1$

P₃ Positivité

- Si $f(x) \geq 0$ sur $[a; b]$ alors: $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
- Si $f(x) \leq 0$ sur $[a; b]$ alors: $\int_a^b f(x) dx \leq 0$

P₄ Conservation de l'ordre d'intégration

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a; b]$ si $f(x) \leq g(x)$ sur $[a; b]$ alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

Démonstration : Si, pour tout x de $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors $f(x) - g(x) \leq 0$, d'où $\int_a^b (f - g)(x) dx \leq 0$ donc $(\int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx) \leq 0$ soit $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

P₅ Permutation des bornes

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

P₆ Stabilité des bornes

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

Ne jamais écrire que : $\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \times \int_a^b g(x) dx$

3. INTEGRATION PAR PARTIES

a) Utilité

C'est une technique très utilisée dans le calcul des intégrales et qu'on applique lorsqu'on a à intégrer un produit de deux fonctions de natures différentes.

b) Théorème

On considère deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle I et a et b deux réels de I .

Alors :

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

ou bien

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Ces deux dernières relations sont connues sous le nom de *formules d'intégration par parties*.

Démonstration : On sait que $(uv)' = u'v + uv'$, ainsi $uv' = (uv)' - u'v$ et en intégrant ces deux fonctions sur $[a; b]$, on obtient $\int_a^b u(x)v'(x)dx = \int_a^b (u(x)v(x))' dx - \int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$

EXERCICE D'APPLICATION

A l'aide d'une intégration par partie calculer l'intégrale suivante : $\int_0^\pi x \sin x dx$

Posons : $u = x \Rightarrow u' = 1$

$$v' = \sin x \Rightarrow v = -\cos x$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi: } \int_0^\pi x \sin x dx &= [x(-\cos x)]_0^\pi - \int_0^\pi (-\cos x)dx \\ &= [x(-\cos x)]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x dx \\ &= [x(-\cos x)]_0^\pi + [\sin x]_0^\pi \\ &= (\pi \cos \pi - (0 \cos 0)) + (\sin \pi - \sin 0) \\ &= \pi \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \int_0^\pi x \sin x dx = \pi$$

N.B : Dans le produit des fonctions à intégrer, choisir la fonction à dériver avec précaution. Dans certains cas, ce choix s'impose (voir conseils pratiques ci-dessous).

CONSEILS PRATIQUES : Comment effectuer une bonne intégration par parties (I.P.P)

1^{er} cas : Dans une I.P.P où la fonction à intégrer est du type *polynôme* × *fonction trigo* ou *bien polynôme* × *fonction racine carrée*, **il faudrait toujours dériver la fonction polynôme**

EXERCICE D'APPLICATION

Calculer les intégrales suivantes :

a) $\int_0^{\pi} (2x - 1) \sin(2x) dx$; b) $\int_0^3 2x \sqrt{x + 1} dx$; c) $\int_{-8}^3 \frac{x}{\sqrt{1-x}} dx$

2^e cas : Dans une I.P.P où la fonction à intégrer est du type $A(x) \times$ *fonction logarithme* avec $A(x) =$ *fonction polynôme* ou *fonction rationnelle* ou *fonction trigo* ou *fonction racine carrée* ou *fonction exponentielle*, **il faudrait toujours dériver la fonction logarithme**

3^e cas : Dans une I.P.P où la fonction à intégrer est du type $B(x) \times$ *fonction exponentielle* avec $B(x) =$ *fonction polynôme* ou *fonction rationnelle* ou *fonction trigo* ou *fonction racine carrée* ou *fonction exponentielle*, **il faudrait toujours dériver la fonction $B(x)$**

APPLICATIONS IMMEDIATES

Activité 1 :

A l'aide de deux I.P.P, calculer les intégrales suivantes : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx$ et $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx$

Activité 2 :

On considère les intégrales suivantes : $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^4 x dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^4 x dx$

1) Calculer $I + J$ et $I - J$

2) En déduire les valeurs exactes de I et J

Activité 3 :

On considère les intégrales suivantes : $A = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (x + 1) \cos^2 x dx$ et $B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (x + 1) \sin^2 x dx$

1) Justifier l'existence de A et B

2) Calculer $A+B$ puis $A-B$

3) Déduire les valeurs de A et B

Activité 4 :

Soit la suite d'intégrale I_n définie par $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} dx \forall n \in \mathbb{N}$

1) calculer I_0

2) Calculer I_1 à l'aide d'une I.P.P. Etablir une relation de récurrence entre I_n et I_{n-1}

Activité 5 :

Soit la suite d'intégrale I_n définie par $I_n = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{\sqrt{1+x^2}} dx \forall n \in \mathbb{N}$

1) calculer I_0

2) En intégrant par parties, établir une relation de récurrence entre I_n et $I_{n-1} \forall n > 1$

3) En déduire les valeurs exactes de I_1 , I_2 et I_3

4) Soit J_n l'intégrale définie par $J_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$. En intégrant par parties, montrer que :

$$J_n = \left(\frac{n-1}{n} \right) J_{n-2}$$

N.B : TECHNIQUES DE CALCULS D'INTEGRALES

- **Changement de variable**

Soit f une fonction continue sur I . α et $\beta \in \mathbb{R} / \forall t \in I, (\alpha t + \beta) \in I$. Soient a et $b \in I$ pour calculer

$$\int_a^b f(\alpha t + \beta) dt$$

On peut procéder de la manière suivante. On pose $u = \alpha t + \beta$ $du = \alpha dt \Rightarrow dt = \frac{1}{\alpha} du$

$$\int_a^b f(\alpha t + \beta) dt = \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} \frac{1}{\alpha} f(u) du$$

Exercice d'application

Calculer $I = \int_2^4 e^{(-\frac{1}{2}t+1)} dt$

Posons : $u = -\frac{1}{2}t + 1 \Rightarrow du = -\frac{1}{2} dt$ donc $dt = -2du$

$$\int_2^4 e^{(-\frac{1}{2}t+1)} dt = \int_0^{-1} -2e^u du$$

$$I = -2 \int_0^{-1} e^u du$$

$$= -2[e^u]_0^{-1}$$

$$I = -2(e^{-1} - 1)$$

- Intégration d'une fonction paire, impaire, périodique

Propriétés :

P₁) Soit f une fonction **continue et paire** sur $\mathbb{R}$ alors $\forall a \in \mathbb{R} \int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$

P₂) Soit f une fonction **continue et impaire** sur $\mathbb{R}$ alors $\forall a \in \mathbb{R} \int_{-a}^a f(t) dt = 0$

P₃) Soit f une fonction **continue sur $\mathbb{R}$ et périodique p** alors :

$$\forall a \in \mathbb{R} \int_a^{a+p} f(t) dt = \int_0^p f(t) dt$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \int_{a+p}^{b+p} f(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

4. INEGALITES ET INTEGRALES

a) Théorème de la moyenne

Ce théorème est utile pour établir les inégalités en utilisant les intégrales. C'est la forme intégrale de l'inégalité des accroissements finis (I.A.F). Il se présente sous deux formes :

Forme 1 : soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ donc intégrable ; m et M deux réels.

Si $m \leq f(x) \leq M$ alors on a : $m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$

ou

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Démonstration : Si, pour tout x de $[a; b]$, $m \leq f(x) \leq M$ alors $\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$ Or $\int_a^b m dx = m \int_a^b dx = m(b - a)$ et $\int_a^b M dx = M \int_a^b dx = M(b - a)$ donc :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

Forme 2 : soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ et M un réel.

Si $|f(x)| \leq M$ (avec $M > 0$) alors on a : $\int_a^b |f(x)| dx \leq M|b-a|$

Démonstration : Si, pour tout x de $[a; b]$, $|f(x)| \leq M \Leftrightarrow -M \leq f(x) \leq M$ alors

$$\int_a^b -M dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \Rightarrow \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b |M| dx$$

$$\Rightarrow \int_a^b |f(x)| dx \leq [Mx]_a^b \Rightarrow \int_a^b |f(x)| dx \leq M(b-a)$$

or $a \leq b$ alors $b-a > 0 \Rightarrow |b-a| > 0$ d'où $\int_a^b |f(x)| dx \leq M|b-a|$

b) Notion de la valeur moyenne

On suppose $a \leq b$. On appelle « valeur moyenne de f sur l'intervalle $[a; b]$ » le réel :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

APPLICATIONS IMMEDIATES

Activité 1 :

- 1) Calculer la valeur moyenne de la fonction $\sin x$ sur $[\pi/3; \pi]$
- 2) Soit f une fonction définie sur $[3; 4]$ par $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$. Donner un encadrement de $\int_3^4 f(x) dx$
- 3) On considère la fonction f définie sur $[0; \frac{2}{3}]$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$
 - a) Montrer que f est bornée sur $[0; \frac{2}{3}]$
 - b) En déduire un encadrement de $\int_0^{\frac{2}{3}} f(x) dx$

Activité 2 :

Soit f une fonction définie sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ par $f(x) = \frac{\cos x}{x^2+1}$. Montrer que $\frac{\cos x}{1+(\pi/2)^2} \leq f(x) \leq \cos x$. En déduire un encadrement de $\int_0^{\pi/2} f(x) dx$

Activité 3 :

Sans calculer les intégrales, établir les encadrements suivants :

$$a) 1 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \leq \sqrt{2}$$

$$b) \frac{2}{3} \leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2+x+x^2}} dx \leq \frac{3\sqrt{2}}{5}$$

$$c) \frac{2\pi}{13} \leq \int_0^{2\pi} \frac{1}{10-3\sin x} dx \leq \frac{2\pi}{7}$$

5. INTEGRALES ET AIRES (CALCULS D'AIRES)

a) Expression d'une primitive au moyen d'une intégrale

Soit f une continue sur I et $A \in I$. L'unique primitive de f sur I prenant la valeur 0 en A est la primitive F définie par la relation $F(x) = \int_a^b f(t)dt$

b) Interprétation géométrique de l'intervalle

- Si f une fonction continue et positive sur $[a; b]$ alors, l'aire du domaine limité par l'axe des abscisses, la courbe C_f , les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ exprimée en unités d'aire (U.A) est donnée par la relation suivante :

$$A = \int_a^b f(x)dx \text{ (U.A)}$$

N.B : L'unité d'aire (U.A) est l'aire du rectangle engendré par le repère choisi = **unité sur l'axes abscisses** $\times$ **unité sur l'axes ordonnées**

Exemple : Si l'unité sur l'axe des abscisses est 2 cm et l'unité sur l'axe des ordonnées est 3cm alors $U.A = 3 \times 2 = 6 \text{ cm}^2$

- Si f une fonction continue et négative sur $[a; b]$ alors, l'aire du domaine limité par l'axe des abscisses, la courbe C_f , les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ exprimée en unités d'aire (U.A) est donnée par la relation suivante :

$$A = - \int_a^b f(x) dx \text{ (U.A)}$$

- Si f est une fonction continue et ne garde pas un signe constant sur $[a; b]$ alors, l'aire du domaine mesurée en unités d'aire, est égale à la somme des aires des domaines situés au-dessus de l'axe des abscisses, diminué de la somme des aires des domaines situés au-dessous de l'axe des abscisses

$$A = \int_a^\alpha f(x)dx - \int_\alpha^\beta f(x)dx + \int_\beta^b f(x)dx \quad (U.A)$$

- Aire comprise entre deux courbes

Soient f et g deux fonctions de courbe C_f et C_g

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x))dx \quad (U.A)$$

$$A = \int_a^c (f(x) - g(x))dx + \int_c^b (g(x) - f(x))dx \quad (U.A)$$

- Cas particulier des courbes et asymptotes obliques (ce sont des cas récurrents)

$$A = \int_a^b (f(x) - y) dx$$

$$A = \int_a^b (y - f(x)) dx$$

$$A = - \int_a^b (y - f(x)) dx$$

APPLICATIONS IMMEDIATES

Activité 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ de courbe représentative C_f d'unité graphique 0,5 cm

1) Représenter C_f

2) Calculer en cm^2 l'aire du domaine limitée par les droites d'équation $x = 1, x = -1$, l'axe des abscisses et la courbe C_f

Activité 2 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = 2x + \frac{1}{x^2}$ de courbe représentative C_f d'unité graphique 2 cm

1) Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variation

2) Montrer que C_f admet une asymptote oblique dont on déterminera une équation cartésienne en étudiant les branches infinies en $+\infty$

3) Etudier la position relative de la courbe par rapport à son asymptote oblique

4) Représenter C_f et son asymptote oblique

5) Hachurer le domaine D_1 défini par : $\begin{cases} \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$ puis calculer l'aire de D_1 en cm^2

6) soit α un nombre réel tel que $\alpha > 1$. Hachurer le domaine de D_α limité par les droites d'équation $x = \alpha, x = 1$, la courbe C_f et l'asymptote oblique.

a) Calculer en cm^2 l'aire A_α et D_α

b) Que peut-on dire de la limite de A_α quand $\alpha \rightarrow +\infty$

6. CALCUL APPROCHE D'UNE INTEGRALE

Figure 1

Figure 2

Méthode des rectangles

Elle consiste à diviser l'intervalle $[a; b]$ en n intervalles réguliers d'extrémités $x_0 = a, \dots, x_n = b$

On assimile alors l'aire A à la somme des aires ou des intégrales définies par les figures $A = \int_a^b f(x)dx$

Figure 1 :

$$S_n = \frac{b-a}{n} f(x_0) + \frac{b-a}{n} f(x_1) + \dots + \frac{b-a}{n} f(x_{n-1})$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$$

Figure 2 :

$$S'_n = \frac{b-a}{n} f(x_1) + \frac{b-a}{n} f(x_2) + \dots + \frac{b-a}{n} f(x_n)$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

La précision des calculs est d'autant plus grande que n est élevé.

Propriétés :

Soit f une fonction dérivable sur $[a; b]$ telle qu'il existe $M > 0$ vérifiant $\forall x \in [a; b] |f'(x)| < M$

Alors si

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) ; S'_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \text{ et } A = \int_a^b f(x) dx \text{ on a :}$$

$$|S_n - A| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n} \text{ et } |S'_n - A| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n}$$

$$0 \leq |S_n - A| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n} \Rightarrow 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} |S_n - A| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{M(b-a)^2}{2n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |S_n - A| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = \int_a^b f(x) dx$$

7. CALCUL DE VOLUME

L'espace est muni d'un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ On appelle unité de volume noté $u.v.$ Le nombre $\|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \|\vec{k}\|$. On considère un solide limité par les plans d'équation $z = a$ et $z = b$ avec $a < b$.

Pour tout z tel que b , on note Pz le plan perpendiculaire à (Oz) et de cote z , $S(z)$ l'aire de la section du solide par le plan Pz . Si S est une fonction continue sur $[a; b]$, alors le volume du solide est :

$$V = \int_a^b S(z) dz$$

• **Calcul du volume d'une sphère**

Compte tenu de la symétrie de la sphère, on calcule le volume d'une demi-sphère qu'on multipliera ensuite par 2. On découpe ainsi la demi-sphère avec des plans perpendiculaires à l'axe (Oz) .

Les surfaces obtenues sont alors des cercles de rayon $r(z)$.

La surface de ces cercles $S(z)$ vaut : $S(z) = \pi r^2(z)$

Il reste donc à déterminer le rayon $r(z)$ en fonction de z à l'aide du théorème de Pythagore dans le triangle OMN rectangle en $N(0, 0, z)$: $r^2(z) = R^2 - z^2$

On obtient alors le demi-volume de la sphère :

$$\frac{1}{2}V = \int_0^R S(z) dz = \int_0^R \pi(R^2 - z^2) dz = \pi \left[R^2 z - \frac{z^3}{3} \right]_0^R = \pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = 2\pi R^3$$

On en déduit alors le volume de la sphère que tout le monde a appris : $V = \frac{4}{3} \pi R^3$

• **Volume d'un cône**

On découpe le cône d'axe (Oz) avec des plans perpendiculaires à l'axe (Oz) . Les surfaces obtenues sont alors des cercles de rayon $r(z)$. Il reste donc à déterminer le rayon $r(z)$ en fonction de z à l'aide du théorème de Thalès dans les triangles : OBB' et OAA' ,

on a avec $A(0, 0, z)$:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{AA'}{BB'} \Leftrightarrow \frac{z}{h} = \frac{r(z)}{R} \Leftrightarrow r(z) = \frac{Rz}{h}$$

On obtient ainsi le volume du cône :

$$V = \int_0^h \pi r^2(z) dz = \int_0^h \pi \frac{R^2 z^2}{h^2} dz = \pi \frac{R^2}{h^2} \int_0^h z^2 dz = \pi \frac{R^2}{h^2} \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^h = \pi \frac{R^2}{h^2} \left(\frac{h^3}{3} \right) = \frac{1}{3} \pi R^2 h$$

On retrouve ainsi le volume du cône que tout le monde connaît : $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$

• **Volume d'un solide engendré par la rotation d'une partie de plan autour d'un axe**

L'espace est rapporté à un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la partie du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ délimitée par la courbe d'équation $y = f(x)$ et les droites d'équation $x = a, x = b$ et l'axe $(O, \vec{i})$. En tournant autour de l'axe $(O, \vec{i})$, cette partie de plan engendre un solide de révolution limité par les plans parallèles à $(O, \vec{j}, \vec{k})$ d'abscisse respectives a et b . La section S du solide par le plan parallèle à $(O, \vec{j}, \vec{k})$ d'abscisse x est un disque de rayon $f(x)$, donc d'aire $\pi f^2(x)$.

Le volume de ce solide est en unité de volume :

$$\int_a^b S(x)dx = \pi \int_a^b f^2(x)dx$$

Exercice d'application

On considère le parabolôide construit en faisant tourner la parabole d'équation $y = x^2$ sur l'intervalle $[0; 1]$ autour de l'axe (Oy) . Le parabolôide est un solide compris entre les plans d'équations $y = 0$ et $y = 1$, et la section du solide par le plan perpendiculaire à $(O; \vec{j})$ est un disque de rayon x , donc d'aire $\pi x^2 = \pi y$.

Alors le volume de ce parabolôide $(Vol) = \int_0^1 \pi y dy = \left[\pi \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} u.v.$

8. FONCTIONS DEFINIES PAR UNE INTEGRALE

Théorème :
 Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a \in I$.
 Soit $g : I \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$
 g est dérivable sur I et on a : $g'(x) = f(x)$. En fait g étant une primitive de f qui s'annule en a .

- Propriétés:**
- $g(a) = 0$
 - $g(b) = \int_a^b f(t) dt = \text{constante}$
 - Si f est positive (resp. négative) dans un intervalle $[p; q]$ qui contient a ,
 Si $x > a$ alors f et g ont même signe
 Si $x < a$ alors f et g ont les signes opposés
 - Si f est continue alors g est continue et dérivable ; si f est dérivable alors g' est continue et dérivable.

EXERCICE D'APPLICATION

Calculer la dérivée de la fonction g définie de :

$$\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \int_0^x \frac{dt}{1 + \tan^4 t}$$

Solution :

$$\text{Ici } I = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\text{ et } a = 0 \in I. f: x \mapsto \frac{1}{1 + \tan^4 x}$$

La fonction f est continue sur I donc la fonction g est dérivable sur $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ et on a :

$$g'(x) = \frac{1}{1 + \tan^4 x}$$

T.A.F A LA MAISON

Activité 1 :

Soit f la fonction définie et dérivable sur $[0; +\infty[$ telle que $f(x) = \frac{x}{e^x - x}$. On admet que la fonction f est positive sur $[0; +\infty[$. On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthogonal du plan représentée ci-dessous.

Soit la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \int_0^n f(x) dx$ (on ne cherchera pas à calculer la valeur exacte de I_n en fonction n).

1) Montrer que la suite (I_n) est croissante

2) On admet que pour tout réel x de l'intervalle $[0; +\infty[$ $e^x - x \geq \frac{e^x}{2}$

a) Montrer que, pour tout entier naturel n $I_n \leq \int_0^n 2xe^{-x} dx$

b) Soit H la fonction définie et dérivable sur $[0; +\infty[$ telle que $H(x) = (-x - 1)e^{-x}$ Déterminer la fonction dérivée H' de la fonction H .

c) En déduire que, pour tout entier naturel n , $I_n \leq 2$

3) Montrer que la suite (I_n) est convergente (on ne demande pas la valeur de sa limite)

Activité 2 :

t désigne un réel positif. On suppose qu'à l'instant t (exprimé en minutes), la température de la boîte est donnée par $f(t)$ (exprimée en degré Celsius) avec :

$$f(t) = 100 - 75e^{-\frac{\ln 5}{10}t}$$

1a) Etudier le sens de variations de f sur $[0; +\infty[$

b) Justifier que si $t \geq 10$ alors $f(t) \geq 85$

2) Soit θ un réel tel que $\theta \geq 10$

On note $A(\theta)$ le domaine délimité par les droites d'équations $t = 10, t = \theta, y = 85$ et la courbe représentative (C_f) de f .

On considère que la stérilisation est finie au bout d'un temps θ , si l'aire, exprimée en unité d'aire du domaine $A(\theta)$ est supérieure à 80.

- Justifier à l'aide du graphique donné ci-dessous que $A(25) > 80$
- Justifier que pour $\theta \geq 10$ on a $A(\theta) = 15(\theta - 10) - 75 \int_{10}^{\theta} e^{-\frac{\ln 5}{10}t} dt$
- La stérilisation est-elle finie au bout de 20 minutes ?

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par : $u_n = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^{-x}} dx$

1a) Montrer que $u_0 + u_1 = 1$

c) Montrer que $u_1 = 1 - \ln\left(\frac{2}{1+e}\right)$ et en déduire u_0

2a) Montrer que pour tout entier naturel n , $u_n \geq 0$

b) Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $u_n + u_{n+1} = \frac{1-e^{-n}}{n}$

c) En déduire que pour tout entier naturel n , $u_n \leq \frac{1-e^{-n}}{n}$

3) Prouver que (u_n) converge vers une limite à déterminer

Les Grands profs de Maths

Mathématiques
Terminales scientifiques C & E
Support de Cours sur les Coniques.

29 août 2018

Table des matières

1	Les coniques.	1
1.1	Généralité	1
1.1.1	Etude géométrique d'une conique.	1
1.1.2	Définition et Propriétés.	2
1.1.3	Régionnement du plan par une conique.	2
1.2	Equation réduite d'une conique	3
1.2.1	Equation réduite d'une Parabole.	3
1.2.2	Equation reduite d'une conique à centre ($e \neq 1$).	5
1.3	Etude Analytique de la Parabole, de l'Ellipse et de l'Hyperpobe	8
1.3.1	Etude analytique de la parabole.	8
1.3.2	Etude analytique de l'Ellipse.	9
1.3.3	Etude analytique de l'Hyperbole.	12
1.3.4	Exercices.	14
1.3.5	Exercices d'applications.	14

LES CONIQUES.

Objectifs pédagogiques opérationnels :

- A la fin de ce chapitre l'élève doit être capable de :
- ↔ Reconnaître une conique ;
 - ↔ Ecrire l'équation d'une parabole ;
 - ↔ Reconnaître l'équation d'une ellipse ;
 - ↔ Reconnaître l'équation d'une hyperbole ;
 - ↔ déterminer la nature et les éléments caractéristiques (axe focal, foyer, directrice, sommets et paramètre) d'une conique ;
 - ↔ Faire la représentation graphique d'une conique.

1.1 Généralité

1.1.1 Etude géométrique d'une conique.

Activité résolue.

Soit $(\mathcal{D})$ une droite, F un point n'appartenant pas à $(\mathcal{D})$, e un nombre réel strictement positif. Soit M un point du plan, on désigne par H son projeté orthogonal sur $(\mathcal{D})$.

Soit (Γ_e) l'ensemble des points M tels que $\frac{MF}{MH} = e$, K le projeté orthogonal de F sur $(\mathcal{D})$ et (Δ) la droite (FK) .

Nous allons étudier et construire (Γ_e) pour $e = 1$. (*Cas d'une parabole*)

- (1) Justifions que (Δ) est un axe de symétrie de (Γ_1) . Soit M' le symétrique de M par rapport à (Δ) H' son projeté orthogonal sur $(\mathcal{D})$ donc $M'F = MF$ et $M'H' = MH$ d'où $\frac{M'F}{M'H'} = \frac{MF}{MH} = 1$, $M' \in (\Gamma_1)$.
- (2) Démontrons que le milieu S de $[FK]$ appartient à (Γ_1) .
On a $\frac{SF}{SK} = 1$ d'où $S \in \Gamma_1$
- (3) Démontrons que tout point de Γ_1 appartient au demi-plan délimité par la droite (T) passant par S et parallèle à $(\mathcal{D})$.
Il suffit de justifier que $MF \leq MK$
en effet $MF = MH \leq MK$. Cqfd
- (4) Justifions qu'un point M appartient à (Γ_1) si et seulement si M est le point de rencontre de (MH) et la médiatrice de $[HE]$

$$\begin{aligned}
 M \in (\Gamma_1) &\Leftrightarrow M \in (MF) \text{ et } MF = MH \\
 &\Leftrightarrow M \in (MH) \text{ et } M \in \text{médiatrice } [HF] \\
 &\Leftrightarrow M \text{ est le point de rencontre de } (MH) \text{ et la médiatrice de } [HF] .
 \end{aligned}$$

- (5) Programme de construction de (Γ_1) .
 - Choisir un point H de $(\mathcal{D})$ et trace la perpendiculaire (Δ_H) à $(\mathcal{D})$ passant par H .
 - Construire la médiatrice de $[HF]$.
 - Repérer le point de rencontre de la droite (Δ_H) et la médiatrice de $[HF]$

Conclusion

(Γ_1) est une parabole.

On vérifie également que :

- Si $0 < e < 1$ alors (Γ_e) est une ellipse ;
- Si $e > 1$ alors (Γ_e) est une hyperbole.

1.1.2 Définition et Propriétés.

Définition 1.1. Soit $(\mathcal{D})$ une droite F un point n'appartenant pas à $(\mathcal{D})$.

On appelle Conique de foyer F de directrice $(\mathcal{D})$ et d'excentricité e l'ensemble (Γ) des points M du plan tel que $\frac{MF}{MH} = e$ où H est le projeté orthogonal de M sur $(\mathcal{D})$.

Propriétés

Soit (Γ) une conique de foyer F de directrice $(\mathcal{D})$ et d'excentricité e .

- (P₁) - Si $e = 1$ alors (Γ) est une parabole ;
 - Si $0 < e < 1$ alors (Γ) est une ellipse ;
 - Si $e > 1$ alors (Γ) est une hyperbole.
- (P₂) La droite (Δ) passant par F et perpendiculaire à $(\mathcal{D})$ est un axe de symétrie de (Γ)
- (P₃) - Si $e = 1$ (Γ) coupe (Δ) en un seul point S milieu de $[FK]$.
 - Si $e \neq 1$ alors Γ coupe (Δ) en deux points distinct A et A' .

Le point S est appelé **sommet** de la parabole.

Les points A et A' sont les sommets de la conique situés sur l'axe (Δ)

Remarque

Si $e \neq 1$ alors $A = \text{bar}\{(F; 1), (K; e)\}$ et $A' = \text{bar}\{(F; 1), (K; -e)\}$

1.1.3 Régionnement du plan par une conique.

Définition 1.2. Soit (Γ) une conique de foyer F de directrice $(\mathcal{D})$ et d'excentricité e .

Pour tout point M du plan de projeté orthogonal H sur $(\mathcal{D})$, on a :

- M est intérieur à (Γ) si $MF < eMH$;
- M est extérieur à (Γ) si $MF > eMH$.

Remarque

Le foyer F d'une conique est intérieur à cette conique. Tout point de la directrice $(\mathcal{D})$ d'une conique est extérieur à cette conique.

1.2 Equation réduite d'une conique

1.2.1 Equation réduite d'une Parabole.

Soit $(\mathcal{P})$ une parabole de foyer F et de directrice $(\mathcal{D})$, K le projeté orthogonal de F sur $(\mathcal{D})$ et S milieu de $[FK]$.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(S; \vec{i}, \vec{j})$ telque $\vec{i} = \frac{1}{SF} \vec{SF}$.

Posons $P = KF$ et $F(\frac{P}{2}; 0)$ $(\mathcal{D}) : x = -\frac{P}{2}$
Soit $M(x, y)$ un point du plan $H(-\frac{P}{2}; y)$.

$$\begin{aligned} M \in (\mathcal{P}) &\Leftrightarrow MF = MH \\ &\Leftrightarrow MF^2 = MH^2 \\ &\Leftrightarrow (x - \frac{P}{2})^2 + y^2 = (x + \frac{P}{2})^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4} \\ &\Leftrightarrow (\mathcal{P}) : y^2 = 2px \end{aligned}$$

Propriété

Soit $(\mathcal{P})$ la parabole de foyer F , de directrice $(\mathcal{D})$ et d'excentricité e .
Dans le repère $(S; \vec{i}, \vec{j})$ telque $\vec{i} = \frac{1}{SF} \vec{SF}$. $(\mathcal{P})$ est la parabole d'équation $y^2 = 2px$, où p est la distance de F à $(\mathcal{D})$ p est appelé paramètre de la parabole.

Remarques

(1) Si l'axe focal est l'axe de repère $(S; \vec{j})$ On obtient une équation de la forme $x^2 = 2py$.

Dans le repère $S; \vec{i}, \vec{j}$ telque $\vec{j} = \frac{1}{SF} \vec{SF}$

En effet posons $P = KF$ et $F(0; \frac{p}{2})$ $(\mathcal{D}) : y = -\frac{p}{2}$
 Soit $M(x, y)$ un point du plan $H(x; -\frac{p}{2})$.

$$\begin{aligned} M \in & \Leftrightarrow MF = MH \\ & \Leftrightarrow MF^2 = MH^2 \\ & \Leftrightarrow (y - \frac{p}{2})^2 + x^2 = (y + \frac{p}{2})^2 \\ & \Leftrightarrow y^2 - py + \frac{p^2}{4} + x^2 = y^2 + py + \frac{p^2}{4} \\ & \Leftrightarrow (\mathcal{P}) : x^2 = 2py \end{aligned}$$

(2) Dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ la courbe d'équation $y^2 = 2ax$ est une parabole de sommet O , d'axe focal la droite de repère $(O; \vec{i})$ de paramètre $|a|$ de foyer $F(\frac{a}{2}; 0)$ et de directrice $(\mathcal{D}) : x = -\frac{a}{2}$.

Exemple.

La courbe d'équation $y^2 = 10x$ est une parabole de sommet O d'axe focal la droite de repère $(O; \vec{i})$, de paramètre 5 de foyer $F(\frac{5}{2}; 0)$ et de directrice $(\mathcal{D}) : x = -\frac{5}{2}$.

Exercice

Déterminer les éléments caractéristiques (sommet; axe focal; foyer; paramètre directrice) des paraboles suivants $(\mathcal{P}_1) : y^2 + 16x = 0$; $(\mathcal{P}_\epsilon) : y^2 - 4x + 2y + 9 = 0$.

(3) Dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ la courbe d'équation $x^2 = 2ay$ est une parabole de sommet O , d'axe focal la droite de repère $(O; \vec{j})$ de paramètre $|a|$ de foyer $F(0; \frac{a}{2})$ et de directrice $(\mathcal{D}) : y = -\frac{a}{2}$.

Exemple.

La courbe d'équation $x^2 + 9y = 0$ est une parabole de sommet O d'axe focal la droite de repère $(O; \vec{j})$, de paramètre $\frac{9}{2}$ de foyer $F(0; -\frac{9}{4})$ et de directrice $(\mathcal{D}) : y = \frac{9}{4}$.

Exercice

Déterminer les éléments caractéristiques (sommet; axe focal; foyer; paramètre directrice) des paraboles suivants $(\mathcal{P}_1) : x^2 + 8y = 0$; $(\mathcal{P}_2) : x^2 - 8y + 4x + 6 = 0$.

1.2.2 Equation reduite d'une conique à centre ($e \neq 1$).

Soit (Γ) une conique de foyer F , de directrice $(\mathcal{D})$, d'excentricité e ($e \neq 1$) et d'axe (Δ) est l'axe focal. A et A' deux points de (Δ) appartenant à (Γ) .

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ telque O est le milieu de $[AA']$ et $\vec{i} = \frac{1}{OA} \vec{OA}$

Cas où $0 < e < 1$: Ellipse

Cas où $e > 1$: Hyperbole

On a $A = \text{bar}\{(F, 1); (K, e)\}$; $A' = \text{bar}\{(F, 1); (K, -e)\}$

En effet si $G = \text{bar}\{(A, a); (B, b)\}$ alors pour tout point M du plan on a la relation $a\vec{MA} + b\vec{MB} = (a+b)\vec{MG}$ c'est-à-dire

$$\begin{aligned}\vec{MF} + e\vec{MK} &= (1+e)\vec{MA} \\ \vec{MF} - e\vec{MK} &= (1-e)\vec{MA}'\end{aligned}$$

Pour $M = O$, on a :

$$\begin{aligned}\vec{OF} + e\vec{OK} &= (1+e)\vec{OA} \\ \vec{OF} - e\vec{OK} &= (1-e)\vec{OA}'\end{aligned}$$

on en déduit que : $\vec{OF} = e\vec{OA}$ et $\vec{OA} = e\vec{OK}$

Posons $a = OA$ et $c = OF$ on a : $OF = eOA$ et $OA = eOK$; on en déduit que : $e = \frac{OF}{OA} = \frac{c}{a}$ et $OK = \frac{OA}{e} = \frac{a^2}{c}$. Deplus $F(c; 0)$ et $(\mathcal{D}) : x = \frac{a^2}{c}$

Soit $M(x; y)$ un point du plan ; $H(\frac{a^2}{c}; y)$ est le projeté orthogonal de M sur $(\mathcal{D})$ et $H(\frac{a^2}{c}; 0)$:

$$\begin{aligned}
 M \in (\Gamma) &\Leftrightarrow \frac{MF}{MH} = e \\
 &\Leftrightarrow MF = eMH \\
 &\Leftrightarrow MF^2 = e^2MH^2 \\
 &\Leftrightarrow (x - c)^2 + y^2 = e^2\left(x - \frac{a^2}{c}\right)^2 \\
 &\Leftrightarrow x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = \left(\frac{c}{a}\right)^2\left(x - \frac{a^2}{c}\right)^2 \\
 &\Leftrightarrow x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = \left(\frac{c}{a}x - a\right)^2 \\
 &\Leftrightarrow x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 \\
 &\Leftrightarrow x^2 - \frac{c^2}{a^2}x^2 + y^2 - a^2 + c^2 = 0 \\
 &\Leftrightarrow \left(\frac{a^2 - c^2}{a^2}\right)x^2 + y^2 - a^2 + c^2 = 0 \\
 &\Leftrightarrow (a^2 - c^2)\frac{x^2}{a^2} + y^2 = a^2 - c^2 \\
 &\Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1.
 \end{aligned}$$

Propriétés

(P₁) Soit (Γ) une conique de foyer F de directrice $(\mathcal{D})$ et d'excentricité e ($e \neq 1$). On désigne par A et A' les sommets de (Γ) situés sur son axe focal.

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ tel que O est le milieu de $[AA']$ et $\vec{i} = \frac{1}{OA}\vec{OA}$, (Γ) est la courbe d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$ où $a = OA$ et $c = OF$.

(P₂) Soit (Γ) une conique d'excentricité e ($e \neq 1$).

La médiatrice de $[AA']$ est un axe de symétrie de (Γ) .

Le milieu O de $[AA']$ est centre de symétrie de (Γ) .

Remarques

(1) Un échange des axes de repère $(O; \vec{i})$ et $(O; \vec{j})$ conduit à l'équation $\frac{x^2}{b^2 - c^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

- L'axe focal est la droite de repère $(O; \vec{j})$.

- Le foyer est $F(0; c)$.

- La directrice est $(\mathcal{D}) : y = \frac{b^2}{c}$.

- Les sommets situés sur l'axe focal sont les points $B(0; b)$ et $B'(0; -b)$.

(2) F' et $(\mathcal{D}')$ image de F et $(\mathcal{D})$ par la symétrie de centre O sont également un foyer et une directrice de (Γ) .

La distance $FF' = 2c$ est appelé distance focal de (Γ) .

(3) - Si $0 < e < 1$, alors (Γ) est une ellipse $\Rightarrow \frac{c}{a} < 1 \Rightarrow c < a$

posons $b^2 = a^2 - c^2$ l'équation de (Γ) devient $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

- Si $e > 1$ alors (Γ) est une hyperbole $\frac{c}{a} > 1 \Leftrightarrow c > a$ posons $b^2 = c^2 - a^2$ l'équation (Γ) devient $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

En Résumé on a le tableau récapitulatif suivant

Equation	Nature	c	e	Foyer	Directrice	axe focal	sommets principaux
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $a > b > 0$	Ellipse	$\sqrt{a^2 - b^2}$	$\frac{c}{a}$	$F\left(\frac{c}{0}\right)$ $F'\left(\frac{-c}{0}\right)$	$(\mathcal{D}) : x = \frac{a^2}{c}$ $(\mathcal{D}') : x = -\frac{a^2}{c}$	Droite de repère $(O; \vec{i})$	$A\left(\frac{a}{0}\right)$ $A'\left(\frac{-a}{0}\right)$
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $b > a > 0$	Ellipse	$\sqrt{b^2 - a^2}$	$\frac{c}{b}$	$F\left(\frac{0}{c}\right)$ $F'\left(\frac{0}{-c}\right)$	$(\mathcal{D}) : y = \frac{b^2}{c}$ $(\mathcal{D}') : y = -\frac{b^2}{c}$	Droite de repère $(O; \vec{j})$	$B\left(\frac{0}{b}\right)$ $B'\left(\frac{0}{-b}\right)$
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Hyperbole	$\sqrt{a^2 + b^2}$	$\frac{c}{a}$	$F\left(\frac{c}{0}\right)$ $F'\left(\frac{-c}{0}\right)$	$(\mathcal{D}) : x = \frac{a^2}{c}$ $(\mathcal{D}') : x = -\frac{a^2}{c}$	Droite de repère $(O; \vec{i})$	$A\left(\frac{a}{0}\right)$ $A'\left(\frac{-a}{0}\right)$
$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Hyperbole	$\sqrt{a^2 + b^2}$	$\frac{c}{b}$	$F\left(\frac{0}{c}\right)$ $F'\left(\frac{0}{-c}\right)$	$(\mathcal{D}) : y = \frac{b^2}{c}$ $(\mathcal{D}') : y = -\frac{b^2}{c}$	Droite de repère $(O; \vec{j})$	$B\left(\frac{0}{b}\right)$ $B'\left(\frac{0}{-b}\right)$

NB

Lorsque l'axe focal est la droite de repère $(O; \vec{i})$ alors le milieu O de $[AA']$ est appelé centre de la conique
Lorsque l'axe focal est la droite de repère $(O; \vec{j})$ alors le milieu O de $[BB']$ est appelé centre de la conique.

Exercices d'applications

(E₁) Déterminer le foyer et la directrice de la parabole $(\mathcal{P}) : x^2 + 4x + 4y = 0$

(E₂) Donner la nature et les éléments caractéristique des coniques suivantes :

- $(\mathcal{E}) : x^2 + 2y^2 - 2x - 3 = 0 ;$

- $(\mathcal{H}) : 2x^2 - y^2 - 4y - 12 = 0.$

Résolution

(E₁)

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + 4y = 0 &\Leftrightarrow (x + 2)^2 - 4 + 4y = 0 \\ &\Leftrightarrow (x + 2)^2 = 4(1 - y) \\ &\Leftrightarrow (x + 2)^2 = -4(y - 1) \end{aligned}$$

Soit $S\left(\begin{smallmatrix} -2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$; Soit $M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$ dans $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et soit $M\left(\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix}\right)$ dans $(S; \vec{i}, \vec{j})$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SM} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 + X \\ y = 1 + Y \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2 = X \\ y - 1 = Y \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(x, y) \in (\mathcal{P}) &\Leftrightarrow (x + 2)^2 = -4(y - 1) \\ &\Leftrightarrow X^2 = -4Y^2 \end{aligned}$$

$(\mathcal{P})$ est la parabole de sommet S , d'axe focal la droite de repère $(S; \vec{j})$, de directrice $(\mathcal{D}) : y = 1$, de foyer $F\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ de paramètre 2.

(E₂)

$$\begin{aligned} M(x, y) \in (\mathcal{E}) &\Leftrightarrow x^2 + 2y^2 - 2x - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x + 1)^2 + 2y^2 - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{(x - 1)^2}{2^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1 \end{aligned}$$

Soit $O'(0_0)$ et soit $M(\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix})$ dans $(O'; \vec{i}, \vec{j})$ donc $M \in (\mathcal{E}) \Leftrightarrow \frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{2} = 1$
 $(\mathcal{E})$ est l'ellipse de centre $O'(0_0)$, d'excentricité $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ d'axe focal la droite de repère $(O'; \vec{i})$ de foyer focal $F(\begin{smallmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{smallmatrix})$ et $F'(\begin{smallmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \end{smallmatrix})$; les sommets sont : $A(\begin{smallmatrix} 2 \\ 0 \end{smallmatrix})$ et $A'(\begin{smallmatrix} -2 \\ 0 \end{smallmatrix})$ et de directrice $(\mathcal{D}) : x = 2\sqrt{2}$ et $(\mathcal{D}') : x = -2\sqrt{2}$.

(E₃)

$$\begin{aligned} M(x; y) \in (\mathcal{H}) &\Leftrightarrow 2x^2 - y^2 - 4y - 12 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 - (y + 2)^2 - 8 = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{(y + 2)^2}{8} = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2}{2^2} - \frac{(y + 2)^2}{(2\sqrt{2})^2} = 1 \end{aligned}$$

Soit $O'(\begin{smallmatrix} 0 \\ -2 \end{smallmatrix})$ et soit $M(\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix})$ dans $(O'; \vec{i}, \vec{j})$ donc $M \in (\mathcal{H}) \Leftrightarrow \frac{X^2}{4} - \frac{Y^2}{2\sqrt{2}} = 1$
 $(\mathcal{H})$ est l'hyperbole de centre $O'(\begin{smallmatrix} 0 \\ -2 \end{smallmatrix})$, d'excentricité $e = \sqrt{3}$, d'axe focal la droite de repère $(O'; \vec{i})$ de foyer focal $F(\begin{smallmatrix} 2\sqrt{3} \\ 0 \end{smallmatrix})$ et $F'(\begin{smallmatrix} -2\sqrt{3} \\ 0 \end{smallmatrix})$; les sommets sont : $A(\begin{smallmatrix} 2 \\ 0 \end{smallmatrix})$ et $A'(\begin{smallmatrix} -2 \\ 0 \end{smallmatrix})$ et de directrice $(\mathcal{D}) : x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ et $(\mathcal{D}') : x = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

1.3 Etude Analytique de la Parabole, de l'Ellipse et de l'Hyperpobe

1.3.1 Etude analytique de la parabole.

Activité

On considère la parabole $(\mathcal{P})$ d'équation $y^2 = 2px$ ($p > 0$) :

- Démontrer que $(\mathcal{P})$ est la reunion des courbes représentative de $(\mathcal{P}_1)$ et $(\mathcal{P}_2)$ des fonctions respectives $f_1 : x \mapsto \sqrt{2px}$ et $f_2 : x \mapsto -\sqrt{2px}$.
- Etudier les variations de la fonction $f_1 : x \mapsto \sqrt{2px}$ pour tout $x \in [0; +\infty[$
- Construire alors $(\mathcal{P}_1)$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. puis complète $(\mathcal{P}_2)$ par la symétrie d'axe (Ox) .

Résolution

- Démontrons que $(\mathcal{P})$ est la reunion de deux courbes.
 $y^2 = 2px \Leftrightarrow y = \sqrt{2px}$ ou $y = -\sqrt{2px}$. cdfd
- Etudions les variations de $f_1 : Df_1 = [0; +\infty[$
 f_1 est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x \in]0; +\infty[$ on a : $f_1'(x) = \frac{p}{\sqrt{2px}} > 0$ donc f_1 est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Tableau de variation

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	$+\infty$

- Courbe représentative

a) *Equation de la tangente en un point de la parabole*

Propriété

Soit $(\mathcal{P})$ la parabole d'équation $y^2 = 2ax$ ($a \neq 0$). La tangente en un point $M\left(\frac{x_0}{y_0}\right)$ de $(\mathcal{P})$ a pour équation : $yy_0 = a(x + x_0)$.

Exemple

Soit $(\mathcal{P})$ la parabole d'équation $y^2 = 4x$. L'équation de la tangente au point $A\left(-\frac{1}{2}\right)$ est : $-2y = 2(x - 1)$ ie $x + y - 1 = 0$

b) *Régionnement du plan par la parabole*

Soit $(\mathcal{P})$ la parabole d'équation $y^2 = 2ax$ ($a \neq 0$), $M\left(\frac{x}{y}\right)$ un point du plan, $H\left(-\frac{a}{2}, y\right)$ Le projeté orthogonal de M sur la directrice $(\mathcal{D}) : x = -\frac{a}{2}, F\left(\frac{a}{2}, 0\right)$.

$$\begin{aligned} M \text{ est intérieur à } (\mathcal{P}) &\Leftrightarrow MF^2 < MH^2 \\ &\Leftrightarrow \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 < \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 \\ &\Leftrightarrow y^2 + x^2 - ax + \frac{a^2}{4} < x^2 + ax + \frac{a^2}{4} \\ &\Leftrightarrow y^2 < 2ax \end{aligned}$$

$$M \text{ est extérieur à } (\mathcal{P}) \Leftrightarrow y^2 > 2ax$$

1.3.2 Etude analytique de l'Ellipse.

Activité

Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0; b > 0$ et $a > b$)

1. Montrer que $(\mathcal{E})$ est la réunion des courbes représentatives $(\mathcal{E}_1)$ et $(\mathcal{E}_2)$ des fonctions $f_1 : x \mapsto \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ et $f_2 : x \mapsto -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$
2. Vérifier que $(\mathcal{E}_1)$ et $(\mathcal{E}_2)$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.
3. Etudier la parité de de la fonction f_1 et déduire le domaine d'étude.
4. Etudier les variations de la fonction f_1 sur $[0, a]$.
5. construis alors $(\mathcal{E})$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Résolution

1. Montrons que $(\mathcal{H})$ est la réunion de deux courbes.

$$\begin{aligned} M\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in (\mathcal{E}) &\Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2} \\ &\Leftrightarrow y^2 = b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2 \\ &\Leftrightarrow y^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2) \\ &\Leftrightarrow y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} \text{ ou } y = -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} \text{ cqfm.} \end{aligned}$$

2. Vérification : on a : $\forall x \in [a, -a], f_2(x) = -f_1(x)$ d'où le résultat.

3. Etudions la parité de la fonction f_1 .

Pour tout $x \in [a, -a], -x \in [a, -a]$ on a :

$$\begin{aligned} f_1(-x) &= \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - (-x)^2} \\ &= \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} \\ &= f_1(x) \end{aligned}$$

D'où f_1 est une fonction paire et par conséquent on peut étudier f_1 sur $[0; a]$.

4. Etudions les variations de f_1 .

f_1 est dérivable sur $[0, a[$ et pour tout $x \in [0, a[, f_1'(x) = -\frac{a}{b} \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} < 0$ donc f_1 est strictement décroissante sur $[0, a]$. De plus : $\frac{f_1(x) - f_1(a)}{x - a} = \frac{b}{a} \frac{\sqrt{a-x}}{x-a} \sqrt{a+x}$; donc $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x) - f_1(a)}{x - a} = -\infty$ donc $(\mathcal{E}_1)$ admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse $x_0 = a$.

Tableau de variation

x	0		a
$f_1'(x)$		-	
$f_1(x)$	b	0	

5. Construction de la courbe

Remarque

- $[AA']$ est le grand axe.

- $[BB']$ est le petit axe.
- $\mathcal{C}(O; a)$ le cercle de centre O et de rayon a est le cercle principal.
- $\mathcal{C}(O; b)$ le cercle de centre O et de rayon b est le cercle secondaire.

a) Equation de la tangente en un point de l'Ellipse

Propriété

Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. La tangente en un point $A\left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ y_0 \end{smallmatrix}\right)$ de $(\mathcal{E})$ a pour équation : $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$.

b) Représentation paramétrique d'une ellipse

Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

$$\begin{aligned} M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) \in (\mathcal{E}) &\Leftrightarrow \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 \\ &\Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R}, \frac{x}{a} = \cos \theta \text{ et } \frac{y}{b} = \sin \theta \\ &\Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R}, x = a \cos \theta \text{ et } y = b \sin \theta. \end{aligned}$$

On en déduit la propriété suivante :

Propriété

L'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R})$$

c) Image du cercle principal par une affinité

Soit $(\mathcal{E})$ une ellipse de représentation paramétrique : $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R})$ Soit $(\mathcal{C})$ le cercle principal ie le cercle de centre O et de rayon a .

$M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) \in (\mathcal{C}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R})$ Soit $M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$ un point du plan et f l'affinité orthogonale d'axe

(AA') où $A\left(\begin{smallmatrix} a \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$ et $A'\left(\begin{smallmatrix} -a \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$ et de rapport $\frac{b}{a}$ $M\left(\begin{smallmatrix} x' \\ y' \end{smallmatrix}\right)$ est l'image de M par f . On a $\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{b}{a}y \end{cases} \Rightarrow$

$$\begin{cases} x' = a \cos \theta \\ y' = b \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R})$$

Propriété

Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), de sommets A et A' situés sur l'axe focal. $(\mathcal{E})$ est l'image du cercle de diamètre $[AA']$ par l'affinité orthogonal d'axe (AA') et de rapport $\frac{b}{a}$.

d) Définition bifocal de l'ellipse

Propriété

Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), F et F' les foyers. L'ensemble des points M du plan tels que $MF + MF' = 2a$ est $(\mathcal{E})$.

Exercices d'applications

1. Déterminer l'équation de l'ellipse de représentation paramétrique suivante ainsi que ses éléments caractéristique : $\begin{cases} x = 2 \cos \theta - 3 \\ y = 3 \sin \theta + 1 \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R})$
2. Donner la définition bifocale de l'ellipse suivante : $(\mathcal{E}_1) : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$
3. Donner la définition bifocale de l'ellipse suivante : $(\mathcal{E}_2) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

Résolution

1. Déterminons l'équation de l'ellipse et ses éléments caractéristiques :

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta - 3 \\ y = 3 \sin \theta + 1 \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} x + 3 = 2 \cos \theta \\ y - 1 = 3 \sin \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x + 3)^2 = 4 \cos^2 \theta \\ (y - 1)^2 = 9 \sin^2 \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{4}(x + 3)^2 = \cos^2 \theta \\ \frac{1}{9}(y - 1)^2 = \sin^2 \theta \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\frac{(x+3)^2}{2^2} + \frac{(y-1)^2}{3^2} = 1$$

Soit $O'(-3)$ et soit $M(\frac{X}{Y})$ dans $(O'; \vec{i}, \vec{j})$ donc $M \in (\mathcal{H}) \Leftrightarrow \frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{9} = 1$

$(\mathcal{E})$ est l'ellipse de centre $O'(-3)$, d'excentricité $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$, d'axe focal la droite de repère $(O'; \vec{j})$ de foyer focal $F(\frac{0}{\sqrt{5}})$ et $F'(-\frac{0}{\sqrt{5}})$; les sommets sont : $B(\frac{0}{3})$ et $B'(-\frac{0}{3})$ et de directrice $(\mathcal{D}) : y = \frac{9\sqrt{5}}{5}$ et $(\mathcal{D}') : y = -9\frac{\sqrt{5}}{5}$.

2. Donnons la définition bifocale de l'ellipse suivante : $(\mathcal{E}_1) : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que O soit milieu de $[FF']$ et $\vec{j} = \frac{1}{OF} \overrightarrow{OF}$. On a $MF + MF' = 2b$ et $FF' = 2c$ de plus $F(\frac{0}{4})$ et $F'(-\frac{0}{4})$, $a = 3$ et $b = 5$ donc $c = 4$

Conclusion : $(\mathcal{E}_1)$ est l'ensemble des points M du plan telque $MF + MF' = 10$

3. Donnons la définition de l'ellipse suivante $(\mathcal{E}_2) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

De même que précédement $(\mathcal{E}_2)$ est l'ensemble des points M du plan telque $MF + MF' = 4$

Remarques

R_1 cas où $a > b > 0$

$c = \sqrt{a^2 - b^2}$; $F(\frac{c}{0})$ et $F'(-\frac{c}{0})$. Dans ce cas, $(\mathcal{E}) : \{M \in P : MF + MF' = 2a\}$

R_2 cas où $b > a > 0$

$c = \sqrt{b^2 - a^2}$; $F(\frac{0}{c})$ et $F'(-\frac{0}{c})$. Dans ce cas, $(\mathcal{E}) : \{M \in P : MF + MF' = 2b\}$

1.3.3 Etude analytique de l'Hyperbole.

Activité

Soit $(\mathcal{H})$ l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0; b > 0 \text{ et } a > b)$

1. Montrer que $(\mathcal{H})$ est la réunion des courbes représentatives $(\mathcal{H}_1)$ et $(\mathcal{H}_2)$ des fonctions $f_1 : x \mapsto \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$ et $f_2 : x \mapsto -\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$
2. Vérifier que $(\mathcal{H}_1)$ et $(\mathcal{H}_2)$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.
3. Etudier la parité de de la fonction f_1 et déduire le domaine d'étude.
4. Etudier les variations de la fonction f_1 sur $[0, +\infty[$.
5. construis alors $(\mathcal{H})$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Résolution

1. Montrons que $(\mathcal{H})$ est la reunion de deux courbes.

$$\begin{aligned} M(\frac{x}{y}) \in (\mathcal{E}) &\Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} - 1 \\ &\Leftrightarrow y^2 = \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2 \\ &\Leftrightarrow y^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2) \\ &\Leftrightarrow y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} \text{ ou } y = -\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} \text{ cqfm.} \end{aligned}$$

2. Vérification : on a : $\forall x \in]-\infty; a] \cup [a; +\infty[$, $f_2(x) = -f_1(x)$ d'où le résultat.

3. Etudions la parité de la fonction f_1 .

Pour tout $x \in]-\infty; a] \cup [a; +\infty[$, $-x \in]-\infty; a] \cup [a; +\infty[$ on a :

$$\begin{aligned} f_1(-x) &= \frac{b}{a}\sqrt{(-x)^2 - a^2} \\ &= \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} \\ &= f_1(x) \end{aligned}$$

D'où f_1 est une fonction paire et par conséquent on peut étudier f_1 sur $[a; +\infty[$.

4. Etudions les variations de f_1 .

f_1 est dérivable sur $]a; +\infty[$ et pour tout $x \in]a; +\infty[$, $f_1'(x) = \frac{b}{a} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} > 0$ donc f_1 est strictement croissante sur $]a; +\infty[$. De plus : $\frac{f_1(x) - f_1(a)}{x - a} = \frac{b}{a} \frac{\sqrt{a-x}}{x-a} \sqrt{a+x}$; donc $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x) - f_1(a)}{x - a} = +\infty$ donc $(\mathcal{H}_1)$ admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées au point d'abscisse $x_0 = a$.

5. On démontre que la droite (Δ) d'équation : $y = \frac{b}{a}x$ est asymptote à $(\mathcal{H}_1)$ en $+\infty$.

Tableau de variation

x	0	$+\infty$
$f_1'(x)$		+
$f_1(x)$	0	$+\infty$

6. Construction de la courbe

Définition 1.3. On appelle conique l'ensemble (Γ) des points $M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$ du plan rapporté à un repère orthonormé tel que : $Ax^2 + By^2 + 2Cx + 2Dy + E = 0$ où A, B, C, D, E sont les réels tels que A et B ne sont pas tous deux nuls c'est-à-dire $|A| + |B| \neq 0$.

Propriétés

soit la conique Γ d'équation $Ax^2 + By^2 + 2Cx + 2Dy + E = 0$ où A, B, C, D, E sont les réels tels que A et B ne sont pas tous deux nuls. On a :

1. Si $AB = 0$ alors Γ est une Parabole.
2. Si $AB < 0$ alors Γ est une hyperbole.
3. Si $AB > 0$ alors Γ est une ellipse.

Remarque

- L'hyperbole d'équation $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ est l'image de l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ par la symétrie orthogonale d'axe la première bissectrice
- La réunion des asymptotes de l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ a pour équation : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$.
- Si $a = b$, les asymptotes sont orthogonales et $e = \sqrt{2}$; On dit que $(\mathcal{H})$ est une hyperbole **équilatère**.

a) **Equation de la tangente en un point de l'hyperbole**

Propriété

Soit $(\mathcal{H})$ l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. La tangente en un point $A(x_0, y_0)$ de $(\mathcal{H})$ a pour équation : $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$.

b) Equation de l'hyperbole rapportée à ses asymptotes

Soit $(\mathcal{H})$ l'hyperbole d'équation réduite : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix}$ des vecteurs directeurs des asymptotes de $(\mathcal{H})$.

Soit $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et $M \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= x\vec{i} + y\vec{j} = X\vec{u} + Y\vec{v} \\ x\vec{i} + y\vec{j} &= X(a\vec{i} + b\vec{j}) + Y(a\vec{i} - b\vec{j}) \\ &= a(X + Y)\vec{i} + b(X - Y)\vec{j} \\ \text{Donc} &: \begin{cases} x = a(X + Y) \\ y = b(X - Y) \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi l'équation de $(\mathcal{H})$ dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ est l'expression d'une fonction homographique d'équation : $Y = \frac{1}{4X}$

Exercice d'application

Soit $(\mathcal{H})$ l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{12} = 1$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On donne les vecteurs suivants : $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ $a = 2$ et $b = \sqrt{3}$. Donnons une équation de $(\mathcal{H})$ dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On a les formules de changement de repère suivant : $\begin{cases} x = X + Y \\ y = \sqrt{3}(X - Y) \end{cases}$

Ainsi, dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$, $(\mathcal{H})$ a pour équation : $3(X + Y)^2 - 3(X - Y)^2 = 12$ en développant on trouve $Y = \frac{1}{Y}$.

d) Définition bifocale de l'hyperbole

Propriété

Soit $(\mathcal{H})$ l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), F et F' les foyers. L'ensemble des points M du plan tels que $|MF - MF'| = 2a$ est $(\mathcal{H})$.

1.3.4 Exercices.

E_1 Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation de l'hyperbole dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ telle que $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- $x^2 - y^2 + 4 = 0$

- $x^2 - y^2 - 6x + 2y + 24 = 0$

E_2 Donner la définition bifocale de l'hyperbole $(\mathcal{H})$ dans chacun des cas suivants.

- $(\mathcal{H}_1) : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$

- $(\mathcal{H}_2) : -\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

1.3.5 Exercices d'applications.

Exercice 1.

Déterminer la nature de l'ensemble (Γ) d'équation $4x^2 + y^2 + 16x + 7 = 0$

Solution : $a=4, b=1$ $ab > 0$, on pourrait avoir affaire à une ellipse.

On a $4x^2 + y^2 + 16x + 7 = 0 \Leftrightarrow 4(x+2)^2 + y^2 = 9 \Leftrightarrow \frac{(x+2)^2}{\frac{9}{4}} + \frac{y^2}{9} = 1$.

On vérifie que dans le repère $(\Omega(-2, 0); \vec{i}, \vec{j})$ l'équation $(\Gamma) : \frac{(x+2)^2}{\frac{9}{4}} + \frac{y^2}{9} = 1$ est l'ellipse de centre $\Omega(-2, 0)$, des sommets $B(\frac{0}{3})$ et $B'(\frac{0}{-3})$, d'axe focal $(\Omega, \vec{j})$.

Exercice 2.

Déterminer la nature de l'ensemble (Γ) d'équation $x^2 - 3y^2 + 12y - 3 = 0$

Solution : $a=1, b=-3$ $ab < 0$, on pourrait avoir affaire à une hyperbole.

On a $x^2 - 3y^2 + 12y - 3 = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 3(y-2)^2 = 9 \Leftrightarrow -\frac{x^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{3} = 1$.

On vérifie que dans le repère $(\Omega(0, 2); \vec{i}, \vec{j})$ l'équation $(\Gamma) : -\frac{x^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{3} = 1$ est l'hyperbole de centre $\Omega(0, 2)$, des sommets $B(\frac{0}{\sqrt{3}})$ et $B'(\frac{0}{-\sqrt{3}})$, d'axe focal $(\Omega, \vec{j})$.

Exercice 3.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$

1. Déterminer l'ensemble $(\mathcal{E})$ des points M de plan complexe dont l'affixe z vérifie $10z\bar{z} + 3(z^2 + \bar{z}^2) = 4$. Indiquer ses foyers F et F' ainsi que que ses directrices.
2. Soit f la composée de l'homothétie de centre O et de rapport 2 et de la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$. Déterminer une équation de $(E') = f(E)$.
3. Montrer que (E') est une ellipse de foyer $f(F)$ et $f(F')$. Comparer les excentricités de (E) et (E') .
4. Construire (E) et (E') dans le même repère.

Solution :

1. On vérifie aisément que : $10z\bar{z} + 3(z^2 + \bar{z}^2) = 4 \Leftrightarrow 4x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{(\frac{1}{2})^2} + y^2 = 1$.
 (E) est l'ellipse de centre O , de grand axe $(O, \vec{j})$ et de petit axe $(O, \vec{i})$. $b = 1$ $a = \frac{1}{2}$, $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $F(\frac{0}{\frac{\sqrt{3}}{2}})$ et $F'(\frac{0}{-\frac{\sqrt{3}}{2}})$. Les directrices ont pour équations : $(\mathcal{D}) : y = \frac{b^2}{c} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $(\mathcal{D}) : y = -\frac{b^2}{c} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
2. $f = hor \Leftrightarrow z' = 2e^{i\frac{\pi}{4}}z \Leftrightarrow z = \frac{1}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}z'$. Ensuite $\bar{z} = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\bar{z}'$ On remplaçons ensuite dans l'expression de départ et on a :

$$(E') : 10\left(\frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}z' \frac{1}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}\bar{z}'\right) + 3\left(\frac{1}{4}e^{-i\frac{\pi}{2}}z'^2 + \frac{1}{4}e^{i\frac{\pi}{2}}\bar{z}'^2\right) = 4$$

$$c'est\text{-à-dire } (E') : \frac{5}{2}z'\bar{z}' + \frac{3}{4}i(z'^2 - \bar{z}'^2) = 4$$

$$\text{finalement on a : } (E') : 5x^2 + 6xy + 5y^2 = 8$$

3. C'est une conséquence des transformations du plan, elles conservent les configurations. Si e' est l'excentricité de (E') , alors $e' = e$. En effet on a $a' = 2a$ et $c' = 2c$ donc $e' = \frac{c'}{a'} = \frac{2c}{2a} = e$;
4. **Construction de (E) et (E')**

CHAPITRE 15 : LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

I-OBJECTIFS

- Résoudre à la main les équations différentielles linéaires du premier ordre ;
- Résoudre à la main les équations différentielles linéaires du second ordre.

II- ACTIVITES PREPARATOIRES

Activité 1 : On donne $f(x) = 2e^{-3x}$ $g(x) = -5e^{2x} + 3e^{-2x}$. Etablir une relation entre f' et f ; g'' et g .

Solution

$$\begin{aligned} \bullet f(x) = 2e^{-3x} &\Rightarrow f'(x) = -6e^{-3x} = -3(2e^{-3x}) = -3f(x) \\ f' = -3f &\Rightarrow f' + 3f = 0 \\ \bullet g(x) = -5e^{2x} + 3e^{-2x} &\Rightarrow g'(x) = -10e^{2x} - 6e^{-2x} \text{ ainsi, } g''(x) = -20e^{2x} + 12e^{-2x} \\ &= 4(-5e^{2x} + 3e^{-2x}) \\ &= 4g(x) \end{aligned}$$

$$\text{Alors: } g''(x) = 4g(x) \Rightarrow g''(x) - 4g(x) = 0$$

2) La fonction usuelle : $x \mapsto e^x$ est solution de (E).

Activité 2 : on considère l'égalité suivante (E) : $y'(x) = y(x)$. On pourra écrire cette équation sous la forme : $y' = y$. (l'inconnue est ici la fonction y)

- 1) Déterminer une fonction constante y qui vérifie l'équation (E).
- 2) Déterminer parmi les fonctions connues, une fonction non constante solution de (E).
- 3) Calculer la dérivée de la fonction $g : x \mapsto y e^{-x}$
- 4) Vérifier que l'équation (E) est équivalente à : $y' e^{-x} - y e^{-x} = 0$, ou encore à $(y e^{-x})' = 0$. En déduire que si y est solution de (E), alors la fonction g est constante. Donner alors toutes les solutions de (E).

Solution

- 1) En posant $y = k$ et en remplaçant dans l'équation il vient $k = 0$, la fonction nulle est donc solution de (E).
- 2) La fonction usuelle : $x \mapsto e^x$ est solution de (E).
- 3) On trouve $g'(x) = y' e^{-x} - y e^{-x}$.
- 4) En utilisant les résultats précédents, on a : $y' = y \Leftrightarrow y' - y = 0 \Leftrightarrow y' e^{-x} - y e^{-x} = 0 \Leftrightarrow (y e^{-x})' = 0$. La fonction g a donc une dérivée nulle, elle est donc constante. On aboutit donc à $y e^{-x} = C$ donc à $y = C e^x$, où C est une constante réelle.

L'ensemble des solutions de (E) est donc l'ensemble des fonctions de la forme : $x \mapsto C e^x$, où C est une constante réelle.

Activité 3 : on considère la fonction f définie pour tout x réel par : $f(x) = 3 e^{2x} - x^2 + 1$.

1) trouver deux nombres réels a et b tels que la fonction f soit une solution particulière de l'égalité (E): $ay' + b \cdot y = -2x^2 + 2x + 2$.

2) en remplaçant a et b par les valeurs trouvées dans la question précédente, trouver une fonction polynôme du second degré solution de (E).

Solution

1) on a $f'(x) = 6e^{2x} - 2x$, en remplaçant dans l'égalité, il vient : $(6a + 3b)e^{2x} - bx^2 - 2ax + b = -2x^2 + 2x + 2$, par identification on aboutit au système :

$$\begin{cases} 6a + 3b = 0 & \text{qui a pour solution : } a = -1 \text{ et } b = 2. \\ -b = -2 \\ -2a = 2 \end{cases}$$

L'expression cherchée est donc (E) : $-y' + 2 \cdot y = -2x^2 + 2x + 2$

2) on cherche alors une fonction g telle que $g(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ solution particulière de (E). On a $g'(x) = 2\alpha x + \beta$, en remplaçant dans (E) il vient : $2\alpha x^2 + (2\beta - 2\alpha)x + (-\beta + 2\gamma) = -2x^2 + 2x + 2$ ce qui conduit au système de trois équations à trois inconnues suivant :

$$\begin{cases} 2\alpha = -2 \\ 2\beta - 2\alpha = 2 \\ -\beta + 2\gamma = 2 \end{cases} \text{ qui admet le triplet } (-1, 0, 1) \text{ pour solution.}$$

La fonction cherchée g , solution particulière de (E), est définie par $g(x) = -x^2 + 1$.

Activité 4 : On considère l'égalité suivante $(E_1) : y''(x) - y(x) = 0$ (l'inconnue est ici la fonction y)

1) Déterminer, parmi les fonctions connues, une fonction f non constante solution de (E_1) .

2) Vérifier que la fonction g définie par $g(x) = e^{-x}$ est une autre solution de (E_1) .

3) Vérifier que toute fonction de la forme $C_1 f(x) + C_2 g(x)$ est solution de (E) (C_1 et C_2 désignent des constantes réelles).

Solution

1) $f(x) = e^x$.

2) $g(x) = e^{-x}$, $g'(x) = g(x) = e^{-x}$, $g''(x) = g(x) = e^{-x}$,. On a alors $g''(x) - g(x) = 0$.

3) $(C_1 f''(x) + C_2 g''(x)) - (C_1 f(x) + C_2 g(x)) = (e^x - g(x) = e^{-x},) - (e^x - g(x) = e^{-x},) = 0$.

Activité 5 : On considère l'équation $(E_2) : y'' - 5y' + 6y = 0$

Afin de chercher des solutions de (E_2) , on pose $y = e^{rx}$, où r désigne un nombre réel.

1) Établir que si $y = e^{rx}$ est solution de (E_2) , alors on a : $r^2 - 5r + 6 = 0$.

2) Résoudre l'équation d'inconnue r précédente, on appellera r_1 et r_2 ses solutions.

3) Vérifier que les fonctions $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ sont des solutions de (E_2) , C_1 et C_2 désignant des constantes réelles.

Solution

1) Si $y = e^{rx}$, on a alors, $y' = r e^{rx}$, $y'' = r^2 e^{rx}$.

Donc $y'' - 5y' + 6y = (r^2 e^{rx} - 5 r e^{rx} + 6 e^{rx}) = e^{rx}(r^2 - 5r + 6) = 0$, or $e^{rx} \neq 0$, ce qui conduit à : $r^2 - 5r + 6 = 0$.

2) L'équation : $r^2 - 5r + 6 = 0$ admet deux solutions réelles qui sont $r_1 = 2$ et $r_2 = 3$.

3) On pose $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$, en remplaçant dans l'équation (E₂) il vient :

$$(4C_1 e^{2x} + 9C_2 e^{3x}) - 5(2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x}) + 6(C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}) = (4 - 10 + 6) C_1 e^{2x} + (9 - 15 + 6) C_2 e^{3x} = 0.$$

III-GENERALITES

- Une **équation différentielle** est une relation entre une ou plusieurs fonctions inconnues et leurs dérivées. En d'autres termes c'est une relation entre une fonction et ses dérivées successives.
- L'**ordre** d'une équation différentielle est celui de la dérivée d'ordre le plus élevé apparaissant dans l'équation. **Exemples:**

$$y' = 2y$$

$$y^{(4)} + 3y'' - y' = y + 2x$$

$$y'' + 4y = 0$$

$$y'' = x^2$$

$$y = 4y''$$

$$y' = y + 2$$

- **Résoudre** une équation différentielle, c'est déterminer toutes les fonctions qui vérifient cette équation.
- **La solution générale** de l'équation différentielle est la formule générale qui représente ces solutions.

Exemple :

$$y' = x \text{ a pour solution générale } y = \frac{x^2}{2} + c$$

Remarques :

- Quand on connaît les primitives d'une fonction $f(x)$, on sait résoudre l'équation différentielle suivante:
 $y' = f(x)$
- De même $y'' = f(x)$ (ou $y^{(n)} = f(x)$) peut être résolue si on sait remonter à la primitive seconde (ou n^{ème}) de $f(x)$.

IV-EQUATIONS DIFFERENTIELLES LINEAIRES DU PREMIER ORDRE**1. Définition**

On appelle équation différentielle du premier ordre à coefficients constants toute équation (E) de la forme :

$ay' + by = f(x)$ où a et b sont des nombres réels ($a \neq 0$), y et f sont des fonctions numériques de variable réelle x . L'équation : $ay' + by = 0$ est l'équation sans second membre associée à l'équation (E).

Remarques : l'inconnue de cette équation est la fonction y .

Une solution particulière de l'équation est une fonction g qui vérifie l'équation.

La solution générale de (E) est formée par l'ensemble de toutes les fonctions solutions de (E).

2. Équation $y' = ay$ (a réel quelconque)

La solution générale de l'équation $y' = ay$ est la fonction **$y = k e^{ax}$** où k est une constante quelconque.

Remarque : on peut prouver que c'est l'unique forme possible de la solution générale, mais on l'admettra seulement ici.

Applications immédiates

Trouver la S.G. de l'équation différentielle dans les cas suivants :

a) $y' = 3y$

b) $y' + 2y = 0$

c) $2y' - y = 0$

d) $3y' = 2y$

NB :

Dans la pratique, on est confronté à des équations différentielles en physique (mécanique, électricité...), mais on veut trouver une solution unique, celle qui correspond à un problème précis.

C'est possible si on connaît les "**conditions initiales**", c'est à dire la valeur de y pour un x particulier (en général pour $x = 0$).

Théorème :

L'équation différentielle $y' = ay$ admet une unique solution prenant la valeur y_0 en

Exemples :

Trouver la solution particulière dans les cas suivants : a) $y' = 5y$ avec $y(0) = 7$; b) $y' + 2y = 0$ avec $y(1) = e$;

c) $u(t) + 2 \cdot 10^{-3} u'(t) = 0$ avec $u(0) = 10$; d) $3y' = 2y$ avec $y(0) = 9$

3. Résolution de l'équation sans second membre : $(E_0) : ay' + by = 0$

Théorème : L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $(E_0) : ay' + by = 0$, est l'ensemble des fonctions de la forme $y = Ce^{-\frac{b}{a}x}$ où C est une constante

4. Résolution de l'équation complète $(E) : ay' + by = f(x)$

Théorème : La solution générale de l'équation différentielle $(E) : ay' + by = f(x)$ s'obtient en ajoutant à la solution générale de l'équation sans second membre $ay' + by = 0$ une solution particulière de (E) .

Remarque : la recherche de la solution particulière s'effectue à la main dans les cas simples, en s'aidant le plus souvent des conseils donnés dans l'énoncé.

V- EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINEAIRES DU SECOND ORDRE**1. Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants****a. Définition**

On appelle équation différentielle du second ordre linéaire à coefficients constants toute équation (E) de la forme : $ay'' + by' + cy = f(x)$, où a , b et c sont des nombres réels ($a \neq 0$), y et f sont des fonctions

numériques de variable réelle x . L'équation : $ay'' + by' + cy = 0$ est l'équation sans second membre associée à l'équation (E).

b. Résolution de l'équation sans second membre : $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$

On dit que deux fonctions y_1 et y_2 sont linéairement indépendantes si aucune n'est le produit de l'autre par une constante.

Justifier que les fonctions $y_1 = \sin(x)$ et $y_2 = \cos(x)$ sont linéairement indépendantes.

On peut, par exemple, calculer le rapport $\frac{y_1}{y_2} = \tan x$ qui n'est pas constant.

Les fonctions $y_1 = x^2$ et $y_2 = -2x^2$ ne sont pas linéairement indépendantes car on a pour tout x réel, $y_2 = -2y_1$.

Nous admettrons le théorème suivant :

Théorème : Si on connaît deux fonctions y_1 et y_2 linéairement indépendantes, solutions de l'équation différentielle $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$, alors l'ensemble des solutions de (E_0) est formé par les fonctions de la forme $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$, où C_1 et C_2 désignent des constantes réelles.

On peut commencer par vérifier que si y_1 et y_2 sont toutes deux solutions de (E_0) , alors toute combinaison linéaire de y_1 et y_2 est aussi solution de (E_0) et admettre seulement la réciproque.

On se propose de chercher les fonctions y_1 et y_2 sous la forme $y = e^{rx}$, où r est un nombre constant.

Question : Démontrer que $y = e^{rx}$ est solution de l'équation (E_0) si et seulement si r est solution de **l'équation caractéristique**: $ar^2 + br + c = 0$.

Il suffit de calculer y' et y'' et de remplacer dans (E_0) .

Définition : On appelle équation caractéristique de l'équation différentielle $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$, l'équation du second degré d'inconnue r : $ar^2 + br + c = 0$.

Résolution de l'équation caractéristique

1^{er} cas : on suppose $\Delta = b^2 - 4ac > 0$

Question 1 : Donner dans ce cas les solutions de l'équation caractéristique.

Question 2 : En déduire deux solutions particulières y_1 et y_2 de l'équation (E_0) .

Question 3 : Justifier que les solutions trouvées y_1 et y_2 sont linéairement indépendantes.

Question 4 : Donner la solution générale de l'équation (E_0) .

Réponses :

Question 1 : L'équation caractéristique a deux solutions réelles distinctes : $r_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$; $r_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

Question 2 : Les fonctions $y_1 = e^{r_1 x}$ et $y_2 = e^{r_2 x}$ sont deux solutions de (E_0) .

Question 3 : On calcule le quotient des solutions qui donne $e^{(r_1-r_2)x}$ qui n'est pas constant car r_1 et r_2 sont distinctes.

Question 4 : La solution générale de (E₀) peut s'écrire : $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques.

2^e cas : on suppose $\Delta = b^2 - 4ac = 0$

Question 1 : Etablir que dans ce cas, les fonctions $y_1 = e^{-\frac{b}{2a}x}$ et $y_2 = x e^{-\frac{b}{2a}x}$ sont deux solutions de l'équation (E₀) et qu'elles sont linéairement indépendantes.

Question 2 : Donner la solution générale de l'équation (E₀).

La solution générale de l'équation différentielle (E₀) est $y = (C_1 x + C_2) e^{-\frac{b}{2a}x}$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques

3^e cas : on suppose $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

Question 1 : Donner dans ce cas les solutions de l'équation caractéristique.

On trouve deux solutions complexes conjuguées : $r_1 = \alpha + \beta i$, $r_2 = \alpha - \beta i$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Question 2 : On pose $y_1 = e^{-\frac{b}{2a}x} \cos\left(\frac{\sqrt{-b^2+4ac}}{2a}x\right)$ et $y_2 = e^{-\frac{b}{2a}x} \sin\left(\frac{\sqrt{-b^2+4ac}}{2a}x\right)$

Vérifier que les fonctions y_1 et y_2 sont solutions de l'équation (E₀).

Question 3 : Justifier que les solutions y_1 et y_2 sont linéairement indépendantes. On peut par exemple, calculer le quotient $\frac{y_2}{y_1} = \tan\left(\frac{\sqrt{-b^2+4ac}}{2a}x\right)$ qui n'est pas constant car $b^2 - 4ac < 0$ est donc non nul.

Question 4 : Donner la solution générale de l'équation (E₀).

La solution générale de l'équation différentielle (E₀) est $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$, C_1 et C_2 sont des constantes réelles quelconques avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Résumé : Pour trouver la solution générale de l'équation différentielle (E₀) : $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$,

	Solutions de l'équation caractéristique	Solution générale de l'équation différentielle (E ₀)
$\Delta > 0$	2 solutions réelles distinctes r_1 et r_2 : $r_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$; $r_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques
$\Delta = 0$	1 solution réelle double $r_1 = r_2 = -\frac{b}{2a}$	$y = (C_1 x + C_2) e^{-\frac{b}{2a}x}$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques

on écrit l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ et on calcule son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

$\Delta < 0$	2 solutions complexes conjuguées : $r_1 = \alpha + \beta i, r_2 = \alpha - \beta i$ avec : $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques
--------------	--	--

2.

Résolution de l'équation complète (E) : $ay'' + by' + cy = f(x)$

Soit y_0 une solution particulière de l'équation (E), on a alors : $ay_0'' + by_0' + cy_0 = f(x)$.

Une fonction y est solution de l'équation (E) si et seulement si $ay'' + by' + cy = f(x)$ ou encore si et seulement si on a : $ay'' + by' + cy = ay_0'' + by_0' + cy_0$ soit $a(y'' - y_0'') + b(y' - y_0') + c(y - y_0) = 0$.

Cette équation différentielle est une équation différentielle du second ordre sans second membre dont la solution générale est donnée dans le résumé ci-dessus.

On trouve donc la solution générale de l'équation (E) en ajoutant à la solution générale de (E₀) une solution particulière y_0 de (E), comme pour les équations différentielles linéaires du premier ordre.

Théorème : La solution générale de l'équation différentielle (E) : $ay'' + by' + cy = f(x)$ s'obtient en ajoutant à la solution générale de l'équation sans second membre $ay'' + by' + cy = 0$ une solution particulière de (E).

Exercice d'application :

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + y' - 2y = 2x^2 - 2x + 4$.

- 1) Donner, à la main en détaillant les calculs, la solution générale de l'équation : $y'' + y' - 2y = 0$.
- 2) Déterminer à la main, une solution particulière de (E) sous la forme $y = ax^2 + bx + c$.
- 3) Dédurre de ce qui précède la solution générale de (E).

Solution :

- 1) L'équation caractéristique est : $r^2 + r - 2 = 0$ qui admet deux solutions réelles $r_1 = 1$ et $r_2 = -2$.
La solution générale de l'équation $y'' + y' - 2y = 0$ est donc $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques.

- 2) On pose $y = ax^2 + bx + c$, on a $y' = 2ax + b$ et $y'' = 2a$.

En remplaçant dans l'équation (E) : $y'' + y' - 2y = 2x^2 - 2x + 4$, on obtient : $-2ax^2 + (2a - 2b)x + 2a + b - 2c = 2x^2 - 2x + 4$.

Par identification des coefficients, on aboutit au système d'équations
$$\begin{cases} -2a = 2 \\ 2a - 2b = -2 \\ 2a + b - 2c = 4 \end{cases}$$
 qui a pour solutions :

$a = -1, b = 0, c = -3$.

La solution particulière cherchée est donc $f : x \mapsto -x^2 - 3$

- 3) La solution générale de (E) est donnée par $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} - x^2 - 3$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques.

3. Existence et unicité de la solution vérifiant des conditions initiales particulières données**Exercice**

On considère l'équation différentielle (E) $y'' + 4y' + 4y = 3e^x$.

1) Donner à la main la solution générale de l'équation sans second membre associée.

2) Chercher à la main une solution particulière f de (E) en posant $f(x) = ke^x$ (k est un nombre réel).

3) En déduire la solution générale de (E).

4) On cherche dans cette question à trouver toutes les fonctions g solutions de (E) dont la courbe représentative admet pour tangente en son point d'abscisse 0 la droite d'équation $y = -\frac{17}{3}x + \frac{10}{3}$.
Déduire de cette information la valeur des réels $g(0)$ et $g'(0)$.

5) En déduire qu'il existe une et une seule fonction g vérifiant les deux conditions précédentes.

Solution :

1) L'équation caractéristique est : $r^2 + 4r + 4 = 0$ qui admet une solution réelle double $r_1 = r_2 = -2$.
La solution générale de l'équation $y'' + 4y' + 4y = 0$ est donc $y = (C_1x + C_2)e^{-2x}$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques.

2) On pose $f(x) = ke^x$, on a $f'(x) = ke^x$ et $f''(x) = ke^x$. En remplaçant dans l'équation (E), on obtient $9ke^x = 3e^x$.
La solution particulière cherchée est donc $f : x \mapsto \frac{1}{3}e^x$

3) La solution générale de (E) est donnée par $y = (C_1x + C_2)e^{-2x} + \frac{1}{3}e^x$, C_1 et C_2 constantes réelles quelconques.

4) La tangente et la courbe ont en commun le point d'abscisse 0 qui a pour ordonnée $y = -\frac{17}{3}(0) +$

$\frac{10}{3}$ soit $y = \frac{10}{3}$. On en tire donc la 1ère information $g(0) = \frac{10}{3}$.

Le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0 est $-\frac{17}{3}$. On en déduit la seconde information

:
 $g'(0) = -\frac{17}{3}$.

5) On utilise les deux informations précédentes en remplaçant dans la solution générale de l'équation (E).
On a $y = (C_1x + C_2)e^{-2x} + \frac{1}{3}e^x$ qui permet d'écrire $g(0) = C_2 + \frac{1}{3}$ d'où l'on tire l'équation (1) d'inconnue C_2 :

$$(1) : C_2 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}.$$

On calcule maintenant y' . On a $y' = C_1 e^{-2x} + (C_1x + C_2)(-2e^{-2x}) + \frac{1}{3}e^x$. Sachant que $g'(0) = -\frac{17}{3}$, on en tire

$$\text{l'équation (2) : } C_1 - 2C_2 + \frac{1}{3} = -\frac{17}{3}.$$

Il reste à résoudre le système d'équations formé par les équations (1) et (2) qui conduit à $C_1 = 0$ et $C_2 = 3$. On en déduit qu'il existe une unique solution g vérifiant les deux conditions $g(0) = \frac{10}{3}$ et

$g'(0) = -\frac{17}{3}$, la fonction g définie pour tout x réel par : $g(x) = 3e^{-2x} + \frac{1}{3}e^x$.

Une vérification est possible à l'aide de la calculatrice comme le montrent les écrans ci-dessous.

4. Cas général

Les deux conditions initiales vérifiées par une solution particulière f d'une équation différentielle sont en général de la forme : $f(x_0) = d$ et $f'(x_0) = d'$, ou bien $f(x_0) = d$ et $f(x_1) = d'$, où x_0, x_1, d et d' sont des nombres connus.

Nous admettrons le théorème suivant :

Théorème : Pour toute équation différentielle du second ordre, il existe une et une seule solution qui vérifie deux conditions initiales données.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

Activité 1 :

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $y' + 2y = x^2$ (E1)
2. $y' + y = 2\sin x$ (E2)
3. $y' - y = (x + 1)e^x$ (E3)
4. $y' + y = xe^x + \cos x$ (E4)

Activité 2 :

1. Déterminer toutes les fonctions $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$, dérivables, telles que $\forall x \in [0; 1], f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$
2. Résoudre l'équation différentielle $(x^2 + 1)y' + 2xy = 3x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$. Trouver la solution vérifiant $y(0) = 3$.
3. Résoudre l'équation différentielle $y'\sin x - y\cos x + 1 = 0$ sur $]0; \pi[$. Trouver la solution vérifiant $y(\pi/4) = 1$.

Activité 3:

Soit λ un réel non nul, on s'intéresse aux solutions de l'équation différentielle : $y'(x) - \lambda y(x) = f(x)$ avec $f(x)$ une fonction particulière. Déterminer l'expression de la solution générale lorsque :

1. $f(x) = a$ avec $a \in \mathbb{R}^*$
2. $f(x) = \alpha e^{\omega x}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et $\omega \in \mathbb{R}^*$

3. $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$ (Indication : chercher la solution particulière sous la forme $y_0(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$)

Activité 4 :

1. $y'' - 3y' + 2y = 0$

2. $y'' + 2y' + 2y = 0$

3. $y'' - 2y' + y = 0$

4. $y'' + y = 2\cos^2 x$

Activité 5 :

1. On considère $y'' - 4y' + 4y = d(x)$. Résoudre l'équation homogène, puis trouver une solution particulière lorsque $d(x) = e^{-2x}$, puis $d(x) = e^{2x}$.

2. Résoudre sur $]0; \pi[$ l'équation différentielle $y'' + y = \cotan x$, où $\cotan x = \frac{\cos x}{\sin x}$.

3. Résoudre les équations différentielles suivantes à l'aide du changement de variable suggéré.

a. $x^2 y'' + xy' + y = 0$, sur $]0; +\infty[$, en posant $x = e^t$;

b. $(1 + x^2)2y'' + 2x(1 + x^2)y' + my = 0$, sur $\mathbb{R}$, en posant $x = \tan t$ (en fonction de $m \in \mathbb{R}$).

Activité 6 :

On considère y la fonction définie sur $\mathbb{R}$, de la variable x , dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifiant l'équation différentielle (E) : $9y''(x) - y(x) = 4$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $9y''(x) - y(x) = 0$

2. déterminer la solution particulière h de (E) sous la forme d'une constante

3. En déduire les solutions générales de (E).

4. Déterminer la fonction y solution de (E) vérifiant $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.

Activité 7 :

On considère y la fonction définie sur $\mathbb{R}$, de la variable t , dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifiant l'équation différentielle (E) : $y''(t) + 2y'(t) = (4 + 3t)e^t$

1. Résoudre l'équation différentielle $y''(t) + 2y'(t) = 0$ (E')

2. Déterminer le réel A tel que $f(t) = Ate^t$ soit une solution particulière de (E)

3. En déduire les solutions générales de (E).

Activité 8 :

On considère x la fonction définie sur $\mathbb{R}$, de la variable t , dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifiant l'équation différentielle (E) : $x''(t) + 4x(t) = -6 \sin(t)$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $x''(t) + 4x(t) = 0$

2. Déterminer les réels A et B tel que la solution particulière g de (E) s'écrive sous la forme :
 $g(t) = A \cos(t) + B \sin(t)$
3. En déduire les solutions générales de (E).
4. Déterminer la fonction x , solution de (E), vérifiant $x(0) = -1$ et $x'(0) = 0$

Activité 9 :

Une voiture de masse m roulant rectilignement à la vitesse v_0 coupe son moteur et n'est plus soumise qu'à une force de frottement proportionnelle à la vitesse : $F = -\alpha v$. Écrire la loi de la variation de la vitesse v en fonction du temps et en déduire l'équation du mouvement.

Activité 10 :

On suppose qu'à sa mort, un organisme contient une quantité q_0 d'atomes de carbone 14. Les atomes de carbone 14 vont subir des désintégrations radioactives. Le nombre de désintégrations N par unité de temps est proportionnel à la quantité q d'atomes de carbone 14 présents : $N = \alpha q$

1. Déterminer une équation régissant l'évolution de q , et la résoudre.
2. Déterminer α , sachant que la période de demi-vie (temps pendant lequel la moitié du carbone 14 présent se désintègre) est de 5730 ans.
3. On trouve un bois fossile qui subit 610 désintégrations par jour. Le même type de bois subit un taux initial de 19520 désintégrations par jour. Déterminer l'âge du fossile.
4. Sachant que le carbone 14 est absorbé par les organismes vivants par la respiration du CO_2 présent dans l'atmosphère, et que le taux de CO_2 actuel est le plus élevé depuis 800000 ans, pouvez-vous expliquer l'erreur commise dans le calcul de la question 3 ?

Les Grands profs de Maths

Mathématiques
Terminales scientifiques C, D & E
Support de Cours sur les Probabilités.

8 août 2018

Table des matières

1	Les probabilités.	1
1.1	Les outils de dénombrement	1
1.1.1	Notion d'ensemble fini.	1
1.1.2	Les différents types de dénombrement.	2
1.2	Calcul des probabilités	5
1.2.1	Langage des probabilités.	5
1.2.2	Probabilités sur un ensemble fini.	6
1.3	Variables aléatoires	7
1.3.1	Caractéristiques d'une variable aléatoire.	8
1.3.2	Propriétés d'une variable aléatoire.	8
1.4	Conditionnement (pas au programme en Tle C)	8
1.4.1	Arbres pondérés.	8
1.4.2	Probabilité conditionnelle.	8
1.4.3	Formule de Bayes (complément de cours, pas au programme)	9
1.5	Indépendance	10
1.5.1	Événements indépendants.	10
1.5.2	Indépendance de deux variables aléatoires.	10
1.5.3	Probabilités totales.	11
1.6	Lois de probabilités	11
1.6.1	Loi de Bernoulli.	11
1.6.2	Loi Binomiale.	12
1.7	Fonction de repartition	12

LES PROBABILITÉS.

Objectifs pédagogiques opérationnels :

- A la fin de ce chapitre l'élève doit être capable de :
- ↪ se familiariser avec les outils de dénombrement vu en classe de Première.
 - ↪ calculer une probabilité ;
 - ↪ reconnaître deux événements indépendants ;
 - ↪ savoir utiliser un schéma de Bernoulli et la loi binomiale.
 - ↪ calculer la probabilité conditionnelle.
 - ↪ déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle, ses caractéristiques (variance, écart-type, espérance mathématique) et sa fonction de répartition.
 - ↪ Faire le lien entre les probabilités, les statistiques et certaines situations de la vie courante.

1.1 Les outils de dénombrement

1.1.1 Notion d'ensemble fini.

Définition 1.1. Soit E un ensemble non vide fini, A et B deux parties de E . (**NB** : faire un schéma pour faciliter la compréhension par des apprenants) :

- On appelle **reunion de A et B** , noté $A \cup B$ l'ensemble $A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- On appelle **intersection de A et B** l'ensemble noté $A \cap B = \{x \in E : x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- On appelle **différence de A et B** , l'ensemble des éléments de E appartenant à A et n'appartenant pas à B . On note $A - B$ et se lit " A moins B ".

$$A - B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \notin B\} = A \cap \mathbb{C}_A^B$$

- On appelle **complémentaire** de A dans E , l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A . On le note $\bar{A} = \mathbb{C}_E^A = \{x \in E / x \notin A\}$.
- On appelle **différence symétrique** de A et B , l'ensemble noté $A \Delta B = A \cup B - A \cap B = (A - B) \cup (B - A)$.
- A et B sont **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.
- Le **cardinal** de A est le nombre d'éléments de A . On le note $\text{card}(A)$

Propriété 1.1. Soit E un ensemble fini, A et B deux parties de E , alors :

- $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$.
- $\text{card}(A - B) = \text{card}(A) - \text{card}(A \cap B)$;
- $\text{card}(\bar{A}) = \text{card}(E) - \text{card}(A)$

Par **convention** $\text{card}(\emptyset) = 0$.

TAF : Montrer que $\text{card}(A \cup B \cup C) = \text{card}(A) + \text{card}(B) + \text{card}(C) - \text{card}(A \cap B) - \text{card}(A \cap C) - \text{card}(B \cap C) + \text{card}(A \cap B \cap C)$.

Exemple 1.1. Dans une classe de 54 élèves, les élèves pratiquent au moins le football ou le basketball. 40 pratiquent le football et 30 le basketball.

1. Quel est le nombre d'élèves qui pratiquent à la fois les deux sports.
2. Quel le nombre d'élèves qui pratiquent uniquement le football ? uniquement le basketball ?

Solution

Désignons par A et B l'ensemble des élèves qui pratiquent le football et le basketball respectivement (**faire le schéma pour illustrer**).

- $\text{card}(A \cap B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cup B) = 40 + 20 - 54 = 16$
- Le nombre d'élèves qui pratiquent uniquement le foot est $\text{card}(A - B) = \text{card}(A) - \text{card}(A \cap B) = 40 - 16 = 24$
Le nombre d'élèves qui pratiquent uniquement le basket est $\text{card}(B - A) = \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) = 30 - 16 = 14$

Exercice 1.1.1. Dans un établissement scolaire de 1500 élèves, 3 activités sportives sont proposées : le football, le handball et le tennis.

580 élèves pratiquent le football, 490 le handball et 450 le tennis.

250 pratiquent à la fois le football et le handball, 210 pratiquent à la fois le football et le tennis, 180 pratiquent à la fois le tennis et le handball et 150 pratiquent à la fois les trois sports.

- Déterminer le nombre d'élèves qui pratiquent un seul sport.
- Déterminer le nombre d'élèves qui pratiquent au moins un sport.
- Déterminer le nombre d'élèves qui ne pratiquent aucun sport.

Définition 1.2. (Partition d'un ensemble)

Soit E un ensemble non vide, $A_1, A_2, \dots, A_n$ une suite de parties de E . On dit que la famille $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ forme une partition de E si et seulement si :

- $\forall i = 1, \dots, n; A_i \neq \emptyset$;
- $\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$; (les A_i sont deux à deux disjoints)
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$;

Remarque 1.1. Dans ce cas, $\text{card}(E) = \text{card}(A_1) + \dots + \text{card}(A_n)$.

Exemple 1.2. Soit E l'ensemble des chiffres de la numération hexadécimale. Ecrire les éléments de E et déterminer une partition de E . (évident)

Définition 1.3. (Produit Cartésien)

Soit E et F deux ensembles finis non vides.

• Le **produit cartésien** de E par F est l'ensemble des couples (a, b) tels $a \in E$ et $b \in F$. On note $E \times F$ et on lit "**E croix F**".

Plus généralement, le produit cartésien de p ensembles $E_1, \dots, E_p$ est l'ensemble des éléments $(x_1, \dots, x_p)$ tels que $x_1 \in E_1, \dots, x_p \in E_p$. On note $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$.

- Un élément du produit cartésien de p ensembles ($p \geq 2$) est appelé **p-uplet** ou **p-liste**.

Remarque 1.2. Pour tous ensembles finis, $E_1, \dots, E_p$, on a $\text{card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \text{card}(E_1) \times \dots \times \text{card}(E_p)$.

Exercice 1.1.2. 1. Le jour du baccalauréat, un candidat doit choisir un stylo, un crayon ordinaire et une règle graduée. On met à sa disposition 6 stylos, 4 crayons ordinaires et 5 règles graduées. Combien de choix distincts peut-il ainsi effectuer? (**Rep** : $6 \times 5 \times 4 = 120$)

- On lance un dé blanc et un dé bleu, chacun d'eux ayant 6 faces numérotées de 1 à 6. Le résultat d'un lancer est le couple des nombres apparaissant sur la face supérieure de chaque dé.
 - Déterminer le nombre de résultats possibles. (**Rep** : $6 \times 6 = 36$)
 - Déterminer le nombre de résultats pour lequel la différence de la valeur absolue des deux nombres est ≤ 3 . (**Ind** : On pourrait utiliser le tableau pour dénombrer)

1.1.2 Les différents types de dénombrement.

A) Les p-listes ou p-uplets

Définition 1.4. Soit E un ensemble et p un entier $p \geq 2$. On appelle **p-uplet** ou **p-liste** tout élément du produit cartésien $E^p = \underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \text{ fois}}$.

Propriété 1.2. ;

■ Soit E un ensemble fini à n éléments; soit $p \in \mathbb{N}^*$. Le cardinal de l'ensemble des p -listes de E est n^p . Ainsi $\text{card}(E^p) = [\text{card}(E)]^p = n^p$.

■ Le nombre d'application d'un ensemble E à p éléments vers un ensemble F à n éléments est $[\text{card}(F)]^{\text{card}(E)} = n^p$.

Remarque 1.3. Une p -liste correspond à un choix ordonné de p éléments distincts ou non (un ou plusieurs éléments peuvent être répétés). On les utilise aussi dans les tirages successifs avec remise.

- Exemple 1.3.**
1. Combien existe-il de nombre entier naturel de 4 chiffres tous les chiffres étant impaires. (**Rep** : 5^4)
 2. Déterminer le nombre de numéro de téléphone de 7 chiffres que l'on peut avoir. (**Rep** : 10^7)
 3. De combien de façon différentes peut-on ranger 20 dans une bibliothèque comportant 5 étagères. (**Rep** : 5^{20})
 4. Déterminer le nombre de façons de composer un code de 4 symboles qui sont les lettres de l'alphabet français. (**Rep** : 26^4)

B) Les arrangements

Définition 1.5. Soit E un ensemble à n éléments et $p \leq n$. On appelle **arrangement sans répétition** (ou tout simplement **arrangement**) de p éléments choisis parmi les n que comporte E , toute disposition ordonnée sans répétition de p de ces éléments. On le note A_n^p .

Exemple 1.4. $E = \{1, 2, 3, 4\}$.

$(1, 3, 2), (1, 4, 3), (2, 1, 3)$ sont les arrangements de 3 éléments de E .

$(1, 1, 2), (1, 4, 4)$ et $(3, 3, 3)$ ne sont pas les arrangements de 3 éléments de E . Ce sont des 3-listes.

Remarque 1.4. ► Dans un arrangement, il y'a de l'ordre et on ne repète jamais les éléments ;

- Il n'existe aucun arrangement de p -éléments de E lorsque $p > \text{card}(E)$.
- On les utilise aussi dans les tirages successifs sans remise.
- Un arrangement **avec répétition** est un **p -uplet**.

Propriété 1.3. Soit $n, p \in \mathbb{N}$ tels que $1 \leq p \leq n$.

$$\blacksquare A_n^p = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

► Le nombre d'injections d'un ensemble F à p éléments vers un ensemble E à n éléments est A_n^p .

Exemple 1.5. 1. 8 chevaux prennent le départ d'une course. Combien de tiercés, de quartés et de quintés peut-on former ? (**Rep** : A_8^3 tiercés, A_8^4 quartés et A_8^5 quintés).

2. Une olympiade de maths est organisée avec 50 concurrents et attribue un premier prix, un deuxième prix et un troisième prix.

- (a) Quel est le nombre de résultats possibles sachant qu'il n'y a pas d'ex-aequo ?
- (b) Quel est le nombre de résultats possibles sachant qu'il n'y a deux premiers ex-aequo ?

C) Permutation

Définition 1.6. Soit E un ensemble à p éléments, on appelle **permutation** (ou **permutation sans répétition**) de E toute disposition ordonnée et sans répétition des p éléments de E .

Le nombre de permutation d'un ensemble à n éléments est $P_n = n! = A_n^n$.

Exemple 1.6. Les permutations de $\{a, b, c\}$ sont : $abc, acb, bac, bca, cab, cba$. Elles sont au nombre 6.

Propriété 1.4. Le nombre de bijections d'un ensemble fini E à n éléments dans lui-même est $n!$.

Remarque 1.5. Soit une collection de n éléments formés de v groupes discernables d'éléments indiscernables $\underbrace{a, a, \dots, a}_{\alpha \text{ fois}}, \underbrace{b, b, \dots, b}_{\beta \text{ fois}}, \dots, \underbrace{s, s, \dots, s}_{\lambda \text{ fois}}$ tels que $\alpha + \beta + \dots + \lambda = n$.

On appelle **permutation avec répétition** de ces n éléments, toute disposition ordonnée de l'ensemble des n éléments. On note

$P'_n(\alpha, \beta, \dots, \lambda)$ le nombre de telles permutations. On a

$$P'_n(\alpha, \beta, \dots, \lambda) = \frac{n!}{\alpha! \beta! \dots \lambda!}$$

Exemple 1.7. 1. De combien de façon peut-on ranger 6 livres dans 6 armoires sachant qu'une armoire ne peut contenir qu'un seul livre. (**Rep** : $6!$)

2. Déterminer le nombre d'anagramme du mot "anticonstitutionnellement", "mathématiques".
3. Combien de mots peut-on former en prenant toutes les lettres du mot "coordonner" ?
 (sol : $P'_{10}(3, 2, 2, 1, 1, 1)$) Parmi ces mots, combien
 - (a) incluent les trois lettres "O", l'une à côté de l'autre ?
 - (b) commencent et se terminent par un "n" ?

Indication solution :

3(a) Les trois lettres "O" peuvent être placées l'une à côté de l'autre de 8 de façons. Pour chaque façon, il faut permuter les 7 lettres restantes aux autres positions ; soit $8 \times \frac{7!}{2!2!1!1!1!} = 10080$ mots

3(b) Les lettres "n" étant placées, il reste à permuter le 8 autres lettres dans les autres positions, soit $\frac{8!}{3!2!1!1!1!} = 336$ mots.

D) Les combinaisons

Définition 1.7. Soit E un ensemble à n éléments et $1 \leq p \leq n$.

■ On appelle **combinaison sans répétition** (ou tout simplement **combinaison**) de p éléments choisis parmi les n que comporte E , toute disposition non ordonnée et sans répétition de p éléments choisis parmi les n éléments de l'ensemble.

On note C_n^p le nombre de telles combinaisons et

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)}$$

Les p éléments de la combinaison doivent être distincts et sont choisis parmi les n que comporte E ; donc $p \leq n$.

■ On appelle **combinaison avec répétition** de p éléments choisis parmi les n que comporte E , toute disposition non ordonnée et avec éventuellement répétition de p de éléments choisis parmi les n éléments de l'ensemble.

On le note C_n^{*p} ou K_n^p le nombre de telles combinaisons. Du fait des répétitions éventuelles, on peut avoir $p \geq n$ et $C_n^p \leq C_n^{*p}$.

Le nombre de telles combinaisons

$$C_n^p = P'_{n-1+p}(n-1, p) = \frac{(n-1+p)!}{(n-1)!p!}$$

Propriété 1.5. Soient $n, p \in \mathbb{N}$, $p \leq n$

- ▶ $C_n^p = C_n^{n-p}$;
- ▶ $C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p = C_n^p$ (trinagle de pascal) ; cette relation de récurrence permet de calculer de proche en proche les valeurs de C_n^p (**construire le triangle le pascal pour illustrer**).
- ▶ $(a+b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^p b^{n-p}$.

Démonstration. Exercice

Remarque 1.6. • $C_n^0 = 1, C_n^n = 1$ et $C_n^1 = 1$;

- $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)} = P'_n(n, n-p)$;
- $C_n^{*p} = C_{n+p-1}^p$ (**vérifier en exercice**).

Exercice 1.1.3. On donne $f(x) = (1+x)^n$, $n \geq 2$. Calculer les sommes suivantes

$$A = \sum_{p=0}^n C_n^p \quad B = \sum_{p=0}^n (-1)^p C_n^p \quad C = \sum_{p=0}^n p C_n^p ; \quad D = \sum_{p=0}^n p(-1)^p C_n^p$$

$$E = \sum_{p=0}^{\alpha} C_n^{2p} \quad (\alpha = E(\frac{n}{2}), E \text{ fonction partie entière}) \quad F = \sum_{p=0}^{\beta} C_n^{2p+1}, \quad (\beta = E(\frac{n-1}{2}))$$

$$G = \sum_{p=2}^n p(p-1)C_n^p \quad H = \sum_{p=1}^n p^2 C_n^p \text{ et } C = \sum_{p=0}^n \frac{1}{p+1} C_n^p$$

Exercice 1.1.4. Une commission de 5 membres comprenant 3 économistes et 2 juristes doit être constituée à partir de 13 candidats dont 7 économistes et 6 juristes.

1. De combien de façons différentes cette commission peut-elle être constituée ?
2. Même question, si un économiste nommé désigné parmi les 7 économistes candidats devant absolument faire partie de la commission.
3. Même question, si un des 6 juristes candidats devant absolument être écarté de la commission (mais l'intéressé ne le sait pas).
4. Même question, si un des économistes et un des juristes, tous deux individualisés ne pouvant faire partie de la commission.

Indication solution

1. La commission peut-être constituée de $C_7^3 \cdot C_6^2 = 525$ façons.
2. $C_6^2 \cdot C_6^2 = 225$
3. $C_7^3 \cdot C_5^2 = 350$
4. On peut raisonner de deux façons :
 - Retrancher au nombre total de commissions, celles où les individus qui doivent être écartés figurent ensemble : $C_7^3 \cdot C_6^2 - C_6^2 \cdot C_5^1 = 450$;
 - Compter les commissions où les deux individus ne figurent pas ensemble ; soit $C_6^2 \cdot C_5^2 + C_6^3 \cdot C_5^1 + C_6^3 \cdot C_5^2 = 450$

1.2 Calcul des probabilités

1.2.1 Langage des probabilités.

Activité 1.1. On lance un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note le numéro de la face supérieure qui s'affiche. On considère les ensembles suivants :

A : "Le numéro obtenu est pair" et B : "Le numéro obtenu est impair".

1. Pouvons-nous déterminer avec certitude le numéro de la face supérieure qui doit s'afficher ?
Puisque nous ne pouvons pas dire avec certitude le numéro de la face supérieure qui s'affiche après le lancer du dé, on dit qu'on a réalisé **une expérience aléatoire**.
2. Déterminer l'ensemble Ω des résultats possibles que l'on peut avoir après le lancer.
On appelle Ω **l'univers** associé à cet expérience.
3. Déterminer 2 sous-ensembles Ω à un seul élément, 4 éléments et 6 éléments ; conclure.
4. Déterminer l'intersection des ensembles A et B . Puis conclure.

Ce lancer du dé, le lancer d'une pièce de monnaie ... sont des **expériences aléatoires**, car avant de l'effectuer, on ne peut pas prévoir avec certitude quel en sera le résultat, résultat qui dépend en effet du hasard. A cette expérience aléatoire, on associe l'ensemble des résultats possibles appelé **univers**. Ces différents résultats sont appelés **éventualités** (*issues* ou *possibilités*). Ce sont des éléments de Ω .

Définition 1.8. ♦ Les sous-ensembles de l'univers Ω sont appelés **événements**.

- ♦ Les événements formés d'un seul élément sont appelés **événements élémentaires**.
- ♦ Etant donné un univers Ω , l'événement Ω est **l'événement certain**.
- ♦ L'ensemble vide est **l'événement impossible**.
- ♦ L'événement formé des éventualités qui sont dans A et dans B est noté $A \cap B$ et se lit "A inter B".
- ♦ L'événement formé des éventualités qui sont dans A ou dans B est noté $A \cup B$ et se lit "A union B".
- ♦ Etant donné un univers Ω et un événement A , l'ensemble des éventualités qui ne sont pas dans A constitue un événement appelé **événement contraire** de A , noté $\bar{A}$.
- ♦ A et B sont **incompatibles** si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.

Pour décrire mathématiquement une expérience aléatoire, on choisit un modèle de cette expérience ; pour cela on détermine l'univers et on associe à chaque événement élémentaire un nombre appelé **probabilité**.

Exemple 1.8. On lance un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 4 et noter le numéro de la face supérieure puis considérer les ensembles suivants : A : "Le numéro obtenu est un multiple de 2" et B : "Le numéro obtenu est supérieur à 3".

1. Déterminer l'univers Ω associée à cet épreuve
2. Déterminer tous les événements élémentaires de Ω .
3. Déterminer l'événement contraire de B . A et B sont-ils incompatibles ?

1.2.2 Probabilités sur un ensemble fini.

- Activité 1.2.**
1. On jette une pièce équilibrée, combien avons-nous de chances d'avoir "pile" ?
 2. On lance un dé non truqué; combien avons-nous de chances d'obtenir 2 ? d'avoir un numéro pair ?
 3. Une urne contient 3 boules jaunes et 4 boules rouges indiscernables au toucher. On tire une boule (sans regarder !)
 ▶ Combien avons-nous de chances de tirer une boule jaune ?
 ▶ Combien avons-nous de chances de tirer une boule rouge ?

Solution

Pour la première question, on a une chance sur 2 d'avoir pile. On dit alors que la probabilité d'avoir pile est $1/2$. La probabilité d'un événement est un **nombre** qui traduit la **chance** que l'événement se réalise. Ce nombre peut s'écrire :

- avec une fraction, par exemple $\frac{1}{2}$
- avec un pourcentage, par exemple 50%
- avec un nombre decimal, par exemple 0,5

Définition 1.9. Soit Ω un ensemble fini. On appelle **probabilité** sur Ω l'application de $\mathcal{P}(\Omega)$ (ensemble des parties de Ω) à valeurs dans $[0, 1]$ qui à toute partie A de Ω , associe $p(A)$ vérifiant les conditions suivantes :

- $p(\Omega) = 1$ et $p(\emptyset) = 0$;
- La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Ainsi, si $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ alors :

$$0 \leq p(\{x_i\}) \leq 1 \text{ et } p(A) = \sum_{i=1}^n p(\{x_i\});$$

On note $p_i = p(\{x_i\})$ ou parfois plus simplement $p(x_i)$ la probabilité des événements élémentaires $\{x_i\}$. Définir une **loi de probabilité**, c'est déterminer les probabilités $p_1, p_2, \dots, p_n$ tels que, pour tout $i, 0 \leq p_i \leq 1$ et $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$; On le dispose le plus souvent dans un tableau

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n	total
p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_n	1

Propriété 1.6. Soit p une probabilité sur l'univers Ω , A et B deux événements de Ω . Alors

- ▶ $0 \leq P(A) \leq 1$
- ▶ $p(\emptyset) = 0$ et $p(\Omega) = 1$
- ▶ $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
- ▶ Si A et B sont incompatibles alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.
- ▶ $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$

Exemple 1.9. On considère l'ensemble E des entiers de 20 à 40. On choisit l'un de ces nombres au hasard. A est l'événement : "le nombre est multiple de 3", B est l'événement : "le nombre est multiple de 2", C est l'événement : "le nombre est multiple de 6". Calculer $p(A)$, $p(B)$, $p(C)$, $p(A \cup B)$, $p(A \cap B)$, $p(A \cup C)$ et $p(A \cap C)$.

Définition 1.10. (Equiprobabilité)

On dit qu'il y a **équiprobabilité** quand tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Dans une situation d'équiprobabilité, si $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ a n éléments et si E est un événement composé de m événements élémentaires alors :

$$p(E) = \frac{\text{card}(E)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{m}{n}$$

où $\text{card}(E)$ et $\text{card}(\Omega)$ désignent respectivement le nombre d'éléments de E et de Ω . On le mémorise souvent en disant que c'est le nombre de cas **favorables** divisé par le nombre de **cas possibles**.

Dans ce cas $p_i = p(\{x_i\}) = \frac{1}{n}, \forall 1 \leq i \leq n$

Remarque 1.7. Les expressions suivantes : "dé équilibré ou parfait", "boule tirée de l'urne au hasard", "boules indiscernables au toucher, cartes bien battues, pièce équilibrée ou parfaite, ... indiquent que, pour les expériences réalisées, le **modèle associé est l'équiprobabilité**

Exemple 1.10. On lance deux fois de suite un dé équilibré.

1. Représenter dans un tableau les 36 issues équi-probables .
2. Calculer la probabilité des événements :
 A : " on obtient un double " ; B : "on obtient 2 numéros consécutifs " ; C : " on obtient au moins un 6 " ; D : " la somme des numéros dépasse 7 ".

Exercice 1.2.1. On lance 4 fois de suite une pièce équilibrée.

1. Dresser la liste des issues équiprobables.
2. Quel est l'événement le plus probable : A ou B ?
 A : " 2 piles et 2 faces "
 B : " 3 piles et 1 face ou 3 faces et 1 pile ".

1.3 Variables aléatoires

Activité 1.3. Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé cubique puis un dé tétraédrique tous équilibrés et on note les nombres obtenus.

1. (a) Décrire l'univers Ω de cette expérience aléatoire.
(Rep : $\Omega = \{(i, j); i \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ et } j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$)
(b) Combien d'issues possède Ω ? **(Rep : $\text{card}(\Omega) = 6 \times 4 = 24$)**
On s'intéresse à la somme des deux nombres obtenus. Soit X l'application de Ω dans $\mathbb{R}$, qui à chaque issue de Ω , associe la somme des deux nombres obtenus correspondant. En probabilité, une telle fonction se nomme **variable aléatoire**.
2. (a) A quelle valeur de $\mathbb{R}$, X associe-t-il l'issue $(4, 3)$? **(Rep : $X = 7$)**
(b) A quelles issues de Ω le nombre 6 est-il associé ? **(Rep : $(2, 4), (4, 2), (3, 3), (1, 5), (5, 1)$)**.
(c) Quelles sont les différentes valeurs de $\mathbb{R}$ que peut prendre cette valeur aléatoire ?
(Rep : $X(\Omega) = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$)
3. Le tableau suivant donne les probabilités d'obtenir les différentes valeurs prises X . Remplir ce tableau

Valeurs prises par X , notées x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilités d'obtenir les x_i , notées $P(X = x_i)$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$

Ce tableau est appelé **loi probabilité** de la variable aléatoire de X .

Définition 1.11. (Variable aléatoire)

On considère une épreuve d'univers Ω .

- Une **variable aléatoire** X est une application définie sur Ω muni d'une probabilité p , à valeurs dans $\mathbb{R}$.
- L'ensemble des valeurs prises par X , c'est-à-dire $X(\Omega)$ est appelé **univers image**.
- X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, p_2, \dots, p_n$ définies par : $p_i = p(X = x_i)$.
- L'affectation des p_i aux x_i permet de définir une nouvelle loi de probabilité. Cette loi notée P_X , est appelée **loi de probabilité (ou distribution de probabilité)** de X .

Remarque 1.8. Lorsque Ω est fini, la variable aléatoire est dite **discrète**.

1.3.1 Caractéristiques d'une variable aléatoire.

On considère une épreuve d'univers Ω fini muni de la probabilité p . Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, p_2, \dots, p_n$. On appelle

► **espérance mathématique** de X , le nombre réel défini par : $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$.

► **variance** de X , le nombre réel défini par : $V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - [E(X)]^2$

► **l'écart-type** est le nombre σ défini par : $\sigma = \sqrt{V(X)}$.

Propriété 1.7. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de probabilité discrète uniforme (**équiprobabilité**). Dans ce cas les valeurs de X correspondent au rang $x_i = i (\forall i \in [1, n])$

$$E(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } V(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

Preuve : Exercice

1.3.2 Propriétés d'une variable aléatoire.

Soient X, Y deux variables aléatoires, $a, b \in \mathbb{R}$.

■ $E(b) = b$ et $V(b) = 0$

■ $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ et $E(aX+b) = aE(X) + b$

■ $V(aX) = a^2V(X)$ et $V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$ avec $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

Remarque 1.9. Si X et Y sont indépendantes : $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Exemple 1.11. Un joueur lance un dé : si le numéro est un nombre premier, le joueur gagne une somme égale au nombre considéré (en FCFA); sinon il perd ce même nombre de FCFA

1. Si X est le gain algébrique réalisé, donner la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique et son écart-type.
2. Le jeu est-il favorable au joueur?

1.4 Conditionnement (pas au programme en Tle C)

1.4.1 Arbres pondérés.

Règles de construction

- La somme des probabilités des branches issues d'un même noeud est 1.
- La probabilité de l'événement correspondant à un trajet est le produit des probabilités des différentes branches composant ce trajet.

Exemple 1.12. On jette une pièce.

- Si on obtient pile, on tire une boule dans l'urne P contenant 1 boule blanche et 2 boules noires.
 - Si on obtient face, on tire une boule dans l'urne F contenant 3 boules blanches et 2 boules noires.
- Représenter l'arbre pondéré de cette expérience.

1.4.2 Probabilité conditionnelle.

Activité 1.4. En fin de 1^{er}S, chaque élève choisit une et une seule spécialité en terminale suivant les répartitions ci-dessous :

Par spécialité :

Mathématiques	Sciences physiques	SVT
40 %	25%	35 %

Sexe de l'élève selon la spécialité :

Sexe / Spécialité	Mathématiques	Sciences physiques	SVT
Fille	45 %	24 %	60 %
Garçon	55 %	76 %	40%

On choisit un élève au hasard :

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience aléatoire.
2. (a) Quelle est la probabilité de chacun des événements suivants ? F : " l'élève est une fille ", M : " l'élève est en spécialité maths ". (**Rep** : $p(F) = 0,4 \times 0,45 + 0,35 \times 0,6 + 0,25 \times 0,24 = 0,45$)
 (b) Quelle est la probabilité que ce soit une fille ayant choisi spécialité mathématiques ?
 (c) Sachant que cet élève a choisi spécialité mathématiques, quelle est la probabilité que ce soit une fille ? (**Rep** : $p(F \cap M) = 0,45$)
 On appelle **probabilité de F sachant M cette probabilité (conditionnelle)** et on la note $p_M(F)$ ou $P(F/M)$
 (d) Quelle égalité faisant intervenir $p(F \cap M)$, $p(F)$ et $p_M(F)$ peut-on écrire ? Comparer $p(F)$ et $p_M(F)$ et en donner une interprétation.
3. Sachant que cet élève a choisi spécialité SVT, quelle est la probabilité que ce soit une fille ?
4. Comparer $p_S(F)$ et $p(F)$, et en donner une interprétation.

Définition 1.12. p désigne une probabilité sur un univers fini Ω . A et B étant deux événements de Ω , B étant de probabilité non nulle.

- On appelle **probabilité conditionnelle** de l'événement A sachant que B est réalisé le réel noté

$$p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

- Le réel $p(A/B)$ se note aussi $p_B(A)$ et se lit aussi **probabilité de A sachant B** .

Remarque 1.10. Si A et B sont tous deux de probabilité non nulle, alors les probabilités conditionnelles $p(A/B)$ et $p(B/A)$ sont toutes les deux définies et on a : $p(A \cap B) = p(A/B) \times p(B) = p(B/A) \times p(A)$.

Exercice 1.4.1. Efficacité d'un test

Une maladie atteint 3% d'une population donnée. Un test de dépistage donne les résultats suivants :

- Chez les individus malades, 95 des tests sont positifs et 5 négatifs.
- Chez les individus non malades, 1 des tests sont positifs et 99 négatifs. On choisit un individu au hasard.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience aléatoire.
2. Quelle est la probabilité
 - (a) qu'il soit malade et qu'il ait un test positif.
 - (b) qu'il ne soit pas malade et qu'il ait un test négatif ?
 - (c) qu'il ait un test positif ?
 - (d) qu'il ait un test négatif ?
3. Calculer la probabilité
 - (a) qu'il ne soit pas malade, sachant que le test est positif ?
 - (b) qu'il soit malade, sachant que le test est négatif ?
4. Interpréter les résultats obtenus aux questions 3a et 3b.

1.4.3 Formule de Bayes (complément de cours, pas au programme)

Cette formule est aussi appelée **Théorème de la probabilité des causes**, car elle permet de renverser le conditionnement. On l'obtient en remarquant que la d'une intersection $A \cap B$ peut s'écrire en conditionnant A par B , soit en conditionnant B par A :

$$p(A \cap B) = p_B(A) \times p(A) = p_A(B) \times p(B)$$

On obtient la formule suivante :

$$p_B(A) = \frac{p_A(B) \times p(A)}{p_A(B) \times p(A) + p_{\bar{A}}(B) \times p(\bar{A})}$$

avec $p(B)$ non nulle.

Exemple 1.13. Une maladie M se présente sous deux formes M_1 et M_2 avec les probabilités respectives $p(M_1) = 0,2$ et $p(M_2) = 0,8$ et le symptôme S apparaît dans 80% des cas de M_1 et dans 10% des cas M_2 . Quelle est la probabilité pour un patient atteint de M qui présente le symptôme S , d'être atteint de M_1 .

Solution :

$$p_S(M_1) = \frac{p_{M_1}(S) \times p(M_1)}{p_{M_1}(S) \times p(M_1) + p_{M_2}(S) \times p(M_2)} = \frac{0,8 \times 0,2}{0,8 \times 0,2 + 0,1 \times 0,8} = \frac{2}{3}$$

1.5 Indépendance

1.5.1 Événements indépendants.

Définition 1.13. A et B sont 2 événements de probabilité non nulle.

- A et B sont **indépendants** lorsque la réalisation de l'un ne change pas la réalisation de l'autre.
- A et B sont **indépendants** si et seulement si $p(A/B) = p(A)$ ou $p(B/A) = p(B)$.

Théorème 1.5.1. Deux événements A et B de probabilité non nulle sont **indépendants** si et seulement si ils vérifient une des trois conditions :

$$p(A/B) = p(A) \text{ ou } p(B/A) = p(B) \text{ ou } p(A \cap B) = p(A) \times p(B).$$

Remarque 1.11. Ne pas confondre événements **indépendants** et événements **incompatibles**.

- 2 événements A et B sont **indépendants** si $p(A \cap B) = p(A)p(B)$.
- 2 événements A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$.
- **Lois de Morgan** : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Proposition 1.1. Soient A et B deux événements. Les propositions suivantes sont équivalentes

1. A et B indépendants.
2. $\overline{A}$ et B indépendants.
3. A et $\overline{B}$ indépendants.
4. $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

Démonstration. Exercice **Ind** : utiliser les lois de Morgan.

Exemple 1.14. Dans une classe de 40 élèves, 28 apprennent l'anglais, 16 l'allemand et 8 les deux langues. On choisit au hasard un élève de cette classe et on considère les événements A : "L'élève choisit apprend l'anglais" et B : "L'élève choisit apprend l'allemand". Calculer les probabilités des événements A , B , $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A \cup B}$ et $\overline{A \cap B}$

Exercice 1.5.1. On extrait au hasard un jeton d'un sac contenant six jetons : trois rouges numérotés 1, 2 et 3, deux jaunes numérotés 1 et 2, et un bleu numéroté 1. On désigne respectivement par R , U et D les événements : "le jeton est rouge", "le numéro est 1" et "le numéro est 2". Les événements R et U sont-ils indépendants ? Et les événements R et D ?

1.5.2 Indépendance de deux variables aléatoires.

Définition 1.14. X et Y sont deux variables définies sur l'univers Ω d'une expérience aléatoire ; X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et Y prend les valeurs $y_1, y_2, \dots, y_q$. Définir la loi du couple (X, Y) , c'est donner la probabilité $p_{i,j}$ de chaque événement

$$[(X = x_i) \text{ et } (Y = y_j)].$$

Remarque 1.12. Les événements $(X = x_i)$ et $(Y = y_j)$ sont indépendants si : $p[(X = x_i) \text{ et } (Y = y_j)] = p(X = x_i) \times p(Y = y_j)$

Exercice 1.5.2. On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. L'ensemble E des issues est alors l'ensemble des 32 cartes et le fait de tirer au hasard implique que les événements élémentaires sont équiprobables.

- On définit sur E la variable aléatoire X qui, à chaque issue, associe 1 si cette issue est un valet, 2 si c'est une dame, 3 si c'est un roi, 4 si c'est un as et 0 si ce n'est pas l'une de ces figures. Les valeurs de X sont donc $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2$, $x_4 = 3$, $x_5 = 4$.

- On définit sur E la variable aléatoire Y qui, à chaque issue, associe 1 si cette issue est un trefle ou un carreau, 2 si c'est un coeur, 3 si c'est un pique. Les valeurs de Y sont $y_1 = 1$, $y_2 = 2$, $y_3 = 3$.

1. Définir la loi du couple (X, Y) . (on pourra dresser un tableau à double entrée)
2. Donner les lois de X et de Y
3. X et Y sont-elles indépendantes ?

1.5.3 Probabilités totales.

Définition 1.15. Soient Ω un univers associé à une expérience aléatoire et n un entier $n \geq 2$. Les événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une partition de Ω si les trois conditions suivantes sont réalisées :

- pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $A_i \neq \emptyset$.
- pour tous i et j (avec $i \neq j$) de $\{1, 2, \dots, n\}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$.
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$.

Formule des probabilités totales

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ une partition de l'univers Ω constituée d'événements de probabilités non nulles et B un événement quelconque contenu dans Ω . Alors :

$$p(B) = p(B \cap A_1) + p(B \cap A_2) + \dots + p(B \cap A_n) = p_{A_1}(B) \times p(A_1) + p_{A_2}(B) \times p(A_2) + \dots + p_{A_n}(B) \times p(A_n)$$

Exemple 1.15. On dispose de deux urnes U_1 et U_2 indiscernables. U_1 contient 4 boules rouges et trois boules vertes, U_2 contient 2 boules rouges et 1 boule verte. On choisit une urne au hasard et on tire une boule de cette urne. Calculer la probabilité pour qu'elle soit rouge.

Exercice 1.5.3. Dans un jeu de 32 cartes, on tire simultanément 3 cartes au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir :

1. Trois as.
2. Trois cartes de même valeur.
3. Deux coeurs et un pique.

Exercice 1.5.4. Une urne contient : 5 boules n°10 ; 4 boules n°15 ; 3 boules n°20. On tire simultanément 3 boules de cette urne. Les tirages sont équiprobables.

1. Déterminer les probabilités suivantes :
 A : « On tire au moins une boule n°15 »
 B : « On tire trois boules portant trois numéros différents »
 C : « On tire trois boules portant le même numéro »
 D : « Parmi les trois boules, deux portent le même numéro »
2. Il faut payer 51F pour effectuer un tirage de trois boules, et chaque tirage rapporte en francs cfa la somme des points marqués. Quelle est la probabilité d'être gagnant ?.

1.6 Lois de probabilités

1.6.1 Loi de Bernoulli.

Définition 1.16. :

♦ Une **alternative ou expérience de Bernoulli** est une épreuve à deux issues possibles :

- le succès, note 1, de probabilité p ;
- l'échec, note 0, de probabilité $q = 1 - p$.

Sa loi de probabilité est appelée **loi de Bernoulli** de paramètre p .

♦ Un **schéma de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois ($n \in \mathbb{N}^*$) de façon indépendante une épreuve de Bernoulli dont la probabilité du succès est p .

Exemple 1.16. Un dé cubique est mal équilibré : la probabilité d'obtenir 6 est de $\frac{1}{7}$. On appelle succès l'événement à obtenir 6 et échec à obtenir un numéro différent de 6. Cette expérience qui ne comporte que deux issues suit une **loi de Bernoulli**.

Si on effectue cinq fois cette expérience. On est en présence d'un **schéma de Bernoulli**.

Théorème 1.6.1. Pour une loi de Bernoulli de paramètre p , l'espérance est p et l'écart type est $\sqrt{pq}$.

1.6.2 Loi Binomiale.

Définition 1.17. Soit un schéma de Bernoulli constitué d'une suite de n épreuves. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de succès obtenus, alors : $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

Notation 1.1. Une variable aléatoire réelle X suit une loi binomiale de paramètre $n \in \mathbb{N}^*$ et p est notée $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

Exemple 1.17. Dans l'exemple précédent, on appelle X la variable aléatoire comptant le nombre de succès à l'issue des 5 lancers. On obtient les probabilités suivantes : $P_0 = P(X = 0) = C_5^0 \left(\frac{1}{7}\right)^0 \left(\frac{6}{7}\right)^5 = 0,4627$. $P_1 = 0,3856$; $P_2 = 0,1285$; $P_3 = 0,0214$; $P_4 = 0,0018$; $P_5 = 0,0001$.

Exercice 1.6.1. Un tireur vise une cible. La probabilité qu'il touche la cible est de 0,7. Il tire 3 fois de suite. On note X le nombre de fois où il atteint la cible. Déterminer la probabilité de X .

Théorème 1.6.2. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale de paramètres n et p alors :

- ▶ l'espérance de X est $E(X) = np$;
- ▶ la variance de X est $V(X) = npq$ et l'écart type est $\sigma = \sqrt{npq}$, $q = 1 - p$.

Exercice 1.6.2. Un sac contient 20 jetons indiscernables au toucher. Six d'entre eux sont rouges et les autres sont bleus.

1. On tire un jeton au hasard. Quelle est la probabilités p d'obtenir un jeton rouge ?
2. On tire successivement 6 jetons un à un, avec remise.
 - (a) Quelle est la probabilité P_1 d'obtenir exactement trois jetons rouges ?
 - (b) Quelle est la probabilité P_2 d'obtenir exactement un jeton rouge ou un jeton bleu ?
 - (c) Quelle est la probabilité P_3 d'obtenir au moins quatre jetons rouges ?

1.7 Fonction de repartition

Définition 1.18. Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω de probabilité p .

La **fonction de repartition** de X est l'application F_X de $\mathbb{R}$ vers $[0, 1]$ qui à, tout x associe $F_X(x) = p(X \leq x) = p(X \in]-\infty, x])$

• Lorsque X est une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{x_1, \dots, x_n\}$ avec $x_1 < \dots < x_n$ alors pour $x \in \mathbb{R}$

$$F_X(x) = \sum_{i=1}^k p(X = x_i) = \sum_{i=1}^k p_i \text{ avec } k \text{ tel que } x_k \leq x < x_{k+1}$$

La fonction de repartition d'une variable aléatoire discrète est constante par morceaux.

• Lorsque X est continue de densité de probabilité f , alors :

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \text{ (Pas au programme)}$$

Propriété 1.8. Soit F_X la fonction de repartition d'une variable aléatoire discrète X , alors :

- $\forall t \in \mathbb{R}, 0 \leq F_X(t) \leq 1$;
- F_X est croissante sur $\mathbb{R}$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
- Si $a \leq b$, $p(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

Exemple 1.18. On lance trois fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On gagne $2F$ pour chaque résultat "pile" et on perd $1F$ pour chaque résultat "face". On introduit X la variable aléatoire égale au gain obtenu après le lancer.

1. Quel est l'ensemble E des issues possibles ?
2. Quelles sont les valeurs prises par X .
3. Déterminer la loi de probabilité de X et sa fonction de repartition F_X .
4. Représenter graphiquement cette distribution de probabilités et fonction de repartition F_X .

Remarque 1.13. Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on utilise **un diagramme en bâtons** pour visualiser la **distribution des probabilités** et une fonction en escalier pour la **fonction de repartition**.

Exercice 1.7.1. On lance deux dés. On note X la variable aléatoire égale au plus grand chiffre obtenu après le lancer.

1. Quel est l'ensemble des valeurs possibles de X .
2. Déterminer la loi des probabilités de cet expérience puis sa fonction de repartition et représenter.

DRAFT